

Aline BUFFAT (Chambre d'agriculture de la Drôme) [aline.buffat@drome.chambagri.fr](mailto:aline.buffat@drome.chambagri.fr) ; Cindie Arlaud (LPO AURA) : [cindie.arlaud@lpo.fr](mailto:cindie.arlaud@lpo.fr)

Les niochirs et gîtes sont des aménagements simples et très efficaces permettant de pallier au manque d'abris naturels. Les niochirs à passereaux, à rapaces et les gîtes à chauves-souris sont les plus fréquemment installés sur les exploitations. Ces espèces sont d'importantes consommatrices d'insectes ravageurs et de micro-mammifères.

L'efficacité de ces auxiliaires est maximale entre le printemps et l'automne. Ils représentent une méthode de lutte contre les bio-agresseurs respectueuse de l'environnement et une alternative intéressante permettant de diminuer l'usage des produits phytosanitaires.

### Les principes de base

- Équipez les haies et les bordures de parcelles
- Équipez l'intérieur des parcelles si la mécanisation le permet
- Privilégiez les parcelles avec une faible utilisation de produits phytosanitaires
- Diversifiez les types de niochirs
- Reconnectez la ferme à son environnement favorise la présence des oiseaux et chauves-souris : linéaires de haies, mare, parcelles de petite taille ...



Illustration 1 : Niochir à Faucon Crécerelle auto-construit (Crédit CA26)



Illustration 2 : Niochir à Chouette effraie auto-construit (Crédit CA26)

### Un aménagement favorable pour ...

| Exemples                 | Espèces   | Ravageurs consommés   |
|--------------------------|---|---|
| Oiseaux cavernicoles     | Mésanges (bleue et charbonnière)<br>Rougequeue à front blanc<br>Huppe fasciée | Tordeuses, carpocapses, mouches, cochenilles, psylles, courtillères                 |
| Oiseaux non cavernicoles | Rougequeue noir   | Papillons (chenilles et adultes), pucerons  |
| Rapaces diurnes          | Faucon crécerelle<br>Hibou moyen-duc<br>Chouette effraie                      | 1500 campagnols /an / individu<br>Pour une famille : jusqu'à 3 à 4000 campagnols/an |
| Rapaces nocturnes        | Chouette chevêche   | Régime diversifié intégrant campagnols et insectes                                  |
| Chauves-souris           | Pipistrelles  | Jusqu'à 3000 insectes/nuît/individu   |

### Les points clefs

- Position : lieu calme et abrité des intempéries, du soleil et des vents dominants
- Orientation Est/Sud-Est à privilégier
- Période de pose : automne-hiver
- Privilégiez des supports stables surtout pour les gîtes à chauves-souris
- Matériel : bois non raboté et non traité d'au moins 18mm d'épaisseur. Si le bois est lisse, rainurez les parois du niochir pour que les oiseaux puissent sortir et les chauves-souris s'accrocher
- Pas de peinture ni de vernis sur les niochirs! L'huile de lin protège et conserve le bois des niochirs
- Chaque espèce nécessite un niochir et une hauteur de pose spécifique, renseignez-vous!
- Ne visitez pas les niochirs pendant la période de reproduction (printemps-été), prévenez le personnel lors des travaux dans les champs

### Le saviez-vous ?

Les oiseaux insectivores et chauves-souris sont complémentaires : les premiers consomment les chenilles et larves la journée et tout au long de l'année, les seconds préfèrent les papillons nocturnes du printemps à l'automne



Illustration 3 : Niochir à mésanges (Crédit CA26)

### Pour aller + loin :

- Réseau des Chambres d'agriculture : conseillers biodiversité
- Réseau de la LPO : chargés de mission agriculture et biodiversité

### Ressources documentaires et contacts :

- <https://www.desterresetdesaies.fr>
- <http://nichoirs.net/>



### Auto-construction

- ✓ Possible et économe selon le matériel présent sur la ferme
- ✓ Coût variable : 10€ environ pour un niochir à mésanges (contre 35€ dans le commerce)



Illustration 4 : Niochir à chauve-souris (Crédit LPO)

### Entretien

- Nettoyez le niochir en automne pour le débarrasser des parasites (videz, brossez, rincez à l'eau bouillante, séchez)
- Les traces de présence (nids, crottes,...) sont synonymes du bon fonctionnement de l'aménagement
- Un niochir au toit ou à la façade amovible facilite ces interventions
- Le suivi d'efficacité à l'automne conditionne la durabilité de l'aménagement. Après 3-4 ans de pose sans trace de présence, envisagez de déplacer le niochir.