


POINT FOURRAGES

Calendrier fourrager



Conseil collectif à destination des éleveurs de la Nièvre

Des conseillers à votre écoute

Contact bureau Nevers
03 86 93 40 60
elevage@nièvre.chambagri.fr



PROAGRI
POUR VOUS. AUJOURD'HUI. ET DEMAIN

Avec le soutien financier de :

**RÉGION
BOURGOGNE
FRANCHE
COMTÉ**

Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR

**MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE**

 **CHAMBRE
D'AGRICULTURE
NIÈVRE**



Agro – Météo

Les 300°C cumulés depuis le premier février sont atteints sur la majeure partie du département, à l'exception des zones les plus en altitude du Morvan. Ce repère indique le départ de la mise à l'herbe des bovins conduits en pâturage tournant au printemps. La pousse d'herbe est encore timide mais devrait s'accélérer avec des conditions printanières la semaine prochaine.

Un passage pluvieux est cependant prévu cette fin de semaine : si la portance le permet, il est possible d'apporter l'azote sur les prairies destinées à être récoltées en foin (prévoir 30 à 50 unités d'azote, en fonction du besoin en stock).

Mise à l'herbe : adapter le chargement à la disponibilité

Une mise à l'herbe précoce est indispensable en cas de pratique du pâturage tournant afin de ne pas se faire dépasser lorsque la pousse d'herbe va s'accélérer. La mise à l'herbe doit dans un premier temps être progressive, afin de s'adapter à la disponibilité en herbe, encore faible en début de printemps. Les lots seront ensuite amenés à être complétés dans les jours et semaines à venir. Une mise à l'herbe précoce est indispensable afin de pouvoir faire pâturer l'ensemble des parcelles à disposition d'un lot avant que le cumul de température n'atteigne 700°C (repère qui marque le début d'épiaison des graminées). En effet, les prairies pâturées avant ce stade donneront des repousses feuillues pour la suite de la saison de pâturage tandis que celles qui n'auraient pas été pâturées généreront des refus (l'herbe épiée est moins appétente et donc plus difficilement consommée par les animaux).

Le chargement au moment de la mise à l'herbe doit être adapté à la disponibilité en herbe : lâcher dès que la hauteur d'herbe atteint la hauteur de la cheville, avec un chargement compris autour de 100 ares / UGB puis compléter progressivement les lots jusqu'à atteindre 45-50 ares / UGB d'ici la mi-avril.



Pâturage des brebis suitées : l'herbe de printemps pour économiser du concentré

Une mise à l'herbe rapide des brebis qui agnellent en fin d'hiver / début de printemps (dès que les agneaux atteignent l'âge de 15 jours) permet une économie de concentré par rapport à une conduite des brebis en bergerie. L'herbe de printemps est riche en énergie et en azote. Celle-ci permet de couvrir les besoins alimentaires des brebis en lactation pour assurer des croissances proches de 300 grammes par jour sur les agneaux. Une bonne gestion du pâturage est indispensable pour garantir une herbe de qualité suffisante durant les deux premiers mois de lactation, période durant laquelle les besoins alimentaires des brebis sont au maximum (trois à quatre fois supérieurs à ceux d'une brebis tarie). En cas de pâturage spécifique ovin, la mise en place d'un pâturage tournant est ainsi préconisée. Dans le cas d'un pâturage mixte bovins-ovins, les brebis auront la capacité à trier l'herbe disponible et les croissances des agneaux seront supérieures à celles permises par un pâturage libre spécifique ovin.



Photo CA 58



Dérobées fourragères : des récoltes qui approchent

Les ray-grass d'Italie et les méteils implantés avant une culture de printemps et ayant bénéficié d'un apport d'azote en février évoluent rapidement. Les ray-grass présentent déjà des hauteurs conséquentes. La douceur annoncée semaine prochaine va accélérer leur développement et les premières fauches devraient intervenir à partir de la deuxième quinzaine d'avril.



Parcelles de dérobées fourragères implantées avant une culture de printemps. La végétation évolue rapidement et les premières récoltes devraient arriver vers la mi-avril - photo CA du 19 mars 2025

