


POINT FOURRAGES



Calendrier fourrager



Conseil collectif à destination des éleveurs de la Nièvre

Des conseillers à votre écoute

Contact bureau Nevers
03 86 93 40 60
elevage@nievre.chambagri.fr



PROAGRI
POUR VOUS. AUJOURD'HUI. ET DEMAIN

Avec le soutien financier de :

**RÉGION
BOURGOGNE
FRANCHE
COMTE**

Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR

**MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE**
Julien
Garrat
Président



Agro – Météo

Environ 60°C ont été cumulés en sept jours : les 300°C sont dépassés partout dans le département et les 400°C sont même atteints dans les secteurs les plus précoces : dans ceux-ci, attention à ne pas prolonger le déprimage des prairies de fauche au-delà d'une dizaine de jours sous peine de pénaliser le rendement (si pâturage au-delà de 500°C cumulés). La pousse d'herbe est hétérogène selon les parcelles suivies : dans les parcelles saines et bien exposées, on approche les 40 kg de MS/ha/j tandis que dans les parcelles plus froides ou hydromorphes, la pousse est ralentie avec des croissances parfois inférieures à 10 kg de MS/ha/j. Les prévisions météo n'annoncent aucune précipitation dans les 10 jours à venir : si ces conditions vont être profitables aux parcelles les plus humides qui vont pouvoir s'assainir et retrouver une portance suffisante pour être pâturées, le manque d'eau pourrait en revanche vite se faire ressentir sur la pousse d'herbe dans les parcelles plus superficielles.

Implantation de prairie : c'est maintenant

Les conditions météo sont idéales pour réaliser des semis de prairies (luzerne ou prairies multispèces). Il faut éviter de semer au-delà de la mi-avril (fin avril dans le Morvan) pour éviter d'exposer les jeunes plants à une sécheresse précoce

Comme en fin d'été, quelques règles sont à respecter pour réussir une implantation de prairie :

- Semer à faible profondeur (maximum 1 cm)
- Rouler avant et après le semis pour assurer un bon contact sol-graine et conserver un maximum d'humidité dans le sol
- Pour la luzerne, prévoir d'inoculer la semence en cas de parcelle acide ou de parcelle étant implantée en luzerne pour la première fois.
- En cas de semis sous couvert, diminuez la densité de semis de la céréale.



Gestion du pâturage tournant au printemps : quand changer de paddock ?

L'objectif du pâturage tournant est de faire pâturer aux animaux une herbe comprise entre 15 cm (herbe à mi-botte) et 5 cm (herbe au talon) de manière à leur offrir une nourriture riche sans compromettre le potentiel de repousse. Ce sont donc les hauteurs d'herbe des différents paddocks qui doivent dicter le changement. Pour éviter tout surpâturage, le temps de séjour sur un même paddock doit être de maximum 8 jours. Si au bout de 8 jours, la quantité d'herbe disponible dans le paddock est toujours conséquente, c'est que celui-ci est trop grand. Un redécoupage est alors nécessaire (ou alors prévoir de ramener des animaux pour augmenter le chargement).

Le changement de paddock doit être dicté par la hauteur d'herbe d'entrée des paddocks disponibles, de manière à ne pas entrer au-delà de 15 cm.

C'est la maîtrise du premier cycle d'exploitation de l'herbe qui conditionne la réussite du pâturage de toute la campagne



Pâturage = surveillance des parasites en ovins et en bovins

Les agneaux sont sensibles aux infestations par le ténia. Un déparasitage est à prévoir 6 semaines après la mise à l'herbe. Ce traitement peut avoir lieu plus tôt en cas de présence d'anneaux de ténia dans les fécès.



Photo CA 58

Au pâturage, les bovins sont exposés aux tiques. Ces parasites sont vecteurs de maladies infectieuses qui peuvent parfois être mortelles (piroplasmose, fièvre Q, erlichiose, anaplasmose,...).

Des tiques ont déjà été repérées sur les premiers animaux sortis. Inspectez vos animaux, parlez-en avec votre vétérinaire !



Où détecter les tiques sur vos bovins ?

Les tiques (larves et nymphes adultes) se trouvent le plus souvent à ces endroits :

