


POINT FOURRAGES

31 Calendrier fourrager



Conseil collectif à destination des éleveurs de la Nièvre

Des conseillers à votre écoute

Contact bureau Nevers
03 86 93 40 60
elevage@nievre.chambagri.fr



PROagri
POUR VOUS. AUJOURD'HUI. ET DEMAIN

Avec le soutien financier de :

RÉGION
BOURGOGNE
FRANCHE
COMTE

Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR


MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE



Agro – Météo

Environ 80°C ont été cumulés sur la première semaine d'avril. La végétation évolue rapidement. La pousse d'herbe reste hétérogène en fonction des sols et de l'exposition des parcelles : la pousse est soutenue dans les parcelles précoces mais à la peine dans les parcelles les plus froides ou les plus sèches dans lesquelles le manque d'eau se fait déjà ressentir. Les 500°C seront atteints dans la semaine dans la majorité du département : il est temps d'arrêter le déprimage des parcelles de fauche pour ne pas pénaliser le rendement. Certains ray-grass italiens ou hybrides et méteils sont déjà bien développés et les premiers ensilages sont faits.

Compte-tenu des reports de stocks 2024 conséquents dans de nombreuses exploitations, les fauches précoces sont à privilégier cette année afin de produire des fourrages de bonne valeur alimentaire qui viendront compléter les fourrages 2024 pauvres et peu appétents.



Les RGI et méteils fertilisés dès 200°C base 1^{er} janvier sont bien avancés et peuvent être récoltés dès maintenant pour obtenir des fourrages riches en azote et en énergie (photos CA58)




Fauches précoces : ne pas louper le créneau

La mise à l'herbe a lieu avec des stockages souvent loin d'être vides (stocks 2024 conséquents et peu de redistribution estivale). Les besoins en stock pour 2025 sont donc en partie déjà constitués mais souvent peu appétents et avec de faibles valeurs alimentaires.

Dans ce contexte, 2025 doit être l'occasion de viser la qualité plutôt que la quantité afin de compléter au mieux les reliquats de fourrages 2024.

Le premier critère de la valeur alimentaire d'un fourrage est le stade physiologique de la plante.

Globalement, quand la plante vieillit, sa valeur diminue : moins d'énergie donc moins digestible, plus d'encombrement donc moins ingestible et moins de protéines. La variation est plus ou moins rapide selon les espèces, plus lente pour les légumineuses que pour les graminées. En pratique, le stade de récolte est le déterminant fondamental de la qualité d'un fourrage conservé.



Evolution des valeurs nutritives du ray-grass d'Italie non alternatif au premier cycle (année après le semis) en fonction du stade et du rendement (Source : Arvalis)

En cas de fauche précoce, l'utilisation d'une faucheuse conditionneuse va améliorer le préfanage du fourrage et éviter de récolter un fourrage trop humide : objectif 30% à 35% de matière sèche pour limiter les pertes par écoulement.

Le même raisonnement s'applique pour les méteils, très présents dans le département depuis quelques années.

. Si l'objectif est la récolte d'un fourrage riche en protéines, qui sera utilisé sur des animaux à forts besoins (engraissement, vaches laitières) en complément d'un fourrage riche en énergie (ensilage de RGI ou ensilage de maïs par exemple), il faut privilégier une récolte précoce pour obtenir un fourrage avec la meilleure valeur alimentaire possible → viser le stade fin montaison des céréales, ne pas attendre la floraison des protéagineux.

. Si l'objectif est d'obtenir un fourrage plus équilibré, utilisable comme fourrage principal (pour des vaches allaitantes ou génisses de renouvellement) → viser le stade début épiaison des céréales, début floraison des protéagineux

Au-delà de ces stades, les méteils fourrages produiront des fourrages en grande quantité mais d'une valeur alimentaire comparable à celle d'un foin.

Les méteils contenant une forte proportion de seigle sont les plus précoces à récolter : le seigle est une céréale précoce qui devient vite ligneuse lorsqu'elle épie. Une récolte trop tardive donne un fourrage de faible valeur alimentaire et peu digestible → prévoir une récolte de ces fourrages dès que possible.