


POINT FOURRAGES

31 Calendrier fourrager



Conseil collectif à destination des éleveurs de la Nièvre

Des conseillers à votre écoute

Contact bureau Nevers
03 86 93 40 60
elevage@nievre.chambagri.fr



PROAGRI
POUR VOUS. AUJOURD'HUI. ET DEMAIN

Avec le soutien financier de :

**RÉGION
BOURGOGNE
FRANCHE
COMTE**

Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR

**MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE**


**CHAMBRE
D'AGRICULTURE
NIÈVRE**

Agro – Météo

L'épisode pluvieux de ces derniers jours va être profitable aux prairies pâturées depuis plusieurs semaines et aux parcelles récoltées en ensilage en favorisant le redémarrage de la pousse. Le week-end à venir et le début de semaine prochaine devrait proposer un prochain créneau favorable aux récoltes. Les 600°C cumulés depuis début février sont atteints sur la majorité du département et les stades avancent rapidement. Les graminées les plus précoces sont en cours d'épiaison. Passé ce stade, la valeur alimentaire diminue brusquement et rapidement.



Comment estimer la teneur en matière sèche ?

Quand on prend une poignée du fourrage :

15% MS : herbe au moment de la fauche

20 à 25% MS : en pressant le fourrage, les mains deviennent humides

30% MS : le fourrage doit être tordu pour humidifier les mains

35% MS : le fourrage très fortement tordu humidifie encore un peu les mains

40% MS : le fourrage est encore très vert mais les mains ne sont plus humidifiées

60% MS : certaines feuilles deviennent cassantes.



Réussir son enrubannage

- Ne pas faucher trop ras : la hauteur de coupe ne doit pas être inférieure à 7-8 cm pour plusieurs raisons : en deçà, la repousse est pénalisée, et cela évite d'introduire des particules de terre porteuses de spores butyriques qui vont avoir un effet néfaste sur la conservation du fourrage.
- Pour l'enrubannage, il faut au minimum 2 jours de sec après la fauche pour avoir un bon pré-fanage et atteindre le plus rapidement possible les teneurs en matière sèche de 45-50 %.
- Réaliser des bottes assez denses pour chasser le maximum d'air et favoriser une bonne conservation, mais aussi pour limiter la consommation en plastique.
- Le délai maximal entre le pressage et l'enrubannage doit être inférieur à 24 heures voire 36 heures afin de prévenir l'échauffement du fourrage, et donc une baisse de sa valeur alimentaire

Dans le cas d'un enrubannage de luzerne, les tiges peuvent être assez dures et risquent de percer le plastique. Pour limiter ce risque :

- Privilégier un liage des bottes au filet afin de plaquer un maximum les tiges
- Prévoir 6 à 8 tours de film
- Enrubanner si possible sur le lieu de stockage plutôt que dans la parcelle afin d'éviter de reposer les bottes enrubannées sur les chaumes



Ensilage d'herbe : réussir son silo

Un silo bien conçu garanti la conservation d'un ensilage appétant à la reprise avec une bonne valeur alimentaire.

Les objectifs sont :

- Baisse rapide du pH
- Absence d'oxygène
- Délai le plus court possible entre la fauche et la fermeture hermétique du silo.

Pour cela,

- L'herbe doit être coupée en brin court (4cm maximum) pour libérer le maximum de sucre. Le tassement, par couche de 30 cm, sera facilité ce qui limitera la présence d'oxygène.
- La taille du silo doit aussi être réfléchi afin de permettre un avancement quotidien suffisant et limiter les reprises fermentaires (15 cm en hiver, 25 cm en été).