


POINT FOURRAGES

31 Calendrier fourrager



Conseil collectif à destination des éleveurs de la Nièvre

Des conseillers à votre écoute

Contact bureau Nevers
03 86 93 40 60
elevage@nievre.chambagri.fr



PROAGRI
POUR VOUS. AUJOURD'HUI. ET DEMAIN

Avec le soutien financier de :

RÉGION
BOURGOGNE
FRANCHE
COMTÉ

Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

Agro – Météo

Les températures estivales de la semaine dernière ont permis aux sommes de températures de faire un bond spectaculaire et on approche déjà les 900°C cumulés dans les secteurs les plus précoces. Ce cumul s'observe sur les graminées avec les espèces les plus précoces déjà en fleurs. Le vent du nord de ces derniers jours a freiné la pousse d'herbe et les parcelles pâturées peinent parfois à redémarrer dans les zones les plus sèches où le manque d'eau se fait déjà ressentir.

En l'absence de pluie, les chantiers de récolte peuvent se poursuivre dans de bonnes conditions et la majorité des prairies temporaires et méteils sont maintenant récoltées dans le département, à l'exception des zones les plus tardives du Morvan.



Les bourgeons apparaissent également sur les luzernes, signe qu'elles peuvent dès maintenant être récoltées (photo CA 58)



Dans les zones sèches, la repousse est à la peine (photo CA 58)



Sorgho : soigner le semis pour réussir l'implantation

Les sorghos sont sensibles à la concurrence lors de la phase d'installation. Une bonne implantation favorise une levée rapide et régulière, limite les pertes et facilite le désherbage.

➤ Semer sur un sol bien réchauffé ($>12^{\circ}\text{C}$) et bien préparé (un labour préalable limite les adventices).

➤ Semer à la bonne densité et à la bonne profondeur :

→ 20 à 25 kg/ha pour les sorghos multicoupes hybrides et 25 à 30 kg/ha pour les sorghos multicoupes de type Sudan Grass. Semis au semoir à céréales, maximum 3 cm de profondeur, roulage après semis indispensable.

→ Sorgho fourrager monocoupe : 180 à 250 000 grains / ha selon la réserve utile du sol, 2 à 4 cm de profondeur (de préférence au semoir monograine).

➤ Fertilisation : au semis, prévoir un apport de 60 à 80 unités de P et de K et 30 à 40 unités de N. Un second apport d'azote équivalent sera à prévoir :


→ au stade 8 feuilles pour les sorghos monocoupes,

→ après chaque exploitation pour les sorghos multicoupes. Dans les cas de semis après un méteil, un labour ou un désherbage est indispensable pour limiter la concurrence notamment des repousses d'avoine



Fauche : pas trop court !

La hauteur de coupe idéale se situe à une hauteur de 7 cm. En dessous de cette hauteur, on pénalise la vitesse de repousse et l'apparition d'espèces indésirables, plus tolérantes à une coupe rase. Autre avantage d'une fauche à 7 cm : une meilleure valeur alimentaire du fourrage (+ 1 point de MAT / kg de MS par rapport à une fauche à 3 cm). Enfin dernier avantage à ne pas faucher trop ras, moins de risque de souiller le fourrage avec de la terre.



Impact d'une coupe trop rase sur différentes espèces prairiales (source fourragesmieux.be)