


POINT FOURRAGES

 Calendrier fourrager



**Conseil collectif
à destination des
éleveurs de la Nièvre**

Des conseillers à votre écoute

Contact bureau Nevers
03 86 93 40 60
elevage@nièvre.chambagri.fr



PROAGRI
POUR VOUS. AUJOURD'HUI. ET DEMAIN

Avec le soutien financier de :

**RÉGION
BOURGOGNE
FRANCHE
COMTÉ**

Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR

**MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE**


**CHAMBRE
D'AGRICULTURE
NIÈVRE**

 Agro – Météo

Près de 90°C ont été cumulés durant la semaine dernière. Si dans les zones les plus en altitude du Morvan, les graminées sont encore au stade début épiaison (stade favorable au compromis rendement/valeur alimentaire), dans les zones précoces les stades sont désormais bien avancés et de nombreuses graminées sont maintenant en fleurs. En l'absence de pluie annoncée, des récoltes sous forme de foin peuvent dès à présent être envisagées (le recours à l'enrubannage doit rester une alternative en cas d'impossibilité à atteindre les 85% de matière sèche nécessaires à la bonne conservation du foin).

La pousse d'herbe est parfois à la peine, notamment dans les zones séchantes où l'herbe peine parfois à redémarrer après un pâturage. Les parcelles débrayées doivent être fauchées rapidement pour pouvoir être réintégrées courant juin dans le circuit de pâturage afin de pouvoir allonger le temps de retour en début d'été, lorsque la pousse d'herbe sera moins dynamique.



L'objectif est d'atteindre 85-88% de MS en un minimum de temps pour limiter les pertes par la respiration du fourrage et garantir une bonne conservation. Le séchage se déroule en trois étapes :

- Premièrement, une phase de séchage rapide, durant laquelle le taux de matière sèche de la plante va passer de 20% à 40-45%. Ces pertes d'eau ont lieu essentiellement via les stomates des feuilles (organes qui permettent les échanges gazeux avec l'atmosphère) qui sont encore ouverts. Pour accélérer cette première étape, le fourrage doit être étalé au maximum : fanage juste après la fauche ou faucheuse-conditionneuse avec système d'éparpillement.
- Deuxièmement la perte d'eau se fait par les tiges. Les stomates se sont refermés et l'eau doit alors sortir de la plante via les tiges. Cette deuxième phase de perte d'eau est plus rapide en cas d'utilisation d'une faucheuse-conditionneuse, qui aura écrasé/éclaté les tiges. La teneur en matière sèche atteint alors 65-70%.
- La troisième et dernière phase, qui doit permettre au fourrage d'atteindre 85% de matière sèche est la plus délicate. Les sucres contenus dans les plantes retiennent l'eau, qui s'évacue toujours via les tiges. Une hauteur de fauche de 6-7 cm minimum, permet à l'air de circuler sous le fourrage et d'éviter que celui-ci ne se réhumidifie par le sol (et permet un meilleur redémarrage de la prairie ensuite). En cas de doute, une sonde permet de connaître rapidement le taux de matière sèche.

L'enrubannage doit rester une solution de secours s'il n'est pas possible d'atteindre les 85% de matière sèche visés (fourrage pas suffisamment sec et pluie annoncée, pas de capacité de stockage) : **c'est le stade physiologique de la plante et non pas le mode de conservation qui fait la valeur alimentaire du fourrage !**

