


POINT FOURRAGES

Calendrier fourrager



Conseil collectif à destination des éleveurs de la Nièvre

Des conseillers à votre écoute

Contact bureau Nevers
03 86 93 40 60
elevage@nievre.chambagri.fr



PROAGRI
POUR VOUS. AUJOURD'HUI. ET DEMAIN

Avec le soutien financier de :

**RÉGION
BOURGOGNE
FRANCHE
COMTÉ**

Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR

**MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE**
Julien
Garrat
Ministre



Agro – Météo

La somme des températures cumulées depuis le premier février poursuit sur un rythme identique aux semaines précédentes avec encore près de 100°C supplémentaires cumulés sur une semaine. Dans les parcelles séchantes, le manque d'eau se fait particulièrement ressentir et la pousse de l'herbe est au ralenti. Les précipitations de ce début de semaine, très localisées, seront favorables aux repousses des parcelles déjà récoltées. Profitez-en pour faucher les refus dans les pâtures. La fauche des espèces indésirables (chardons, rumex) est à effectuer avant que celles-ci ne montent à graine. Attention toutefois, une fauche trop précoce (avant l'apparition de la hampe florale) aura l'effet inverse : les plantes seront stimulées et repartiront de plus belle !

Faucher les refus permet également d'éliminer les graminées épiées et favorisera des repousses de meilleure qualité.

→ Comme pour une fauche « classique », viser une hauteur de coupe de 7 cm afin de préserver la flore de la prairie et de favoriser la repousse.



Pâturage : s'adapter au ralentissement de la pousse

Avec une dynamique de pousse faible, inférieure à la consommation quotidienne des animaux, il faut adapter le pâturage. Si les stocks sur pieds sont parfois conséquents, ceux-ci diminuent rapidement et une baisse du chargement peut s'avérer nécessaire. Pour ce faire, plusieurs options :

- Intégrer les prairies récoltées précocement dans le circuit de pâturage afin d'allonger le temps de retour sur les paddocks (attendre minimum 21 jours après la fauche avant d'y mettre des animaux).
- Si la période de reproduction est terminée, identifier dès à présent les vaches vides ou tardives qui ne seront pas conservées et, si l'âge du veau est suffisant, les vendre dès que possible.
- Démarrer la complémentation des veaux mâles destinés à la vente en brouards à l'automne afin de maintenir des croissances correctes.

Attention à ne pas faire pâturer trop ras : tout comme une fauche rase (en dessous de 8 cm), un pâturage trop ras (=surpâturage) pénalise les repousses et favorise le développement des espèces indésirables.




Les signes de sécheresse sont déjà bien visibles dans certains secteurs (photo CA 58)



Légumineuses : faucher toutes les six semaines

La luzerne dispose d'une capacité de repousse estivale importante mais il n'est pas toujours facile de décider quel rythme de fauche adopter pour trouver le bon compromis valeur alimentaire et volume. Viser 35 à 40 jours après la première coupe pour la seconde fauche est un bon compromis pour obtenir un fourrage riche en azote. Pour ne pas compromettre la pérennité d'une luzernière, il est conseillé de la laisser fleurir une fois par an pour lui permettre de reconstituer ses réserves racinaires (10% des plantes en fleurs suffisent). Celles-ci sont constituées de sucres et d'amidon et sont mobilisées après chaque coupe pour assurer le redémarrage de la plante. Cette reconstitution est assurée par le système aérien dès qu'il est suffisamment développé.



Les réserves sont reconstituées à 100% au stade début floraison, raison pour laquelle il est conseillé de laisser fleurir la luzerne une fois dans l'année (source Arvalis-Institut du végétal).