

POINT FOURRAGES

Conseil collectif à destination des éleveurs de la Nièvre

Des conseillers à votre écoute

Contact bureau Nevers

03 86 93 40 60

elevage@nievre.chambagri.fr



PROagri
POUR VOUS. AUJOURD'HUI. ET DEMAIN

Avec le soutien financier de :

RÉGION
BOURGOGNE
FRANCHE
COMTÉ

Avec la contribution
financière du compte
d'affectation spéciale
développement
agricole et rural
CASDAR

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE



CHAMBRE
D'AGRICULTURE
NIÈVRE

Les foin se terminent et la moisson des orges d'hiver débute doucement dans le département : compte-tenu des rendements globalement décevants en foin, les surfaces moissonnées peuvent être une opportunité pour planter des dérobées fourragères afin de compléter les stocks. Voici les principales espèces adaptées à une implantation de début d'été pour une valorisation en début d'automne :

Le moha : en pur (25 kg/ha) ou associé à du trèfle d'Alexandrie (20 kg de moha et 10 kg de trèfle d'Alexandrie). C'est une culture assez résistante à la sécheresse, productive (3 à 5 tonnes de MS/ha selon la pluviométrie) et qui peut-être récoltée sous forme de foin ou d'enrubannage. L'association avec du trèfle d'Alexandrie est possible mais va augmenter le coût de semence sans garantie d'un rendement supérieur à un moha seul. Prévoir un apport de 30 unités d'azote après la levée.

Le millet perlé : Il présente des caractéristiques proches du moha mais avec un cycle végétatif un peu plus long (environ 100 jours). Le millet peut aussi bien être enrubanné que pâturé. Comme le moha, ce fourrage permet de sécuriser le volume de fourrage mais sa valeur alimentaire reste cependant moyenne.

Le sorgho fourrager mult coupe hybride ou sudan grass : semé en pur, à 25 kg/ha, il présente un meilleur potentiel de rendement et une meilleure valeur alimentaire que les précédents mais il a une implantation un peu plus lente. Il a également la faculté de repousser et donc de produire une seconde coupe en automne, si les conditions sont favorables. La récolte en enrubannage ou ensilage est à privilégier. Le pâturage nécessite quelques précautions car la plante présente un risque de toxicité.

Une implantation la plus tôt possible après moisson, dès la paille ramassée, permet de profiter de la fraîcheur du sol et ainsi d'obtenir des levées rapides, indispensables à la réussite de ces cultures.