

POINT FOURRAGES

Conseil collectif à destination des éleveurs de la Nièvre

Des conseillers à votre écoute

Contact bureau Nevers
03 86 93 40 60
elevage@nievre.chambagri.fr



PROagri
POUR VOUS. AUJOURD'HUI. ET DEMAIN

Avec le soutien financier de :

**RÉGION
BOURGOGNE
FRANCHE
COMTÉ**

Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR
**MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE**
Léonard
Cyprien
Félicien

**CHAMBRE
D'AGRICULTURE
NIÈVRE**


Le manque d'eau associé à des températures élevées freine fortement voire stoppe la pousse de l'herbe (pour rappel, la plupart des graminées cessent leur croissance lorsque les températures sont supérieures à 22°C ; à l'inverse, la luzerne a son optimum de pousse aux alentours de 28°C).

Malgré l'agrandissement des surfaces en pâturage permis grâce aux prairies fauchées, les stocks sur pieds sont faibles à très faibles et certains lots doivent d'ores et déjà être affouragés.

Afin de limiter la redistribution estivale, quelques leviers peuvent être activés :

→ Sevrage précoce des veaux : les veaux nés à l'automne peuvent être sevrés dès à présent. Les besoins alimentaires des mères seront alors moindres. S'ils ne le sont pas, les veaux les plus jeunes peuvent être complémentés : cela soulagera les mères et permettra d'avancer la date de sevrage.

→ Détection précoce des vaches vides : la réalisation de constats de gestation permet d'anticiper la vente des vaches vides et ainsi de limiter le nombre d'animaux à affourrager.



Dans tous les cas, attention à ne pas faire pâturer trop ras : mieux vaut serrer les animaux sur des petites surfaces afin de favoriser les repousses lors du retour des précipitations. Le surpâturage est le premier facteur de dégradation de la flore des prairies permanentes.



Réaliser dès maintenant son bilan fourrager

Les récoltes de fourrage étant maintenant terminées, il est temps de réaliser son bilan fourrager : quantité de matière sèche récoltée + report de stock disponible, afin de connaître son stock de sécurité et d'anticiper dès à présent l'éventuel besoin en fourrages pour l'hiver prochain. La consommation quotidienne de fourrage par UGB est égale à 14 kg de matière sèche.

Les conseillers de l'équipe élevage sont là pour vous accompagner :

Bovins allaitants, nord du département : Charles Duvignaud – Corbigny – 06 33 27 02 60

Bovins allaitants, sud du département : Christophe Dagouneau – Moulins-Engilbert – 06 33 63 91 32

Bovins laitiers, caprins : Benoît Giroud – Nevers – 06 76 09 01 38

Ovins : Christophe Rainon – Corbigny – 06 72 39 76 43



Ovins : vigilance Haemonchoses et myiases

Les conditions orageuses des dernières heures doivent inciter les détenteurs de petits ruminants à une forte vigilance durant les prochains jours. Le risque d'infestation par *Haemonchus contortus* sera particulièrement élevé. L'infestation des animaux par ce nématode peut se révéler mortelle.

Signes à surveiller :

- Gonflement sous la mâchoire inférieure
- Pâleur des muqueuses oculaires
- Mortalité soudaine
- Animal qui s'isole du reste du troupeau

Ce dernier point peut également signifier la présence de myiases. La présence de myiases sur un ovin doit entraîner une réponse immédiate. Vouloir reporter au lendemain, c'est être sûr que l'animal ne s'en sortira pas. Plus le traitement est effectué tôt, plus l'animal a de chance d'en réchapper. Une vigilance particulière est à apporter aux animaux non tondus récemment.