



SOMMAIRE

1. Colza, levée en condition sèche
2. Tournesol, observations à l'approche de la récolte
3. Préconisation variétale blé
4. Quels couverts à semer maintenant ?
5. Salon Tech&Bio

AGENDA

Bilan de campagne

Vendredi 5 septembre 9h
à Beauvais (60)

Lundi 15 septembre
14h à Sennevieres (60)

Salon Tech'n Bio

24 & 25 septembre
à Bourg-les-Valence (26)

Le clin d'œil météo

« S'il tonne encore en septembre, à Noël la neige sera haute »

OBSERVATIONS ET CONSEILS

1. Colza, levée en condition sèche et prochain désherbage

Les premiers semis de colza réalisés mi-août parviennent progressivement au stade 2-3 feuilles vraies.

Au Plessier sur Bulles (60), en dépit d'une implantation réalisée au semoir monograine, le temps sec occasionne des levées partielles et une hétérogénéité de stade entre plantes, dont il faut tenir compte pour désherber. La parcelle commence à se salir (levée de graminées, quelques chénopodes) principalement et logiquement dans les zones où la levée est plus régulière !



Variété hybride HOSTINE – semis 16 août
colza associé avec féverole et fenugrec

Zone levée irrégulière	14 pieds/m ²	Stade cotylédons à 2 feuilles
Zone levée homogène	27 pieds/m ²	Colza à 2 feuilles



Hétérogénéité des colzas en zone plus motteuse

Concernant le désherbage, à partir du stade 2 feuilles du colza le passage à la herse étrille à câble est possible, à une vitesse de 3km/h environ et une agressivité limitée. Dans les situations de levée irrégulière, la bineuse est souvent préférable en premier passage car pas impactante pour le colza. La herse étrille permettra dans cette situation de gérer les adventices sur le rang dans un second temps.

La houe rotative peut également être utilisée en désherbage en plein, avec une bonne sélectivité mais une efficacité moindre, surtout dans des sols à surface grumeleuse.

Pour rappel, vous trouverez ci-dessous les préconisations Terres Inovia pour le désherbage mécanique du colza :


	Post-semis/ prélevée	Post-semis germé	Cotylédons	1 feuille	2 feuilles	3 feuilles	4 feuilles	5 feuilles à reprise de végétation
Houe rotative*	15 km/h (1)	15 km/h (1)		10 km/h		10 à 15 km/h (2)		10 à 15 km/h (2)
Herse étrille*	8 km/h ••	8 km/h ••			3 km/h • (3)	3 à 5 km/h •• (3)	5 à 8 km/h ••• à ••••	
Bineuse					3 km/h (4)	3 à 4 km/h (4)	5 à 6 km/h	

Gilles SALITOT et Pierre DURAND


2. Tournesol, observations à l'approche de la récolte

Dans le sud des Hauts-de-France, les tournesols semés à partir de la mi-avril sont désormais proches de la maturité. Terres Inovia publie les dates prévisionnelles de la récolte en fonction de la date de semis et des cumuls de températures selon les données de Météo France. Les calculs sont les résultats du cumul depuis la date de semis jusqu'au 18/08/2025 + des moyennes fréquentielles jusqu'à la récolte (moyenne de 2015 à 2024). Voici les cartes publiées pour cette année :

Période de récolte estimée pour un **semis du 20 avril**



Période de récolte estimée pour un **semis du 05 mai**



Pour rappel, le stade d'humidité du grain doit être de 9% pour la commercialisation. Les photos ci-dessous permettent d'estimer visuellement le stade optimal. Il n'est pas nécessaire d'attendre la maturité complète des cannes pour récolter. Suivez bien vos parcelles afin de ne pas laisser passer les créneaux météo !



Cette année dans l'Oise on a pu observer des parcelles avec maladies comme le montre la photo.



Mais la parcelle présente également des dépérissements plus sévères sur des pieds attaqués au collet (présence de macrophomina possible) avec des pertes de rendement estimées à 15 – 20 %

Il est possible d'identifier sur la parcelle, des pieds présentant des taches distinctives du phoma (peu nuisible à ce stade).

Vue sur parcelle à Valdampierre



Phoma sur tige



Pied totalement desséché

Alain LECAT et Gilles SALITOT

3. Préconisations variétales des blés tendres

Les bilans de campagne se sont effectués dernièrement dans nos différents départements. Nous avons pu retenir que la sécheresse printanière a pu impacter les résultats de cette année.

En effet, le mois d'octobre pluvieux, a incité à anticiper les semis de céréales sur des sols durs et motteux et se sont poursuivis dans de bonnes conditions de début novembre jusque décembre. Ceci dit, **les lits de semence grossiers ont pu engendrer des pertes à la levée parfois importantes.**

Les reliquats de cette campagne sont faibles **limitant le potentiel des parcelles** concernées dû à la pluviométrie élevée en janvier.

Au printemps, **le tallage des céréales a été impacté** par la sécheresse printanière. L'absence de pluie a permis une **situation sanitaire très saine** dans la plupart des parcelles.

Enfin, la météo de cette campagne a avancé le stade de développement des cultures. La moisson s'est faite sur la première quinzaine de juillet puis début août, après un épisode pluvieux qui a pénalisé la qualité.


Le **réseau Expébio** permet d'obtenir une synthèse de la région Grand Nord sur les résultats pluriannuels depuis 2003 :

Expébio
Le réseau céréales bio

Relation Protéines/Rendement Essais blé tendre BIO - Région Grand Nord 2003-2025

Variétés présentes dans au moins 6 essais

--- IsoNabs Grain moyen IsoNabs Grain +/- 5 kg/ha



() : 1 seule année d'essais, positionnement à confirmer

Sources des données : Expébio (post-inscription), CTPS/GEVES (inscription)

● Variétés présentes dans les essais 2025

D'après les résultats obtenus, nous préconisons les variétés suivantes :

Qualité meunière	1 ^{er} choix	2 ^{ème} choix	A essayer	En retrait
Améliorantes	MOSSETTE (alt)	BODELI CAMINADA ALESSIO	SPINAS CAMILLUS	TOGANO
Compromis qualité-rendement	SU TARRAFAL GENY	PHILDOR CHRISTOPH		
Potentiel	RGT CAPEXO GWENN	LENNOX (alt) GERGOVIE		

MOSSETTE confirme son statut de variété qualitative avec l'avantage d'être alternative. BODELI, CAMINADA et ALESSIO ont de meilleurs potentiels que TOGANO qui est maintenant en retrait depuis quelques années. Les variétés SPINAS et CAMILLUS sont encore à tester les années suivantes afin de confirmer leur potentiel.

SU TARRAFAL et GENY restent les meilleurs choix en variétés de compromis. PHILDOR et CHRISTOPH sont tout de même de bons choix en variétés de compromis, ainsi que LENNOX.

GWENN et RGT CAPEXO font maintenant partie des valeurs sûres en variétés productives.

L'intégralité de nos résultats d'essais vous seront communiqués par la suite sur le site de la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France.

Clémence LECLERCQ

4. Quels couverts végétaux à semer maintenant ?

La réglementation zones vulnérables (7^{ème} programme d'action, 2024) impose une **date limite d'implantation des couverts au 20/09** et une destruction au plus tôt le 01/11 ; avec 8 semaines de présence minimum du couvert. Si le couvert monte à floraison ou à graine, il est possible de faucher ou broyer la partie aérienne avant le 01/11 mais à l'issue des 8 semaines de présence du couvert.

A cette date, le choix des espèces à planter doit être ajusté. Ainsi, si vous voulez planter des légumineuses privilégiez les pois, féveroles, vesces. Le trèfle incarnat est le seul possible à cette époque car il a une croissance hivernale. Pensez à associer les légumineuses à des graminées et crucifères.

Rappel des doses en pur et de la profondeur de semis pour différentes espèces.

Espèces	Densité en pur (kg)	Profondeur semis	Famille	Resistance au gel
Avoine de ptps	80	2 à 3 cm	Graminée	S
Seigle d'hiver	85	1 à 2 cm	Graminée	R
Pois fourrager	70	3 à 4 cm	Légumineuse	S
Féverole (selon PMG)	150 -200	3 à 6 cm	Légumineuse	I
Trèfle Incarnat	13,5	1 à 2 cm	Légumineuse	R
Vesce pourpre ou commune	40	2 à 4 cm	Légumineuse	S
Phacélie	8	2 à 3 cm	Hydrophyllacée	I
Moutarde d'Abyssinie	9	1 cm	Brassicacée	R
Radis	9	1 cm	Brassicaceae	R
Moutarde blanche tardive	9	1 cm	Brassicaceae	I

Pour les mélanges : la règle est d'associer les différentes espèces en tenant compte de la dose de semis de chaque espèce en pur et de diviser par le nombre d'espèces présentes dans le mélange.

Pour établir un choix Utilisez

[l'outil d'Agro transfert](#)

Voici deux exemples de mélange à planter début septembre avant votre culture de printemps :

- Avant maïs : Moutarde 3 kg + Féverole 100 kg ou Trèfle incarnat 12 kg
- Avant protéagineux de printemps : Moutarde ou radis 3 kg + Phacélie 3 kg + Avoine 27 kg

Mégane PERCHE-GUILLAUME

5. Retrouvez le salon Tech & Bio les 24 & 25 septembre à Bourg les Valence

Tech&Bio est LE salon professionnel dédié à l'Agriculture Biologique, où agriculteurs, experts et décideurs politiques, peuvent se rencontrer, échanger et découvrir les dernières innovations du secteur. C'est aussi des dizaines de conférences, des centaines d'ateliers et démonstrations et 375 exposants venant présenter leurs dernières innovations. [TOUTES LES INFOS ICI](#)



Bulletin rédigé par les conseillers du groupe régional « Agriculture Biologique » des Chambres d'agriculture des Hauts de France. En cas d'usage d'un produit disposant d'une AMM et autorisé en AB, référez-vous à l'étiquette et vérifiez les usages sur le site e-phy. Plus d'informations sur l'agriculture biologique sur www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr. Coordination et renseignements : Mégane PERCHE-GUILLAUME megane.guillaume@npdc.chambagri.fr (59 –62) et Gilles SALITOT : 03 44 11 44 65 – gilles.salitot@oise.chambagri.fr (départements 02, 60 et 80) - Reproduction interdite – Les Chambres d'agriculture sont agréées par le Ministère de l'Agriculture pour leur activité de conseil indépendant à l'utilisation des produits phytosanitaires. N° d'agrément: IF 01762 (CA 02 et CA 60) – PI 00740 (CA 80) – NC00815 (CA NPDC)

Avec le soutien financier de

