

POINT FOURRAGES

Conseil collectif
à destination des
éleveurs de la Nièvre

Des conseillers à votre écoute

Contact bureau Nevers
03 86 93 40 60
elevage@nievre.chambagri.fr



PROagri
POUR VOUS. AUJOURD'HUI. ET DEMAIN

Avec le soutien financier de :

RÉGION
BOURGOGNE
FRANCHE
COMTÉ

Avec la contribution
financière du compte
d'affectation spéciale
développement
agricole et rural
CASDAR
L'État
L'Europe
Régions



CHAMBRE
D'AGRICULTURE
NIÈVRE



Pâturage d'automne

Après une fin de semaine dernière estivale, favorable à la pousse, cette semaine, plus humide et plus froide, a quelque peu ralenti la production d'herbe. Le retour de la douceur annoncé pour la semaine prochaine devrait permettre une nouvelle accélération de la croissance de l'herbe. Les prairies sont globalement bien fournies en herbe et le pâturage a pu reprendre le dessus sur la consommation de fourrage conservé.

L'herbe d'automne présente des valeurs alimentaires proches de celle du printemps (équivalente en azote mais légèrement inférieure en énergie) et s'avère ainsi être un fourrage intéressant à valoriser, par exemple sur des laitons fraîchement sevrés en leur assurant des croissances comprises entre 600 et 800 grammes par jour. Attention cependant, cette herbe est riche en eau, ce qui peut se traduire par un encombrement important qui va limiter l'ingestion. Dans ce cas de figure, un apport complémentaire de céréales (environ 1 kg/animal/jour) peut s'avérer nécessaire, ainsi que du foin pour ralentir le transit.



Implantation des méteils

La fin du mois de septembre s'annonce plus ensoleillée. Les semis de méteils vont pouvoir démarrer dès le retour de conditions plus favorables. S'il est encore possible de semer des prairies à implantation rapide (ray-grass italien ou hybride), les prairies à base d'espèces à implantation lente (dactyle, fétuque élevée, luzerne..) doivent maintenant être semées sous un couvert de méteil afin d'être protégées durant l'hiver.

En cas de semis simultané de méteil et de prairie, il est possible de le réaliser en un ou deux passages. Dans ce dernier cas, prévoir de semer le méteil en premier, à une profondeur d'environ 4 cm puis la prairie dans un second temps, à 1 cm de profondeur maximum. En cas de semis simultané, choisir une profondeur de semis intermédiaire (entre 2 et 3 cm) et homogénéiser régulièrement les semences dans la trémie du semoir afin d'éviter qu'elles ne se trient.

Les méteils semés seuls (sans prairies) permettront l'implantation d'une seconde culture à la suite de leur récolte au printemps prochain



Ensilage des sorghos monocoupes

Les sorghos monocoupes ont des cycles de végétation compris entre 4 et 5 mois. Pour les variétés qui contiennent du grain, la récolte doit intervenir lorsque les grains sont au stade laiteux-pâteux, de manière à viser une teneur en matière sèche de 28%. Une teneur en matière sèche inférieure va dégrader la valeur alimentaire du fourrage récolté (perte essentiellement par les jus). À l'inverse, avec une teneur en matière sèche trop élevée (supérieure à 32%) la digestibilité de la cellulose et de l'amidon chute rapidement. La qualité de fermentation du silo et donc la conservation risquent également d'être impactées.