

COLZA - CARACTERISTIQUES DE LA CAMPAGNE 2024-2025

TARN	Juillet-Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	L'avis de la CA81	
Faits marquants météo	Alternance de 3 semaines humides et fraîches puis 3 semaines chaudes et sèches puis retour des orages à partir du 15/08/24		Automne très doux. Plusieurs gros épisodes pluvieux entre mi-octobre et mi-novembre.			Un début de printemps alternant périodes sèches et quelques pluies. Une vague de froid fin janvier, puis des températures relativement douces. De forts épisodes de vent en mars + faible ensoleillement (giboulées). 1ère quinzaine d'avril sèche.			Période pluvieuse + 2 gros épisodes orageux les 4 et 19 mai : très forte pluviométrie (érosion) + grêle localement.		Fin de cycle et moissons sèches et très chaudes (10j avec maxi >35°C entre le 10/06 et le 01/07)		Les ressources en eau sont excédentaires une bonne partie du cycle mais avec des périodes plus sèches contribuant en partie au ressuyage régulier des parcelles. Des températures dans l'ensemble plus douces que la normale et une campagne qui se termine par une vague de chaleur. A noter des événements climatiques extrêmes nombreux cette année (gros cumuls d'eau en peu de temps, grêle, vent fort et longtemps...).	
Travaux	Les moissons des céréales réalisées en conditions humides ont souvent tassé, compacté les sols. Restructuration indispensable mais sols frais en profondeur une bonne partie de l'été 24 ne donnant pas toujours un bon résultat.					Bons crèneaux pour fertilisation N-S							Récoltes parmi les plus précoces dans de très bonnes conditions. Le salissement important de certaines parcelles a ralenti le débit horaire et	Hormis les restructurations profondes impossibles ou moyennement réussies, les travaux culturaux se sont déroulés en bonnes conditions jusqu'à la récolte (herbicide avec humidité, engrais et pluie, amplitudes thermiques limitées pour les applications sortie hiver...)
	Météo estivale idéale pour pratiquer des faux semis et éliminer une partie du stock grainier conséquent, mais parfois des difficultés à venir à		Interventions de désherbage en post et insecticides pas toujours simple avec les pluies et les sols parfois très mous, mais les 1ers passages tracteurs ont assez bien "tracé les rails"											
	La majorité des semis se sont déroulés dans la semaine du 26/08 au 01/09/25. Quelques uns plus précoces < 15/08 et d'autre sur septembre.													
Physiologie	Beaucoup de colzas lèvent tôt (fin 08/ déb 09) et poussent vite. Ils ont souvent déjà 4 feuilles à l'arrivée des ravageurs d'automne.		Grâce à la douceur automnale, les colzas atteignent rapidement des biomasses élevées et parfois des questionnements sur l'élongation précoce, sans conséquences.		Qqls situations d'asphyxie racinaire dans les parcelles où l'eau s'évacue mal		A la faveur des températures douces et de l'allongement de la durée d'ensoleillement, les colzas rentrent dans une phase de croissance active.		Floraison franche et vigoureuse entre le 25/03 et le 15/04. Période la plus sèche du cycle (début stress hydrique sur les colzas chétifs) mais pluie de		Pour une fois depuis qqls années : absence de gelées tardives !		Cycle du colza presque idéal : hormis les excès d'eau et le coup de chaud de fin de cycle, toutes les conditions ont été réunies pour assurer au colza un développement optimum.	
			Mais régression également rapides et importantes (voir ci-dessous azote)								Remplissage dans de très bonnes conditions mais chaleurs importantes en fin de cycle semblent avoir "saisi" les cultures (impact			
Azote / soufre / phosphore	Exigeant en phosphore, notamment au stade 5-6 feuilles, beaucoup d'apport (NP) désormais au semis du colza portent leurs fruits. Attention malgré tout à ce que la dose totale de phosphore apportée				Pertes de biomasse importantes notées dans un certain nombre de parcelles entre entrée hiver (exubérantes > 2,5kgMV/m²) et sortie hiver (souvent <1kgMV/m²). Plusieurs explications : épuisement des reliquats, climat moins poussant, pression oidium. Mais perte sans conséquence qui invite à piloter sa fertilisation azotée avec Mes Satimages où avec des pesées de matières vertes		200ha de colza pilotés avec Mes Satimages (prestation chambre d'agriculture du Tarn) avec un conseil		Malgré une fertilisation optimisée du colza en azote, une part plus ou moins importante de l'apport peut se montrer inefficace, si un autre élément comme le phosphore se montre limitant : rattrapage possible				Nouveauté ZV 24 : Possibilité (sous conditions) d'apporter 30 u entre le 01/09 et 15/10 pour favoriser le développement du colza et mieux résister aux ravageurs. Formes d'engrais N-S: attention aux % parfois déséquilibrées qui font apporter souvent trop de N et pas assez de S (besoin 75U); optez pour du sulfate d'ammoniaque pour le 1er passage (21N-60S)	
							Contexte climatique a permis une bonne valorisation des apports azotés ce printemps. Apports fractionnés en 2-3 passages.							
Adventices	Fort salissement adventices (graminées) avec les pluies à répétition puis la chaleur. Des faux semis réussis puis complétés en dernier passage par du glyphosate et/ou de napropamide au semis pour démarrer la campagne sur un		Rares crèneaux pour biner mais quelques jours disponibles notamment dans les terres légères										Salissement marqué depuis plusieurs années avec en hausse le ray-grass, la folle avoine mais aussi les matricaires, laitersons, coquelicots, gaillets, chardon marie, crucifères sauvages et enfin vivaces (chardons...). La maîtrise de l'enherbement reste le point critique de l'ITK et impose d'activer tous les leviers agronomiques, chimiques et mécaniques.	
			Avec leurs spectres qui s'élargissent, les désherbages 100% post sont désormais majoritaires (moins chers que les racinaires au semis avec l'assurance que le colza est sauvé + simplicité de		KERB FLO tardif pas toujours efficace (graminées trop denses)									
Maladies									Globalement, la période à risque "chute des 1ers pétales" a été observée fin mars début avril, dans une période poussante et plutôt douce, sans pluie. Risque sclérotinia limité.		Oidium : la météo a favorisé le développement du mycélium en fin de cycle. De nombreuses parcelles ont été concernées en mai, toutefois, ces symptômes ont peu atteint les siliques, et l'incidence sur le rendement semble limité (pression oidium en hausse dans les parcelles ces 3		Plus d'impasses fongicides ont été réalisées cette année. Mais ne pas traiter ou intervenir en curatif reste délicat sur le colza. Donc probablement des traitements peu à pas utiles par précaution ou mal positionnés. A développer : un meilleur pilotage des impasses (OAD, suivi terrain choix variétal) et l'intégration des biocontrôles dans les programmes (nouveautés à venir plus efficaces?)	
Insectes	Plutôt discrètes ces dernières années, les conditions d'humidité de début de cycle sont propices à l'activités des limaces notamment quand résidus pailleux ou mottes. Des dégâts mais souvent limités car les plantules sortent vite de la période de risque (4 feuilles).		Le vol de grosses altises a débuté vers le 20/09/25 en s'intensifiant fin sept. début oct. et dans la majorité des situations, les colzas sont bien développés et ne craignent plus les dégâts foliaires. Quelques rares situations peuvent néanmoins nécessiter		Charançon du bourgeon terminal : vol étalé et plus précoce d'environ une à deux semaines par rapport aux tendances pluriannuelles (1ers piégeages vers le 15-20/10/25). Toutefois, grâce aux conditions poussantes et des colzas très bien développés, les dégâts sont rares et concernent uniquement des colzas chétifs.		Charançon de la tige : soleil et douceur autour du 15-20/02/25 = conditions de vols idéales et captures significatives en début de stade sensible du colza mais aucun dégât à déplorer.		Surveillance rigoureuse du risque méligèthes très présents en 2024 mais finalement beaucoup plus discret cette année probablement en partie grâce à une floraison massive qui a dilué la pression. Ponctuellement des dégâts sur colzas chétifs.		Pucerons cendrés et charançons des siliques : toujours discrets, des infestations liées aux PC ont pu ponctuellement être importantes et nuisibles.		Fait marquant 2025 : pression ravageurs plutôt bien contenue cette année. Les colzas robustes et bien enracinés confirment leur "résilience" face à la pression. Pensez aux outils "Risques altise adulte" et "Prédiction des vols de charançons". En accès gratuit, ils permettent d'évaluer le risque et ainsi de vous aider à prendre les bonnes décisions techniques tout en évitant les traitements inutiles. Perspectives biocontrôle accompagnant le plan de sortie du phosmet : des solutions testées contre les GA (non autorisées à ce jour) à base de sels d'acides gras et à base de soufre se sont avérés les plus efficaces parmi les différentes solutions testées...à suivre et à confirmer	
	La petite altise a pu causer qqls dégâts car pour une fois les colzas ont levé tôt. Mais les conditions poussantes ont rapidement éloigné le risque.		Larves défoliatrices (tenthrèdes et héliothis) discrètes mais ponctuellement dégâts importants et soudains.											
Analyse globale et résultats	Même rendement qu'en 2024. Moyenne tarnaise (en cours de consolidation) proche de 33q/ha sur un échantillon de 45 agriculteurs (mini 20 maxi 48q/ha). Des résultats au dessus de la moyenne triennale (28q/ha sur 2022-2024). Le climat 2025 a plutôt bien accompagné les colzas qu'on attendait bons. Ils confirment et la plupart du temps, quand ils sont bien implantés (structure, date de semis, sans rupture d'alimentation azotée) le résultat est au RDV. Les rendements minimum s'expliquent souvent par des situations hydromorphes, du tassement, des dates de semis trop tardives et/ou un manque de fertilité de sol limitant voire bloquant le développement du colza. Bien entendu, il faut aussi prendre en compte la variabilité lié au type de sol et l'hétérogénéité intra-parcellaire.												CA81 participe au comité de rédaction du Bulletin de Santé du Végétal ainsi qu'aux observations hebdomadaires de plusieurs parcelles tarnaises	