

Groupe 30 000 raisin de table

Réunion du 18 Mars 2025

TERRES d'AVENIR

ÉCOPHYTO
30 000 | RÉDUIRE ET AMÉLIORER
L'UTILISATION DES PHYTOS



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**
*Liberté
Égalité
Fraternité*

eau
GRAND SUD-OUEST
AGENCE DE L'EAU ADOUR-GARONNE


Avec
la contribution
financière du compte
d'affectation spéciale
développement
agricole et rural
CASDAR


**MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE**
*Liberté
Égalité
Fraternité*

Bilan climatique 2024



Moissac- graphique ombrothermique



Faits marquants de 2024




- Gelées printanières en avril
- Année chaude (>normales 11 mois/12)
et humide (Cumul 900mm +40%)
- Pression mildiou importante en mai (120mm) et Black Rot
présent mais au second plan
- Dégâts de thrips et araignées jaunes sur les secteurs
habituels
- Maladies du bois modérées.
- Maturité relativement tardive. Pluie et froid en septembre.
Verdissement raisin.
- Pluie et Botrytis à la récolte.
- Perte de récolte assez importante


Synthèse des épisodes contaminants de la campagne 2024 sur le secteur du Moissagais



Chronologie des contaminations mildiou et de l'extériorisation des symptômes



Conditions climatiques durant l'essai



MILDIOU



Une fois que le mildiou est entré dans la feuille par les stomates, il est impossible de l'impacter (traitements préventifs).

La pulvérisation doit atteindre sa cible pour être efficace.

Le côté opposé au traitement ne reçoit que 30% de la bouillie.

MILDIOU



Importance de resserrer les cadences dans un contexte de forte pression. Et ce d'autant plus pour les produits de contact.

Les molécules systémiques ne migrent pas au-delà d'une croissance de trois feuilles.

Alterner les matières actives afin d'éviter les résistances.

Résultat moyen 2024



IFT chimique conventionnel moyen du groupe :

2024 : de 26,14 à 11,45

IFT biocontrôle moyen du groupe :

2024 : de 2,46 à 8,18

Test bêche



Critère de notation	Score	Remarques
1 - État de surface		Surface peu - 10/10
2 - Type		
végétation couvrant		
surface (0-10)		
type		
végétation couvrant		
surface (10-15)		
type		
végétation couvrant		
surface (15-20)		
type		
végétation couvrant		
surface (20-25)		
type		
végétation couvrant		
surface (25-30)		
type		
végétation couvrant		
surface (30-35)		
type		
végétation couvrant		
surface (35-40)		
type		
végétation couvrant		
surface (40-45)		
type		
végétation couvrant		
surface (45-50)		
type		
végétation couvrant		









- Pas de racines déformées
- Présence de trous et de porosités dans le sol, signe d'activité et de vie
- Couleur et odeur du sol bonne dans toutes les exploitations
- Compacité et forme des agrégats : assez diversifié selon la composition du sol mais sans autres effets négatifs sur les autres critères du sol ni sur la vigne et la qualité de la production en elles-mêmes
- Un seul cas où il a été proposé de labourer moins profond

Réflexion et/ou propositions 2025

Hydroseeding et couvert sur le rang
Bâche anti pluie
Cout et forme de conduite