


Différents leviers d'adaptation face au changement climatique

Une nouvelle courbe de pousse de l'herbe



Projection Climalait Bretagne 2020



Effet de 3h de pâturage hivernal sur les performances d'un troupeau de VL bio

- Dimitri BENOIT, Valérie BROCARD, Claire CARAËS
- Mémoire de fin d'études de Paul Irien



Des hivers doux et humides



4 mois d'hiver Novembre à Février	Année 1 2022- 2023	Année 2 2023-2024	Année 3 2024-2025
Pluviométrie cumulée (en mm)	691	734	518
Jours sans sortie au pâturage (cumul pluie +)	4	7	6
Jours de gel (T°< 0°C)	19 jours	11 jours	11 jours



Sortie au pâturage de 90 jours sur 100 jours en hiver malgré les conditions très humides

Trévarez : moyenne annuelle 1225 mm/an



3

Dispositif expérimental au pâturage



TRÉVAREZ BIO

11 ha de prairie en hiver


Tournant : 2 tours

Tour 1



25 VL

paddock de 0,5 ha
Fil avant 2 j



Chargement instantané
de 75 vaches/ha puis
38 vaches/ha

Tour 2




18 VL

1j par paddock de 0,5
ha



Parcellaire de l'essai



■ Parcelles
← Zones témoins
— Séparation entre deux paddocks



Dispositif expérimental



• Mesures

- Pousse de l'herbe
- Composition floristique
- Valeurs alimentaires
- Densité
- Evaluation du piétinement (traces de pattes, % sol nu)
- Hauteurs entrée et sortie
- Ingestion au pâturage (Herbvalo)



Une herbe d'hiver de qualité

MAT
180 à 200
g/kgMS

UFL
0,82 KgMS

DMO
67%

Densité
255
kgMS/ha/cm

MS
14,8%

PDI
90 g/kg MS




➤ riche en graminées



Pousse de l'herbe d'hiver :

- **Faible mais non négligeable**




Croissance moyenne = **4kg MS/ha/j** (de 0 à 10)

- Soit **360 kg MS/ ha** sur les 3 mois d'hiver étudiés (mi-nov à mi-février)



Le pâturage hivernal a-t-il un effet sur la prairie ?

Comparaison de la croissance des **zones pâturées** (PP) et **témoins** (ZT) au printemps, moyenne 3 hivers




Mais un rendement équivalent

Fin mars :

Non pâturé

Pâturé



280 kg MS/ha en moins dans
les zones pâturées par
rapport aux témoins

Mais une ingestion d'herbe
pendant l'hiver estimée
(Herb'Valo) à
310 kg MS/ha

+ une pousse équivalente (même au bout de 3 ans sur
les mêmes parcelles)


Donc pas d'effet sur le rendement annuel



Le pâturage hivernal a-t-il un effet sur la prairie ?

- **Pas d'effet négatif sur le taux de légumineuses**

Composition floristique au printemps, moyenne 3 hivers



Effet du pâturage hivernal sur l'état du couvert

- **Attention : peu de pression piétinement sur les parcelles**

1

Temps de
présence faible
(3h/j)

2

Vaches légères
(500-650 kg PV)




3

Chargement
instantané : 75
puis 38 vaches/ha



Le pâturage hivernal n'a pas dégradé les prairies

Evolution de la proportion de sol nu dans les parcelles étudiées au fur et à mesure de l'hiver



Augmentation du sol nu au cours de l'hiver

Niveau similaire au printemps avec les ZT



A retenir, dans les conditions de l'essai

L'herbe d'hiver a de bonnes valeurs alimentaires
(au - les protéines : 20% MAT)

Le pâturage hivernal ne dégrade pas la prairie (rendement annuel égal, pas d'apparition de trous et composition floristique stable)



Mais un retard
de pousse de
2 semaines au
printemps



Avec une
pression
piétinement
faible

Dispositif expérimental – 3 hivers

- **2 lots de 25 vaches croisées Hol x No x Je**, conduite en agriculture biologique
- 40 % primipares (vêlages printemps et automne)
- Ration complète distribuée à l'auge
- Traite robotisée
- **Objectif 3h de pâturage avant accès à la ration**
- **10 semaines d'essai de fin novembre à février**




« Menu hivernal »

- 5 kg MS d'ensilage de maïs
- ~ 8 kg MS d'ensilage d'herbe
- 1,5 kg MS d'enrubannage de luzerne
- 2,5 kg MS de méteil grain (triticale/avoine/pois)
- Lot expérimental :
+ **3 heures** de pâturage par jour



Avec 3 h d'accès au pâturage par jour :

Consommation moyenne 3 hivers (kg MS/VL/j)



➤ **+2,6 kg MS d'ingestion d'herbe**
pâturée par vache en 3h
(méthode Herbvalo)

➤ **Une faible économie en**
fourrages (- 1 kg MS d'ingestion
d'ensilage d'herbe)

➤ Un meilleur équilibre énergie
azote avec l'herbe pâturée



➤ **Témoin**


Expé



UFL/ kg MS



PDI/UFL



Effet positif sur les performances animales



- Une **production laitière supérieure de 1,8 kg** par vache par jour pour le lot avec pâturage lors des deux premiers hivers
Pas d'effet le 3ème hiver



- **Pas d'effet sur les taux, le poids, la NEC et la santé des animaux**
- Les primipares et les multipares réagissent de façon identique



- Pour les deux premiers hivers :
Un gain de la **marge sur coût alimentaire + 2100 €/mois** pour un troupeau de 75 VL avec 3h de pâturage/jour

Pas d'effet le troisième hiver



Pâturage hivernal : Une pratique validée



- Une opportunité à saisir dans le contexte du changement climatique
- 3h de pâturage par jour en conditions humides **ne dégradent pas la prairie au printemps** (flore, état, rendement)
- Des animaux qui pâturent en hiver **une herbe de qualité**
- Pour le troupeau : + d'ingestion + de lait 2 hivers sur 3 sans surcoût alimentaire



Nécessite des **chemins et aménagement parcellaire** de qualité

- Motivation des éleveurs de faire pâturer en conditions hivernales, temps de travail : Clotûre, fil avant, sortie des animaux...



Merci de votre attention à vos pâtures !



Pâturage hivernal



Contacts :

Claire CARAES, CAB

claire.caraes@bretagne.chambagri.fr

Valérie BROCARD, Idele

valerie.brocard@idele.fr

Dimitri BENOIT, CAB

dimitri.benoit@bretagne.chambagri.fr

En savoir plus

- <https://www.youtube.com/watch?v=HyytPrHNvc0&list=PLj52kxvdtXR7auUgRsJAzC-igYBIX963H>
- <https://www.farmxp.fr/nos-resumes-detude>
- <https://bretagne.chambres-agriculture.fr/detail-projet-rd/fermadapt-projet>
- https://opera-connaissances.chambres-agriculture.fr/doc_num.php?explnum_id=216541

