



GROUPEZ LES VÊLAGES EN FIN D'ÉTÉ

LEVIER D'ADAPTATION AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE



POURQUOI ?


Températures plus élevées, pluviométrie répartie différemment sur l'année... Le changement climatique va provoquer des modifications de pousse de l'herbe conséquentes, avec une baisse marquée en période estivale. Grouper les vêlages en fin d'été peut être une solution pour limiter les besoins en fourrage des vaches en lactation à cette période de l'année, tout en valorisant le rebond de pousse d'automne par le pâturage dans la ration.

COLLER A UNE NOUVELLE COURBE DE POUSSE DE L'HERBE

Avec le changement climatique, la pousse de l'herbe sera plus précoce et plus forte qu'auparavant au printemps, avec une saison qui démarrera plus rapidement en sortie d'hiver. Un arrêt de la pousse sera plus fréquent en été, en raison des températures élevées (> à 25°C) et un manque de pluviométrie. Le rebond de pousse de l'herbe à l'automne pourra être plus important, et la pousse hivernale sera plus élevée également. Faire vèler les animaux en fin d'été permet de bénéficier de cette repousse de bonne qualité et d'avoir des animaux à plus faibles besoins lors de la période la plus critique.



Viser une meilleure valorisation des prairies en groupant les vêlages




Simulation de modification de la pousse de l'herbe :
Courbes de croissance actuelle et à venir (Idele)

PRINCIPE DE LA TECHNIQUE

Plusieurs pré-requis et points de vigilance :

- Cette technique nécessite une bonne gestion de la reproduction, même si le groupage des vêlages peut être plus ou moins strict, de quelques semaines à 4 mois maximum.
- Les vêlages groupés facilitent la conduite des génisses de renouvellement en lots homogènes. Les équipements doivent être adaptés, avec des places en nurserie suffisantes pour faire face au pic de naissances, et du matériel approprié pour la distribution du lait. Les génisses doivent vèler à 24 mois, ce qui nécessite une situation sanitaire maîtrisée pour les veaux et de bonnes croissances pour les génisses. Le groupage des vêlages permet de faire un vide sanitaire dans la nurserie.



RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES

Dossier technique du CEDAPA
Grouper ses vêlages à l'automne
<https://www.cedapa.com/wp-content/uploads/2025/11/Referentiel-VGA-Integrale.pdf>

Projet Velbio: <https://rd-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/projets/detail-du-projet/velbio>



LEVIERS D'ADAPTATION AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE



RETOUR D'EXPERIENCE - GAEC DE KERDENIEL - (PLOUARZEL, ZONE SÉCHANTE 29)



Quentin Forest et Samuel Lars ont repris les exploitations de leurs pères respectifs et se sont associés et installés au 1er janvier 2026. Leur objectif est de stabiliser l'effectif de leur troupeau laitier à 100 VL et de livrer 750 à 800 000 L de lait à la laiterie, tout en préservant le groupage des vêlages en fin d'été, présent sur les deux troupeaux repris. Le système fourrager des vaches laitières est de 45 ares pâturés par VL.

Des vêlages groupés en fin d'été en réponse à de multiples objectifs

C'est en 1992, sur le site de Kerdeniel, où seront logées les vaches en lactation, que Paul, le père de Samuel, a commencé à grouper les vêlages au début du mois d'août : "Nous avons mis cela en place avec mon associé, car cela nous permettait de partir en vacances 15 jours chacun en juillet, sans avoir besoin de recourir au service de remplacement, la majorité des vaches étant tarées à cette période de l'année. Puis nous n'y avons vu que des avantages :"

Toutes les vaches sont au même stade de lactation, ce qui permet de travailler en ration complète, sans complémentation individuelle.

De plus, les changements de ration coïncident avec leur stade de lactation :

- Réouverture du silo de maïs début août, au moment des vêlages.
- Ration à base de maïs en hiver lorsque les VL sont dans leurs 1ers mois de lactation et en période d'IA.
- Fermeture du silo en avril lorsque les vaches sont pleines et en mois moyen plus avancé, avec une production de 25 L en 100 % herbe pâturée.
- Tarrisement lorsque la pousse de l'herbe ralentit et est de moindre qualité.

Les génisses sont élevées en lot unique par année d'âge, avec maximum 3 mois d'écart d'âge entre la plus âgée et la plus jeune.

Leur période de naissance permet de les sortir dès 6-7 mois et de valoriser beaucoup d'herbe pâturée dans leur alimentation.

La période de naissance des veaux, en été, est idéale. "Nous avons peu de soucis sanitaires l'été. La nurserie est lavée et désinfectée, et reste vide pendant 5 mois."

"Tout cela nous permet d'optimiser nos coûts alimentaires et vétérinaires, et de dégager de bons résultats économiques"

Un calendrier des tâches déterminé sur l'année

Alors que passer en vêlages étalés aurait été possible pour augmenter leur effectif moyen de vaches laitières, en optimisant les places en bâtiment en hiver, Samuel et Quentin ne renonceraient pour rien au monde à cette organisation. "Les vêlages groupés, c'est 3 mois de veaux, 3 mois d'IA, 3 mois de travaux des champs, et 3 mois de repos dans l'année", affirme Samuel. Quentin renchérit: "Le travail est très intense en fin d'été et à l'automne, lors des vêlages et de la phase lactée des veaux. En revanche, quel plaisir en fin de printemps, lorsque le silo de maïs est fermé, les vaches jour et nuit dehors, ainsi que les génisses. Il n'y a que la traite à faire et un peu de surveillance".

A S O N D J F M A M J J

Vêlages et phase lactée des veaux	Surveillance des chaleurs - IA	Mise à l'herbe	100 % herbe	Tarrisements
-----------------------------------	--------------------------------	----------------	-------------	--------------

← Silo de maïs fermé →

A RETENIR

Grouper les vêlages en fin d'été est intéressant pour limiter les besoins des vaches en période séchante, et réduire le recours aux stocks durant l'été. Cela permet de valoriser en démarrage de lactation le rebond de pousse de l'herbe de l'automne par le pâturage.

La mise en place de cette pratique nécessite d'être rigoureux sur la gestion de la reproduction, et également dans l'élevage des génisses de renouvellement pour atteindre un âge au 1er vêlage à 24 mois.

REDACTION

Catherine Lucas,
Guylaine Trou, Agathe Sergy
Chambre d'Agriculture de Bretagne

François Bienne
Institut de l'Elevage

Janvier 2026
Crédit photo : B. Godoc,
Gaec de Kerdeniel

Financeurs :

