




POINT FOURRAGES



Calendrier fourrager



Conseil collectif à destination des éleveurs de la Nièvre

Des conseillers à votre écoute

Contact bureau Nevers
03 86 93 40 60
elevage@nievre.chambagri.fr



PROagri

POUR VOUS. AUJOURD'HUI. ET DEMAIN

Avec le soutien financier de :

RÉGION
BOURGOGNE
FRANCHE
COMTE

Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

Labellisé
Qualité
Partenaires



Agro – Météo

« En agriculture, le mauvais temps, c'est celui qui dure... »

Le beau temps et la douceur se sont durablement installés sur l'ensemble du département. Conséquences, les sommes de température évoluent rapidement (entre 70 et 80°C cumulés par semaine) et les 300°C cumulés depuis le premier février seront vite atteints dans les secteurs les plus précoces.

Les hauteurs d'herbe dans les prairies sont hétérogènes : la pousse est dynamique dans les parcelles les plus profondes mais elle tend déjà à se ralentir sous l'effet du vent et du manque d'eau dans les sols les plus filtrants. Il faut profiter de ces conditions pour poursuivre la mise à l'herbe des bovins (laitonnes, génisses de deux ans et animaux de réforme) et des ovins (brebis suitées d'agneaux de plus de trois semaines).

Ces mises à l'herbe précoces vont permettre de déprimer les parcelles et d'économiser du fourrage.

Si la mise à l'herbe des vaches suitées n'est pas encore imminente, anticiper les interventions sur les animaux afin d'être prêts au moment venu (vaccinations, échographies,...).



Le déprimage

Le déprimage permet de faire pâturer des animaux (et donc d'économiser du fourrage) en mettant à disposition des animaux des parcelles qui ne leur seront plus destinées au printemps (prairies à récolter en foin ou destinées à être pâturées plus tard par d'autres catégories). Le déprimage présente plusieurs avantages :

- Il favorise l'accès à la lumière : les graminées talleront davantage et produiront plus de feuilles, les légumineuses vont redémarrer plus rapidement
- Il améliore la qualité floristique des prairies en freinant les espèces les plus précoces et certaines adventices.
- En cas de mise à l'herbe tardive des vaches conduites en pâturage tournant, un déprimage de certains paddocks va permettre de créer un décalage de pousse entre les différentes parcelles attribuées à un même lot d'animaux

Le déprimage est à réserver au début de saison, lorsque la pousse d'herbe est encore ralentie. Dès que celle-ci va s'accélérer et que la hauteur d'herbe est suffisante (8 à 10 cm) il faut 'rapatrier' les animaux dans les parcelles qui leur sont destinées au printemps pour éviter d'être dépassé par l'herbe et donc de générer du gaspillage par la suite



Mise à l'herbe : soigner la transition

La mise à l'herbe constitue un changement d'alimentation brutal, passant d'une ration riche en fibres et pauvre en azote à une ration plus humide, pauvre en fibres et riche en sucres et en azote. Une transition est indispensable pour éviter l'apparition de troubles physiologiques dont les conséquences peuvent être plus ou moins marquées. Afin d'habituer le rumen à sa nouvelle alimentation, l'idéal est de réaliser une mise à l'herbe progressive, lorsque cela est possible, en sortant les animaux quelques heures par jour. A défaut de pouvoir procéder de cette manière, il faut prévoir de mettre du foin à disposition des animaux durant les deux premières semaines de pâturage. Dans tous les cas, un apport de pierres ou seaux à lécher enrichis en magnésium et en calcium est indispensable.



En cas de parcelles en herbe à proximité des bâtiments, une sortie progressive des animaux (quelques heures par jour) est la meilleure solution pour effectuer une bonne transition alimentaire avant le passage à un régime 100% herbe pâturée. (Photo CA 58, 27 février 2026)