

## Compte Rendu GT Suzukii 09/09/2025

*à destination des techniciens GTSO*

### **Pression 2025 :**

Pression forte partout en début de saison. En fin de saison, certaines zones dans le Sud-Est où la pression explosée comme habituellement, mais d'autres régions comme Sud-Ouest et Aveyron ou mieux contrôlé en fin de saison, probablement lié à une pression moindre.

### **Essais répulsifs :**

Pas de résultats pour le 23-ADS-001 d'Incères à Sud Expé. Une tendance positive en sur-maturité pour le HD Pulse toujours à SudExpé. Pas de résultats pour la pose des pièges à l'automne en plus d'une stratégie chimique. Oxyfly pas de différence significative en forte pression.

**Conclusion : répulsifs apportent rien de plus si fait en plus du chimique, et rien non plus si fait seul en situation de très forte pression. Micro-parcelles pas vraiment adapté pour les produits type répulsifs.**

### **Essais chimiques :**

Des bons résultats avec esfenvalérate. Klartan bien mais un peu moins bien que référence chimique. Des résultats encourageants (68% efficacité en forte pression) d'un produit à base de tannins de châtaigniers (testé par la cerise d'industrie).

Neemazal équivalent TNT, Karaté similaire à Decis. A noter que dans les essais, toujours plus de pression en gobelet qu'en axe.

### **Lutte biologique :**

57 sites de lachers en cumulé depuis 2023 de Ganaspis kimurum. Mais pas de re-capture dans les fruits en 2024. Résultats 2025 en attente. Travail aussi sur augmentorium et sur sensibilité de ce parasitoïdes aux phyto (très sensible à tous les produits à ce jour, eau y compris... à retravailler).

Par contre retrouvé un autre parasitoïde introduit de façon non contrôlé et non spécifique : Leptopilina japonica.

### **Piégeage massif Cefel :**

Toujours environ 30% d'efficacité sur cerises en sur-maturité.

### **Rôle des levures :**

CBGP : études qui montrent que l'ingestion pas DS de certaines levures qui se développent sur les cerises pourries contribuent à l'augmentation de sa fertilité et à sa résistance. Peut doubler la pression de laisser les fruits au sol.

### **TIS :**

Des tests en rangs insect'proof cette année (avec inoculation dans les rangs TNT). Ration 40/1 puis 20/1. Environ 50% efficacité. Devrait démarrer des essais en verger ouvert sur zone de 200ha en 2026.

### **Association TIS + lutte bio :**

Un essai qui combine les 2 stratégies. Pression de 50% dans le TNT, 30% d'efficacité de la lutte bio seule, 43% de la TIS seule, 75% en combinant TIS et lutte bio.

### **Association TIS et TII :**

TII : technique insecte incompatible grâce à une bactérie naturelle (Wolbachia) qui provoque de l'incompatibilité à l'accouplement. A Singapour, sont arrivés à 90% d'efficacité en combinant TIS et TII. Combinaison de méthode déjà utilisée aussi sur *Ceratitis capitata*. Mais commence juste à le travailler en DS.