


BILAN RÉCOLTE 2025 ORGE D'HIVER

Service Agronomie

Le 28/07/2025


RÉCOLTE 2025 - BILAN ORGE D'HIVER

Rendement moyen 75,52 q/ha sur 4 214 ha



226 Données
138 Exploitations


Répartition surfaces par secteur



Favorable ✓	Défavorable ✗
Climat favorable au printemps avec des pluies régulières et beaucoup de luminosité en fin de cycle. Bon remplissage.	Climat défavorable au semis en raison des fortes précipitations. Semis décalés de 2 semaines à 1 mois.
Faible pression maladie et insectes Peu de pression d'adventice en raison du décalage de date de semis	Structure du sol abîmée par les passages d'engins à la récolte et au semis.
Bonnes conditions de valorisation de l'azote (pluies) Bons PMG	Densité d'épis faible

RÉCOLTE 2025 - BILAN ORGE D'HIVER

Département :
moyenne des 15 campagnes : 68,6 q/ha



Le rendement estimé pour cette année est supérieur de 6,9 q/ha à la moyenne pluriannuelle

Le rendement est au-dessus de la moyenne des 15 dernières années. Depuis 20 ans, les rendements se sont stabilisés autour de 69 q/ha.


Les rendements de l'enquête s'échelonnent de 45 q/ha (sol séchant et gros problèmes de salissement) à 101 q/ha.

L'écart-type de l'échantillon de 10,3 q/ha traduit des résultats hétérogènes : 75% de l'échantillon se situe entre 59,2 et 78,8 q/ha.

Résultats par variétés

- 18 variétés représentées dans l'échantillon.

Bon calibrage de KWS Faro.



RÉCOLTE 2025 - BILAN ORGE D'HIVER

Département : Résultats variétés


Les graphiques ci-dessous sont réalisés à partir **des variétés ayant au moins 10 valeurs de résultat de rendement**.

Les moyennes sont encadrées par les 3/4 de l'échantillon (barres noires).

Le graphique « Produit en €/ha », est réalisé avec les prix de marchés au 08/07/25 départ ferme septembre.

KWS Faro est considérée comme apte au débouché brassicole.

Rendements en q/ha




Produit en €/ha

Pour le calcul du produit, nous considérons KWS Faro à 80% de calibrage.

Nous avons retenu 150 €/t pour les fourragères et 170 €/t (pour un calibrage à 80%) pour KWS Faro.

KWS Akkord réalise le meilleur rendement. Elle s'est mieux exprimée cette année en raison de la faible pression maladies. KWS Faro réalise le meilleur produit. LG Zenika est la variété la plus régulière avec un écart-type de 8 q.



Commentaires



La variété brassicole 6 rangs (se rapprocher de son OS) :

- **KWS FARO** : productive, précoce, moyenne en maladies, résistante au froid, sensible JNO et mosaïque.

Les variétés fourragères 6 rangs :

- **KWS AKKORD** : Productive, moyenne en maladies ainsi qu'à la verse.
- **KWS OXYGENE** : **Résistante à la mosaïque**. Valorise bien une protection fongicide, productive, verse à surveiller.
- **LG ZENIKA** : **Tolérante à la JNO et à la mosaïque**, productivité dans la moyenne et régulière, bon comportement aux maladies, précoce.

Les variétés fourragères 2 rangs :

- **MARQUISE** : Profil agronomique intéressant. Variété à tester.

Les variétés à suivre :

- **KWS INNOVATRIS** : fourragère 6 rangs, **tolérante à la JNO**, bon comportement maladie.
- **KWS FUTURIS** : fourragère 6 rangs, tolérante à la JNO, globalement bon comportement maladie.
- **LG ZORICA** : fourragère 6 rangs, **tolérante à la JNO**, bon profil maladie mais surveiller la rhynchosporiose.

Culture Orge d'hiver / Caractéristiques de la campagne 2024-2025

	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février
Météo : Faits marquants	Conditions météorologiques compliquées à partir du 20 septembre avec un temps pluvieux et humide, laissant peu de créneaux pour travailler dans de bonnes conditions		Automne pluvieux qui se poursuit avec des températures qui diminuent progressivement. Pas de grosses gelées.		Janvier encore très pluvieux. Février : 50% de la pluvio de janvier. Température moyenne entre 0 et 3 °C avec périodes de gelées	
Travaux	Semis compliqués dans des préparations grossières et humides. Des resemis intraparcellaires et des désherbages pas toujours faits dans les temps. (sols trop humides) Des semis qui s'étalent de fin septembre à fin octobre (des parcelles non semées - changement culture)					Beaucoup de parcelles roulées (déchaussement, enracinement difficile)
Physiologie	Symptôme de tassement, perte de pieds, phytotoxicité !					
Azote						Premier apport fin du mois. Parcelles peinent à redémarrer et encore marquées de l'automne compliqué. Quelques retournements
Régulateur						
Désherbage	Faux semis (pas prévus mais retard de semis et non travail du sol)	Observations de ratés : avant gros cumul de pluie, sur graines mal enterrées ou plantes peu enracinées : phytotoxicité.				
Maladies	RAS					On commence à observer de la rouille naine
Ravageurs	Pression limaces importante. Pression pucerons et cicadelles très hétérogène selon le secteur et la date de semis (pression moyenne globalement).					

Culture Orge d'hiver / Caractéristiques de la campagne 2024-2025

	Mars	Avril	Mai	Juin	Commentaires Chambres d'Agriculture
Météo : Faits marquants	Mois de mars très sec avec températures douces	à partir du 15 avril, la pluie revient par tranche de 10 mm mais ne couvre pas tous les secteurs. Quelques gelées du 5-12 avril	Températures plutôt stables et pluies qui tombent au bon moment, l'orge est de plus en plus belle, même pour celles qu'il ne l'étaient pas en sortie hiver.	13 juin : orages avec grosses pluviométries localement 20 juin : début des moissons, premiers échos : bon calibrage, PS et rendement (argilocalcaire sup)	bons calibrages
Travaux		On observe différentes stratégies fongicide avec plus de « traitement unique » à dernière feuille que d'habitude, même sur variétés sensibles (des situations d'impasse régulateur)			Rouille naine qui semble récurrente depuis 3-4 ans Apparition tardive mais non significative de ramulariose
Physiologie	début mars : redressement, épi 1cm atteint majoritairement vers le 15-20 mars	8-10 avril : stade 1 nœud majoritairement atteint, puis les stades s'enchainent très rapidement jusqu'à atteindre sortie des barbes à la fin du mois	début mai : début floraison		
Azote	Mi-mars : solde de l'azote	Mi-avril : début des régulateurs + désherbage à base d'hormones			
Régulateur					
Désherbage	Rattrapage dicots				Situations relativement propres / retard dates de semis
Maladies	Stagnation de la maladie. Très peu d'interventions ; rouille au stade épi 1cm (fin mars)	adaptation des programmes pour la rouille à partir du stade 1 nœud. Pression rhynchosporiose faible	Plutôt calme		
Ravageurs		Apparition de foyers JNO	Très peu de lémas		