


BILAN RÉCOLTE 2025 COLZA

Service Agronomie
Le 04/08/2025


RÉCOLTE 2025 - BILAN COLZA

Rendement moyen 35,37 quintaux/ha sur 5748,28 ha



211 Données
119 Exploitations


Répartition surface par secteur



Favorable ✓	Défavorable ✗
Bonne préparation et levée des colzas	Structure sol dégradées, Repousses de colzas
Bonne biomasse entrée hiver	Problème d’hernie plus fréquent dans certains secteurs
Faible pression insecte et maladie	Grêle et égrainage en fin de cycle par secteur
Bonne efficacité des désherbages	Climat de mai-juin avec impact sur le rendement

RÉCOLTE 2025 - BILAN COLZA

Département :
moyenne des 15 campagnes : 32,3 q/ha



Variétés

La récolte 2025 est la quatrième meilleure récolte pour le colza depuis 2010. Sur 30 ans, la moyenne historique est de 32 qx/ha. Les marges du colza seront certainement supérieures à la moyenne si les prix se maintiennent et sont maîtrisés.


Années	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	moyenne
Mélange hybrides + lignées	38,5	35,3	28,7	35,2	34,7	32,8	30,4	27,6	33,8	26,0	29,8	35,3	32,3
Hybrides	38,4	37,0	27,9	32,2	30,8	31,9	29,7	27,8	36,1	30,2	30,4	35,2	32,3
Lignées	36,4	35,3	27,3	35,8	30,4	29,2	30,4	28,5	32,4	36,0	26,4	NS *	31,6

* Sur les 193 ha de lignées pures, le rendement est de 38,93 q/ ha pour la récolte 2025. Pour notre échantillon de 5750 ha, cette valeur n'est pas significative et ne peut pas être exploitée. Cela confirme que les lignées ne chutent pas en potentiel de rendement mais deviennent anecdotiques en surface.

Département :
Résultats variétés

Répartition surface par type variétal

Répartition surface par type variétal



18 variétés et 3 types de mélanges dans l'échantillon

Les lignées disparaissent progressivement du paysage malgré leurs résultats corrects.

Le mélange hybrides/lignées reste le bon sens, lorsque les hybrides choisis sont productifs et vigoureux.

Les hybrides sont conseillés pour lutter contre l'hernie du chou et les viroses.

Pour minimiser les coûts de semences et profiter de la rusticité des hybrides, associer des hybrides avec de la semence de lignée prélevée

50 grains/m ² de lignée prélevée non traitée	1,5 €/ha
10 grains/m ² d'hybride* + 40 grains/m ² de lignée prélevée	15 €/ha
15 grains/m ² d'hybride* + 30 grains/m ² de lignée prélevée	20 €/ha
30 grains d'hybride	40 €/ha

* Une dose pour 10 ha

Notre conseil variétal : 1/3 LG Avenger ou Bessito + 2/3 ES Mambo ou Campus ou Collector

Commentaires

Les variétés lignées

Variétés	Commentaire	Teneur en GLS	Précocité floraison	Précocité maturité	Groupe Phoma	Verse	Elongation
CAMPUS	Bon rendement, peu sensible à la cylindrosporiose	moyenne	MP	MP	TPS 1	PS	moyenne
ES MAMBO	Taille moyenne, peu sensible à la verse, bon rendement	faible	T	MT	TPS 1	TPS	faible
COLLECTOR	Taille intermédiaire, bonne implantation automnale	-	MP	MT	TPS	TPS	moyenne

Les variétés tolérantes hernie du chou

Variétés	Commentaire	Résistance TuYV	Précocité floraison	Précocité maturité	Groupe Phoma	Cylind	Elongation
DK PLACID	Tolérante hernie du chou, intermédiaire à reprise de végétation, plante haute, peu sensible à la verse	+	MT	MP	PS	PS	moyenne
CROSSFIT		+	MP	MP	-	AS	moyenne
KOUROS *	Tolérante hernie du chou, taille haute		MP	MP	TPS	-	faible

Les variétés hybrides

Variétés	Commentaire	Résistance TuYV	Précocité floraison	Précocité maturité	Groupe Phoma	Cylind	Elongation
LG ACROPOLE	Référence mais variété vieillissante, productive	+	MP	MP	TPS	S/PS	moyenne
LG AVIRON		+	MP	MP	TPS	TPS	moyenne
HAROME			MT	MP	TPS	TPS	moyenne
KWS FELICIANO	Rendement moyen à mélanger, bonne résistance larvaire	+	MP	MP	TPS	PS	forte
LG AUSTIN	Référence mais variété vieillissante, productive	+	MP	MP	PS/TPS	TPS	moyenne
LG AVENGER	Productives, bon comportement face aux larves de grosses altises	+	-	-	PS/TPS	TPS	moyenne
BLACKJACK							moyenne
BESSITO	Variété productive, haute en végétation, bon comportement insecte		MT	MP	TPS	PS	moyenne
BLACK-BERRY	Bon rendement cette année, résistante phoma, régulière, pas trop de biomasse à l'automne	+	MP	MT	TPS	PS	forte

RÉCOLTE 2025 - BILAN COLZA

Présynthèse des essais variétés colza 2025

Variété	Statut	Représentant	Rgpt National			Rgpt Nord-Est		
			Ind rdt / témoins	nb essais >100 /nb essais validés	% essais traités	Ind rdt / témoins	nb essais >100 /nb essais validés	% essais traités
KWS DOMINGOS	1A	KWS Maïs France	106.5	46/52	92	105.3	13/15	100
HEMMA	1A	KWS Momont	105.2	44/52	92	105.8	13/15	100
HEDEN	1A	KWS Momont	104.5	42/52	92	104.5	12/15	100
HAALAND	1A	KWS Momont	104.2	38/52	92	106.2	11/15	100
CEZANNE	1A	RAGT Semences	103.6	34/51	92	104.8	12/15	100
PLAYMAKER	1A	Soufflet Seeds	103.3	39/52	92	105.9	11/15	100
BESSITO	T	Lidea	102.1	36/52	92	102.2	10/15	100
LG ADAMANT	1A	LG Semences	101.9	29/52	92	103.5	9/15	100
KWS TALENTOS	1A	KWS Maïs France	101.4	34/52	92	100.3	7/15	100
HELYPSE	T	KWS Momont	101.0	32/52	92	99.6	9/15	100
BLACKPANTHER	1A	Semences de France	100.7	28/52	92	101.5	8/15	100
NYMPHEA	1A	Mas Seeds	100.5	25/51	92	103.0	10/15	100
FELICIANO KWS	T	KWS Maïs France	96.9	10/52	92	98.3	5/15	100
DK EXQUIS	1A	Dekalb	94.0	10/52	92	97.3	5/15	100
BRV 723	1A	Brevant	90.7	3/51	92	93.9	2/15	100
HORNELA	1A	KWS Momont	103.6	34/44	93.5	104.4	11/14	100
LG ADAPT	2A	LG Semences	103.2	35/44	95.2	104.4	12/14	100
HEMOTION	2A	KWS Momont	101.9	31/51	92.9	101.6	9/15	100
HINDIANA	1A	KWS Momont	101.0	24/41	93	103.2	9/14	100
KWS DEMOS	1A	KWS Maïs France	100.9	26/44	93.6	100.9	8/14	100
DESIGNER	1A	Semences de France	100.5	18/40	94.5	103.5	7/14	100
LG AVENGER	2A	LG Semences	100.2	23/51	88.9	102.4	9/15	100
LID INVICTO	2A	Lidea	99.9	22/47	92.2	100.6	8/15	100
BESSITO	T	Lidea	102.3	27/38	89.3	103.4	8/11	87.5
KWS MERINOS	2A	KWS Maïs France	101.7	16/28	89.7	102.3	6/11	85.7
HELYPSE	T	KWS Momont	101.4	26/38	89.3	99.0	6/11	87.5
LID TEBO	2A	Lidea	100.9	18/30	93.2	99.9	4/8	81.8
KWS MIKADOS	2A	KWS Maïs France	100.3	14/30	88.6	101.7	5/9	84.6
BLACKBERRY	2A	Semences de France	99.7	13/28	87.8	98.9	4/10	85.7
DK EXDEKA	2A	Dekalb	99.7	11/28	92.3	101.0	4/9	83.3
METAL	1A	Soufflet Seeds	99.4	12/25	91.4	98.3	4/10	84.6
BLACKJACK	2A	Soufflet Seeds	98.3	11/24	91.4	95.1	2/8	81.8
HISCO	2A	KWS Momont	96.9	8/31	88.6	97.3	3/11	85.7
KOMBIA	2A	Mas Seeds	96.4	5/24	91.2	96.3	2/8	81.8
FELICIANO KWS	T	KWS Maïs France	96.3	6/38	89.3	97.6	2/11	87.5
HIBERIA	Oro	KWS Momont						

Nombre de références insuffisant

Statut : T: témoin ; A: nombre d'année d'évaluation

Culture Colza d'hiver / Caractéristiques de la campagne 2024-2025

	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier
Météo : Faits marquants	Températures supérieures de 1°C par rapport à la normale. Précipitations régulières entre le 12 et 25 août.	Températures supérieures à la moyenne. Pluviométrie supérieure de 35% par rapport à la moyenne. Début et fin de mois pluvieux.	Pluviométrie dans la moyenne. Températures supérieures à la moyenne.	Températures dans la moyenne, précipitations en léger recul.	Températures dans la moyenne, précipitations inférieures de 25%.	50% de précipitation en plus.
Travaux	Travaux de sol en conditions humides début août. Semis en bonnes conditions.	Resemis (fortes précipitations / orages / reprise en masse).	Chantiers de désherbage et d'insecticide sur les colzas levés. Très peu de faims d'azote observées.			
Physiologie	Levées régulières liées aux conditions poussantes. Les premiers semis du 10 août arrivaient au stade 2-3 feuilles fin août.	Colzas dynamiques avec un risque d'élongation, notamment sur les parcelles avec apport de MO et/ou DAP et variétés sensibles. Forte présence de colzas indigènes.	Conditions poussantes. Fin octobre, les stades des colzas atteignent 8-10 feuilles. Pression plus importante que les années précédentes d'hernie du chou dans certaines parcelles sableuses ou limoneuses.	De l'élongation est présente de façon plus importante que les dernières années.	Des poids de colza en entrée d'hiver hétérogènes mais globalement assez importants grâce aux conditions météo.	Arrêt de végétation marqué due au gel occasionnant une perte de biomasse
Azote	Beaucoup d'apports d'azote organique et minérale (objectif lutte grosses altises)					
Désherbage	Les conditions de l'année sont propices à l'application des herbicides racinaires et permettent d'appliquer des produits à base de napropamide dans des parcelles à forte pression graminées.	Quelques passages en micro-dose de produits racinaires. Désherbages mécaniques par endroits.	Bonnes conditions d'hygrométrie et température pour l'application de produits foliaires.	Forte application de produits à base de propyzamide sur sol humide avant le gel de la mi novembre. Suite des applications au mois de décembre voire jusqu'à fin janvier pour certaines parcelles. Bonnes conditions d'application.		
Maladie						
Ravageurs	Pression limaces plus importante que les années précédentes dans certaines parcelles lorsque, peu travail du sol, aucun anti-limace n'a été appliqué si nécessaire en pré semis (piège) ou en localisé (semence). Quelques dégâts précoces de tenthrèdes.	Quelques dégâts d'altises dans certaines parcelles. Présence forte de tenthrède de la rave et/ou piérde du chou dans certaines parcelles occasionnant quelques dégâts pouvant freiner des petits colzas. Elles ont occasionné quelques interventions.	Début de vols de CBT observé première quinzaine d'octobre avec un pic de vol atteint autour de mi-octobre localisés pour certains secteurs (pression globale modérée). Les premiers tests berlèses sont réalisés, pression larvaire faible.		Augmentation du nombre de larves de grosses altises. Cependant, la pression reste faible, en dessous du seuil hormis pour certaines parcelles avec larves résistantes aux pyrèthrinoides.	

Culture Colza d'hiver / Caractéristiques de la campagne 2024-2025

	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Commentaire Chambre d'Agriculture
Météo : Faits marquants	50% de précipitation en moins.	Mois de mars le plus sec depuis 1993 (-75%) (station Metz Frescaty), vent d'Est important.	Première quinzaine sèche. Précipitations en recul de 22%.	Conditions de pluies très hétérogènes.	2°C de plus par rapport à la moyenne historique. Précipitations dans la moyenne. Fortes T° après 20 juin	Début d'année 2025 sec (-40%) et fin d'année 2024 plutôt humide. Vent d'Est important cette année.
Travaux	Premiers apports d'engrais correctement valorisés malgré le peu de pluies (15-20 fev.). Bonnes conditions de passage.		La question d'une impasse fongi se posait...			
Physiologie	Peu de dégâts liés à l'hydromorphie	Quelques dégâts de grosses altises localisés	Une belle floraison assez longue 4/5 semaines plutôt ensoleillée (N-E lorraine). Pas de dégâts de gel à la floraison. Pression maladie faible liée au peu de précipitations.		Nombre de siliques important.	
Azote	Premiers apports d'engrais réalisés à partir de mi février. Le solde et le soufre sont apportés majoritairement début mars.					
Désherbage	Créneau de rattrapage de matricaires/chardons avec hormones première quinzaine de mars.					Globalement les parcelles sont propres hormis quelques parcelles non désherbées d'automne sur matricaire essentiellement. Bonne efficacité des produits à base de propyzamide.
Maladies			Protection fongicide appliquée vers la mi-avril (floraison en conditions sèches)		Pression maladie faible.	Pression maladie faible due au peu de pluies sur les mois de mars et avril et une hygrométrie faible. Observation de Phyllodie en Moselle.
Ravageurs	Quelques captures de charançons de la tige du chou et colza avec un pic de vol sur quelques secteurs.	Faible présence de méligèthes notamment observées sur variétés précoces type ES ALICIA (Exavance, Miranos). Leur faible présence ainsi que l'entrée en floraison rapide ne nécessite aucun traitement insecticide.			Présence plus importante de cécidomyies que les années précédentes. Peu de charançons des siliques.	Pression ravageur faible cette année. Quelques cécidomyies et charançons des siliques présents en fin de cycle.