


BILAN RÉCOLTE 2025 BLÉ TENDRE D'HIVER

Service Agronomie

Le 04/08/2025


RÉCOLTE 2025 - BILAN BLÉ TENDRE HIVER

Rendement moyen 76,12 quintaux/ha sur 8610,74 ha



278 Données
112 exploitations




Répartition surface par secteur



Favorable ✓	Défavorable ✗
Nombreux faux-semis réalisés, décalage de la date de semis	Perte de pied importante en raison d'un automne pluvieux
Bonne efficacité du désherbage d'automne	Salissement en brome et folle-avoine
Bonne fécondation, beaucoup de luminosité	Pression rouille brune importante en fin de cycle sur Pondor et Winner
Fertilisation bien valorisée	Vague de chaleur du mois de juin impactante surtout en petites terres et semis de novembre
Bonne qualité du grain	Chute des rendements pour les blés de paille

RÉCOLTE 2025 - BILAN BLÉ TENDRE D'HIVER

Département :
moyenne des 15 campagnes : 72,3 q/ha




Le rendement de cette année est 4 quintaux au dessus de la moyenne avec des peuplements épis limitants (moy : **502 épis/m²**), des **PMG dans la moyenne (42 g)**. Les extrêmes oscillent entre 44 (blé de paille et/ ou salissement et/ ou sol à cailloux) et 115 qtx/ha.

L'écart-type de 12,37 q/ha traduit l'hétérogénéité des rendements pour 2025.

RÉCOLTE 2025 - BILAN BLÉ TENDRE D'HIVER

Département : Résultats variétés



Peu de données ont été obtenus pour les autres variétés(< 200 ha).


Répartition surface par variété

12 variétés composent l'échantillon.

Chevignon confirme sa **productivité et sa stabilité pour les rendements**. Les variétés **Intensity** et **KWS Perceptium** ont également réalisé de très bons rendements.

Cette année, l'effet blé de paille se traduit dans notre échantillon par une perte d'environ 10 à 20 q/ha. **Le mélange de variétés reste une valeur sûre.**


Chevignon en pur ou en mélange, c'est **87 %** de la sole.



Répartition surface par variété

RÉCOLTE 2025 - BILAN BLÉ TENDRE D'HIVER

Synthèse bilan Arvalis




Nouveautés 2025 – (h) : variété hybride

Comportement



Précocité



RÉCOLTE 2025 - BILAN BLÉ TENDRE HIVER

Commentaires



Dans une offre variétale de plus en plus importante, la variété sans défaut n'existe pas, le choix (mélange ?) se fait en fonction de ses propres priorités : productivité > qualité > date de semis > sensibilité maladies > résistance au froid > germination sur pied > adaptation terres superficielles > production de paille > résistance verse > barbes > sensibilité cécidomyies > ...

L'incontournable :

✓ **CHEVIGNON** : (BPS), bon comportement maladies hors piétin verse, moyen en verse.

Autres :

✓ **INTENSITY** : BPS, barbu, bon comportement maladies et à la verse.

✓ **PONDOR** : BPS, précoce, bonne résistance maladies sauf rouille brune.

✓ **KWS PERCEPTIUM** : BPS, tolérant chlorto, sensible piétin verse.

Les préférés derrière paille et maïs :

✓ **CHEVIGNON** : Fait partie des meilleurs dans un regroupement « essais France », lorsqu'il est traité latitude.

✓ **INTENSITY** : BPS, barbu, bon comportement maladies et à la verse.

Quelques variétés à tester ou confirmer :

✓ **RGT LOOKEO** : BPS, bon comportement maladies, tolérant chlorto.

✓ **KINGKONG** : BPS, sensible piétin verse et rouille brune

✓ **KWS GLOBE** : BPS, assez sensible en septo, bon rendement en 2025, bon comportement à la verse

LE MELANGE VARIETAL est une solution, notre conseil :
CHEVIGNON / KWS PERCEPTIUM / INTENSITY / KWS SPHERE

Ou

CHEVIGNON / KING KONG / PONDOR / INTENSITY

Culture Blé d'hiver / Caractéristiques de la campagne 2024-2025

	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février
Météo : Faits marquants	Précipitations régulières, parfois accompagnées d'orages.	Courte Accalmie vers le 5 octobre, puis reprise des pluies, qui se calment ensuite à partir du 15-20 octobre.	Temps plutôt sec, ressèchement progressif des parcelles.. Retour de pluies après la mi novembre.	Décembre arrosé régulièrement. Températures douces	Janvier plutôt humide. Quelques gelées ne dépassant pas -6.	Sortie d'un hiver encore humide, mais temps plus sec en février. Manque d'eau sur les apports d'azote de fin février
Travaux	Une timide vague de semis le 1er week-end d'octobre, mais sans que les vulpins soient levés. Nombreux ressemis dans ces situations faute de salissement. Sinon le gros des semis reprend au 20 octobre, et s'échelonne selon le ressèchement des parcelles.		Les semis se poursuivent jusqu'au 10 voire 15 novembre pour les parcelles les plus argileuses			
Physiologie		Difficile de rentrer dans certaines parcelles suite aux précédents excès d'eau, même après l'arrêt des grosses pluies. Phytotoxicité observée des herbicides en situation d'excès d'eau. Quelques situations de ressemis (excès d'eau)	Stades hétérogènes, de 3 feuilles à levée en cours selon parcelles.		Reprise de végétation calme. Peu de faim en azote. Questionnement sur la faible densité de pieds dans certaines parcelles. (Retournement de parcelles inférieur à 150 pds/²)	
Azote						Démarrage précoce des apports d'azote, dès la mi-février sur sol humide.
Régulateur						
Désherbage		Salissement rapide des parcelles semées début octobre. En semis après 20 octobre, situations beaucoup plus saines et il a été possible de détruire des vulpins au semis.	Dans la grande majorité des cas, il a été possible d'appliquer les programmes racinaires prévus, et dans de bonnes conditions		Situations tardives de désherbage sur parcelles à forte pression de salissement.	
Maladie						
Ravageurs	Quelques dégâts de limaces, notamment sur les premiers semis. Pas de pression insectes piqueurs (temps pluvieux).					

Culture Blé d'hiver / Caractéristiques de la campagne 2024-2025

	Mars	Avril	Mai	Juin	Commentaires Chambre D'Agriculture
Météo : Faits marquants	Retour de la pluie du 10 au 15 mars. Fin du mois plus sèche	Plutôt sèche, mais un retour de pluie vers la mi avril, étalé sur 2 semaines. 1eres parcelles à 2 nœuds dès la mi avril. Amplitudes thermiques importantes.	Mois plutôt doux, agrémenté de régulières précipitations modérés (forts gradients).	1er tier du mois avec de la pluie régulière, puis météo avec conditions échaudantes à partir du 20 juin, accompagné d'un début de sécheresse, inquiétudes sur la baisse des PMG.	
Travaux			Fongicide pivot fait entre le 7 et le 15 mai. Quelques traitements fusariose vers la fin du mois de mai.	Moisson précoce	
Physiologie	Déclenchement des 1ers apports à la pince N tester au 5 mars. Stade épi 1 cm vers le 20 mars, légère avance	Le mois de sec commence à faire du mal dans les petites terres. Stade 1-2 nœuds. Beaucoup de taches physio.	Les blés récupèrent dans les petites terres. Les végétations et développements sont favorables. Stade DFE atteint entre 7 et 15 mai, stade gonflement rapidement atteint	Fin de cycle dans le sec et la chaleur après le 20 juin.	
Azote	Nombreux apports de soufre début mars. Deuxième apport d'azote fin mars, le plus souvent sans pluie	Certains soldent l'azote dès le 15 avril (1-2N), mais ce n'était pas notre conseil car les 2eme apports n'avaient pas encore fait effet . On conseille finalement de solder tout fin avril, un peu vite vu l'avancée rapide des stades.			Bon comportement des blés avec l'INN
Régulateur					
Désherbage	De rares rattrapages vulpins avec des Sulfo. Dans l'ensemble bonnes efficacités des programmes d'automne.		De nombreuses levées de dicots au printemps (suite pluies fin avril), les interventions à base d'hormones ont été plus nombreuses. Déception aussi sur le salissement vulpins, que l'on voit épier au dessus du blé en plus grand nombre que prévu.		Globalement, plaine propre en vulpins principalement dû au décalage de date de semis
Maladie			Peu de septoriose, aucun déclenchement de T1, et on se pose la question d'une impasse de Tpivot.	Apparition importante de rouille brune en fin de cycle, : pression selon secteurs et variétés. Septo qui tendait à remonter. Risque fusariose modéré (grosse pluie à l'instant T, mais conditions séchantes entre chaque averse, et stades floraison + 8 j souvent dépassé	Confirmer les observations de piétin échaudage.
Ravageurs			Pucerons un peu plus visibles qu'à l'accoutumée, mais dans des proportions qui restent largement en dessous des seuils.		