



BILAN
CONSEIL
PHYTOSANITAIRE

BILAN ANNUEL DEPARTEMENTAL céréales et oléagineux Septembre 2024 – Octobre 2025

Date : Novembre 2025

Conseiller : Gilles TERRES – Pôle Productions Durables et Agroécologie

aude.chambre-agriculture.fr



UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !

AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE
EN CHARGE DE
L'AGRICULTURE,
SOUS LE NUMÉRO
IF01762



**AGRICULTURES
& TERRITOIRES**
CHAMBRE D'AGRICULTURE
AUDE

PRINCIPALES CULTURES :

- Blé dur,
- Blé tendre,
- Orge,
- Colza,
- Pois,
- Tournesol,
- Sorgho,
- Soja,
- Maïs
- Chanvre

DONNEES CLIMATIQUES DE LA CAMPAGNE :

Caractéristiques	La climatologie observée au cours de cette campagne se caractérise par un automne chaud et sec, un hiver doux et sec surtout vers Carcassonne, un printemps chaud et humide, un été chaud et sec. L'automne 2024 a été chaud et sec. Les pluies de l'hiver et les températures douces ont permis un développement rapide des cultures d'hiver. Le mois de février est sec, les réserves ne sont pas reconstituées sur les sols superficiels. Le printemps est chaud et humide. La situation hydrique de mai, juin est non limitante avec des pluies supérieures à la moyenne. La température de fin mai est très élevée, les plantes sont stressées. L'été 2025 est chaud et sec ce qui limite la productivité des cultures d'été.
Incidents, imprévus	L'automne 2024 très chaud favorable aux pucerons et cicadelles. La sécheresse de février, les températures élevées fin mai et en été ont pénalisé l'ensemble des cultures présentes. L'orage du 19 mai qui a détruit partiellement des cultures d'été. Retard d'implantation des cultures d'été avec des semis jusqu'à début juin à cause des pluies du printemps et de l'orage du 19 mai. Ces derniers ont été pénalisés par la suite avec la météo estivale.

SYNTHESE DE LA PRESSION SANITAIRE, METHODES DE LUTTE ET RESULTATS

Globalement le climat a été très favorable aux bios agresseurs.

Le fait marquant de la campagne est la sécheresse surtout estivale avec des températures très élevées. Les cultures d'été se sont retrouvées stressées notamment lors de la période de floraison. La présence de pucerons et cicadelles à l'automne a été très importante mais au final peu impactant principalement en raison de semis de céréales tardifs. Les pluies printanières ont été favorables aux maladies et aux limaces. Nous avons aussi observé la recrudescence de la carie du blé particulièrement sur des parcelles conduites en agriculture biologique. Il convient donc d'être très vigilant sur cette maladie pour les prochaines campagnes.

Maladies

Cultures	Maladies	Observations	Stratégies proposées	Résultats obtenus et suites à donner
Blé dur, blé tendre	Septoriose	Pression moyenne	Traiter en T1	En fonction du programme globalement décevant à corriger en 2026
	Rouille brune	Pression forte	Choix variétal et traiter	Bons
	Rouille jaune	Pression faible	Traiter si présence en T1	Bons
	Mosaïques	Pression moyenne	Changement culture année N+2	A prévoir en 2026
	Fusarioses (microdochium)	Pression faible	Protection assurantielle maximale	Bons
Orge	Helminthosporiose	Pression faible	Ne pas traiter en T1	Bons
	Rouille Naine	Pression moyenne	Traiter en T1	Bons
Colza	Sclérotinia	Pression faible	Ne pas traiter	Bons
	Oïdium	Pression moyenne	Un traitement assurantiel préventif	Moyen
Tournesol	Verticillium	Pression moyenne	Choix variétal	Moyen
	Phomopsis	Pression Moyenne	Traiter les sensibles peu sensibles	Bons
	Rhizopus	Pression faible	RAS	OK

Ravageurs /Parasites

Ravageurs / Parasites	Observations	Stratégies proposées	Résultats obtenus et suites à donner
Limaces	Réseau piègeage Pression forte	Surveillance et traitements parcelles à risques	Moyen
Pucerons vecteurs de JNO et cicadelles vecteurs de pieds chétifs	Réseau piègeage Pression très forte	Surveillance + un traitement insecticide à l'automne	Très peu de dégâts. Rester vigilant sur le sujet
Gibier (palombes, lapins, etc...)	Pression forte croissante	Surveillance, épouvantail, canon à gaz, tir de fusil sur autorisation. Semis décalés.	Moyens (insuffisants sur parcelles avec attaques)
Héliothis	Réseau piègeage Pression moyenne	Observation et traitement si nécessaire	Résultats satisfaisants vu la présence mais faibles attaques
Orobanche Cumaná	Pression faible	Choix variétal	Bons

ACTIONS REALISEES POUR LA FILIERE GRANDES CULTURES

- Tour de plaine : 14/10/2024 – 04/12/2024 - 09/12/2024 – 20/01/2025 – 18/02/2025 – 19/02/2025 – 14/03/2025 - 18/03/2025 – 14/04/2025 - 30/04/2025 – 06/05/2025 - 18/06/2025 – 16/07/2025 - 28/07/2025 - 04/09/2025
- Messages techniques : 5 C'Aude des Champs en octobre et décembre 2024, février, avril et juillet 2025.
- Réunion bio agresseurs comité technique : 24/01/2025
- Vidéos bio agresseurs

BILAN DE RECOLTE

Colza	25 qtx/ha en moyenne – Hétérogènes de 15 à 35 qtx/ha
Blé dur	46 qtx/ha en moyenne – Très forte hétérogénéité de 20 à 70 qtx/ha
Blé tendre	57 qtx/ha en moyenne – Très forte hétérogénéité de 40 à 85 qtx/ha
Orge	47 qtx/ha en moyenne – Très forte hétérogénéité de 35 à 70 qtx/ha
Pois protéagineux	35 qtx/ha en moyenne
Tournesol	15 qtx/ha en moyenne – Très forte hétérogénéité de 5 à 27 qtx/ha
Sorgho	25 qtx en moyenne en sec – 50 qtx en moyenne en irrigué
Soja	8 qtx en moyenne en sec – 28 qtx en moyenne en irrigué
Maïs	25 qtx en moyenne en sec – 70 qtx en moyenne en irrigué
Chanvre	4,1 tonnes hectare en moyenne – très hétérogènes de 800 kgs hectare à 7,9 tonnes hectare

Conclusion : Mauvaise année pour le colza, le tournesol et les autres cultures d'été en sec. Année moyenne pour tout le reste. A noter tout de même l'intérêt de l'irrigation cette année sur les cultures d'été. En effet nous avons observés de bons résultats lorsque l'eau n'a pas été un facteur limitant.

PERTE DE RENDEMENT EN MOYENNE EN 2025 PAR RAPPORT A LA MOYENNE DECENNALE

Cultures	Rendement moyenne décennale	Perte de rendement 2025
Colza	28 qt	-10,7 %
Tournesol	19 qt	-21,1 %
Sorgho sec	51 qt	-50 %
Soja sec	23 qt	-60 %
Maïs sec	69 qt	-60%
Maïs irrigué	80 qt	-12,5%