



BILAN
CONSEIL PHYTOSANITAIRE

BILAN ANNUEL DEPARTEMENTAL

Maraîchage

Octobre 2024 – Décembre 2025

Date : 23/01/2026

Conseillère : Emilie DELANDE – Pôle Productions Durables et Agroécologie

aude.chambre-agriculture.fr



OPE.COS.ENR.101

UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !
AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE
EN CHARGE DE
L'AGRICULTURE,
SOUS LE NUMÉRO
IF01762



CHAMBRE
D'AGRICULTURE
AUDE

PRINCIPALES VARIETES :

- Tomate
- Aubergine/Courgette/Poivron
- Courges
- Légumes racines : Radis/Navet/Carotte
- Légumes feuilles : Salade/Epinard
- Oignon/Poireau
- Choux
- Fraise
- Pomme de terre
- Melon
- Asperge
- Artichaut

DONNEES CLIMATIQUES DE LA CAMPAGNE :

Caractéristiques	Une année marquée par un printemps humide et peu lumineux, suivi d'un été caniculaire, puis d'un début d'hiver froid et humide.
Incidents, imprévus	Intempéries et un manque de luminosité en février et mars ayant causées principalement des développements de maladies fongiques sur les fraises Fortes chaleurs caniculaires entre juin et août 2025 qui ont entraîné une perte de rendement par des blocages physiologiques ainsi que des brûlures des plants et des légumes De multiples incendies pendant la période estivale ont entraîné une perte de récolte et de fond chez les exploitants impactés par la zone des feux. Une humidité importante causée par du brouillard sur la période hivernale a entraîné l'apparition importante de pourriture lors du stockage des courges et des légumes d'hiver. Les gelées de fin décembre ont provoqué des pertes de

	rendements sur les choux qui n'étaient pas récoltés.
--	---

SYNTHESE DE LA PRESSION SANITAIRE, METHODES DE LUTTE ET RESULTATS

Maladies

	Maladies	Observations	Stratégies proposées	Résultat obtenu et suites à donner
Tomate	Oidium	Pression moyenne, en augmentation sur la fin de la saison	Choix variétal Se référer au BSV LR Pour les agriculteurs en AB de l'ouest du département : se référer au bulletin technique bio Midi Pyrénées	
	Alternaria	Pression faible à moyenne, en augmentation sur la fin de saison		
	Mildiou	Pression moyenne		
	Cladosporiose	Pression faible		
Aubergine/Courgette/Poivron	Oidium	Pression moyenne, en augmentation sur la fin de la saison		
	Botrytis	Pression faible		
	Bactériose	Pression moyenne		
Légumes racines	Oidium	Pression faible à moyenne		
Légumes feuilles	Rhizoctone	Pression moyenne à forte		
	Botrytis	Pression moyenne		
	Mildiou	Pression moyenne à forte		
	Sclérotinia	Pression moyenne à forte		
Oignon/Poireau	Alternaria	Pression faible à moyenne		
	Mildiou	Pression faible à moyenne		
	Botrytis	Pression faible à moyenne		
Choux	Alternaria	Pression moyenne		
	Mycosphaerella	Pression faible à moyenne		
	Mildiou	Pression faible		
Fraise	Botrytis	Pression moyenne		
	Oidium	Pression faible à moyenne, en augmentation sur la fin de la saison		
	Phytophthora	Pression forte		
Pomme de terre	Gale	Pression faible		

Melon	Oidium	Pression faible à moyenne, en augmentation sur la fin de la saison		
	Mildiou	Pression faible à moyenne		
Asperge	Rouille	Pression faible à moyenne		
	Maladie des taches brunes	Pression faible à moyenne		
Courges	Oidium	Pression faible à moyenne, en augmentation sur la fin de la saison		
Artichaut	Oidium	Pression faible à moyenne, en augmentation sur la fin de la saison		
	Mildiou	Pression faible à moyenne		
	Verticilliose	Pression faible à moyenne		

Ravageurs /Parasites

	Ravageurs / Parasites	Observations	Stratégies proposées	Résultat obtenu et suites à donner
Tomate	Tuta absoluta	Pression moyenne à forte	Choix variétal Se référer au BSV LR Pour les agriculteurs en AB de l'ouest du département : se référer au bulletin technique bio Midi Pyrénées D. suzukii : pas de solutions Tuta absoluta : mise en place de la confusion sexuelle pour les tomates sous abris	
	Pucerons	Pression moyenne à forte		
	Acariens	Pression moyenne à forte		
	Noctuelles	Pression moyenne		
	Mineuse	Pression moyenne		
	Aleurodes	Pression faible		
	Punaises	Pression moyenne à forte		
Aubergine/Courgette/Poivron	Punaise (Néзара)	Pression moyenne à forte		
	Pucerons	Pression moyenne à forte		
	Doryphore	Pression moyenne		
	Acariens	Pression moyenne		
	Thrips	Pression moyenne		
Légumes racines	Mouche de la carotte	Pression moyenne à forte		
	Pucerons	Pression moyenne à forte		
	Mineuses	Pression faible à moyenne		
Légumes feuilles	Chenilles	Pression moyenne		
	Pucerons	Pression forte		
Oignon/Poireau	Teigne du poireau	Pression moyenne		
	Mouche mineuse	Pression moyenne		
Choux	Altise du chou	Pression moyenne à forte		
	Piérides	Pression moyenne		
	Noctuelles	Pression moyenne		

Fraise	Puceron	Pression moyenne à forte		
	Drosophila suzukii	Pression moyenne		
Pomme de terre	Doryphore	Pression faible à moyenne		
Melon	Pucerons	Pression moyenne à forte		
	Acariens	Pression moyenne		
Asperge	/	/		/
Courges	Pucerons	Pression moyenne à forte		
Artichaut	Noctuelles	Pression moyenne		
	Pucerons	Pression moyenne à forte		

ACTIONS REALISEES POUR LA FILIERE MARAICHAGE

- Réunion thématique sur la ferti-irrigation en novembre 2025

BILAN DE RECOLTE

Tomate	De manière générale, les rendements sont plus faibles qu'espérés par les exploitants et s'expliquent notamment par les chaleurs importantes de la période estivale
Aubergine/Courgette/Poivron	Courgette : rendements satisfaisants pour les exploitants Aubergine et poivron : le printemps humide et peu lumineux ainsi que la période de canicule ont impacté à la baisse les rendements
Courges	Rendements corrects, mauvaise conservation
Légumes racines : Radis/Navet/Carotte	Rendements satisfaisants
Légumes feuilles : Salade/Epinard	Rendements plus faibles qu'espérés par les exploitants
Oignon/Poireau	Rendements satisfaisants
Choux	Rendements satisfaisants, sauf sur le créneau tardif
Fraise	Hormis les accidents de cultures liés au printemps humide et peu ensoleillé, les rendements étaient globalement satisfaisants sur les créneaux précoces et de saison. Le créneau tardif a été marqué par des rendements plus faibles qu'espérés suite aux fortes chaleurs de la période estivale
Pomme de terre	Bons rendements
Melon	L'entrée en production a été tardive, les rendements satisfaisants
Asperge	Bons rendements
Artichaut	Bons rendements

Conclusion >> Hormis les accidents de cultures, la saison 2025 est une année satisfaisante pour les maraichers en volume de production. Pour limiter les risques climatiques de brûlure et de blocage physiologiques, il serait intéressant de mettre en place des filets d'ombrages. Pour limiter les risques liés aux ravageurs tels que l'altise du chou ou la mouche de la carotte, il serait intéressant de mettre en place des filets anti insectes. La confusion sexuelle peut également limiter le risque concernant la Tuta absoluta en tomate sous abris.