

Cumul des températures (cumul à partir du 1^{er} février- base 0°C - 18°C - Source : Météo France)

Situation au 2 mars 2025				
STATION		ALTITUDE	BASE 1 ^{er} JANVIER 2025	BASE 1 ^{er} FEVRIER 2025
Basse altitude (<800m)	Le Collet de Dèze	485m	428°C	220°C
	Saint Etienne Vallée Française	518m	453°C	235°C
	Florac	590m	341°C	184°C
	Villefort	620m	357°C	190°C
	Mende ville	710m	290°C	158°C
	Montrodât	763m	287°C	157°C
	St Germain du Teil	775m	322°C	172°C
Demi-Montagne (800m – 950m)	Rousses	812m	294°C	156°C
	Le Pont de Montvert	875m	300°C	160°C
	Le Massegros	890 m	265°C	148°C
	Altier	900m	283°C	159°C
	La Salle Prunet	903m	268°C	146°C
	St Pierre des Tripiers	929m	268°C	149°C
	Mende Chabrits	935m	267°C	146°C
Plateaux d'altitude (950m – 1200m)	Rimeize	939m	255°C	149°C
	Gatuzières	965m	262°C	144°C
	Sauveterre	1018m	233°C	128°C
	Aumont Aubrac	1018m	189°C	101°C
	Bassurels	1042m	233°C	125°C
	Les Salces	1075m	209°C	119°C
	Le Buisson	1088m	159°C	91°C
	Grandrieu	1163m	135°C	68°C
	Le Fau de Peyre	1163m	179°C	104°C
	Paulhac en Margeride	1175m	154°C	89°C
Montagne (>1200m)	Le Bleymard – bourg	1199m	178°C	102°C
	Châteauneuf de Randon	1247m	126°C	66°C
	La Panouse	1260m	132°C	74°C
	Le Bleymard	1418m	115°C	65°C

On utilise cette colonne pour caler la fertilisation (prairies, céréales)

On utilise cette colonne pour caler la gestion des prairies (mise à l'herbe, fauche)

Conseil de la semaine : **Profiter des conditions favorables pour faire les apports d'azote !**

Pour les prairies comme pour les céréales :

L'efficacité de la fertilisation azotée est augmentée quand les apports se font de manière précoce, dès que la végétation redémarre (présence de feuilles vertes), c'est à dire à partir du cumul de sommes de températures de **200°C à partir du 1er janvier**.

Le but est de favoriser le tallage des cultures !



En Cévennes, les préparations à la mise à l'herbe peuvent débuter, mais il n'est pas encore temps de sortir les animaux dans les parcelles !

Les gains hebdomadaires actuels pour les Cévennes sont d'environ 45°C, donc les 300°C pour la mise à l'herbe devraient tomber vers le 15-20 mars !

Dates clés pour l'optimisation de la gestion des prairies

Sommes de T° (base 1 ^{er} février)				
300°C	500°C	800-900°C	1100°C	1300°C
Mise à l'herbe	Fin du déprimage	Ensilage / Enrubannage	Foin précoce	Foin tardif

Les épandages d'effluents d'élevage (fumier-lisier) peuvent reprendre sur les prairies !
Vigilance sur le compactage des sols !



Les apports de fumier sur prairie doivent se faire de manière précoce : fin d'automne/hiver pour améliorer la minéralisation de la matière organique. Pour les plus tardifs il est encore temps !

Attention à ne pas épandre trop tardivement pour limiter le risque de retrouver du fumier dans le fourrage : perte de qualité.

Un apport de lisier entraîne un coup de fouet sur la prairie qui va démarrer et pousser rapidement grâce à l'azote, au phosphore et au potassium rapidement valorisables.

Attention à ne pas épandre trop tardivement pour limiter le risque de retrouver du lisier dans le fourrage : perte de qualité !

Les premiers passages de herse sur prairie peuvent débuter lorsque les conditions seront optimales et que les sols seront ressuyés !



Pour rappel :

Etats des sols interdits pour l'épandage



Les sols enneigés



Les sols gelés



Les sols inondés



Exceptions pour l'épandage sur sol gelé :

- Les fumiers compacts non susceptibles d'écoulements.
- Les composts d'effluents d'élevage.

Retrouver les Inf'Eau prairies et l'info ferti sur le site de la Chambre d'Agriculture de Lozère :
lozere.chambre-agriculture.fr – Production & Techniques – Fourrages – INFO prairie

Crédit photo : ©Gabin SEZILLE, ©Lucile SACHOT, Chambre d'Agriculture de la Lozère

Pour plus d'informations vous pouvez contacter les conseillers spécialisés
de la Chambre d'Agriculture au 04 66 65 62 00
Gabin SEZILLE (Agronomie)

Cumul des températures (cumul à partir du 1^{er} février- base 0°C - 18°C - Source : Météo France)

Situation au 8 mars 2025				
STATION		ALTITUDE	BASE 1 ^{er} JANVIER 2025	BASE 1 ^{er} FEVRIER 2025
Basse altitude (<800m)	Le Collet de Dèze	485m	508°C	275°C
	Saint Etienne Vallée Française	518m	534°C	293°C
	Florac	590m	410°C	223°C
	Villefort	620m	429°C	231°C
	Mende ville	710m	358°C	196°C
	Montrodât	763m	353°C	195°C
	St Germain du Teil	775m	387°C	216°C
Demi-Montagne (800m – 950m)	Rousses	812m	352°C	194°C
	Le Pont de Montvert	875m	362°C	196°C
	Le Massegros	890 m	305°C	189°C
	Altier	900m	325°C	200°C
	La Salle Prunet	903m	307°C	186°C
	St Pierre des Tripiers	929m	307°C	189°C
	Mende Chabrits	935m	329°C	186°C
Plateaux d'altitude (950m – 1200m)	Rimeize	939m	328°C	177°C
	Gatuzières	965m	319°C	183°C
	Sauveterre	1018m	289°C	165°C
	Aumont Aubrac	1018m	246°C	129°C
	Bassurels	1042m	279°C	158°C
	Les Salces	1075m	256°C	146°C
	Le Buisson	1088m	206°C	116°C
	Grandrieu	1163m	186°C	89°C
	Le Fau de Peyre	1163m	229°C	135°C
	Paulhac en Margeride	1175m	215°C	125°C
	Le Bleymard – bourg	1199m	225°C	133°C
Montagne (>1200m)	Châteauneuf de Randon	1247m	171°C	90°C
	La Panouse	1260m	181°C	99°C
	Le Bleymard	1418m	148°C	86°C

On utilise cette colonne
pour caler la
fertilisation (prairies,
céréales)

On utilise cette colonne
pour caler la gestion
des prairies (mise à
l'herbe, fauche)

Conseil de la semaine : **Début des apports azotés pour les plateaux d'altitude !**

Pour les prairies comme pour les céréales :

L'efficacité de la fertilisation azotée est augmentée quand les apports se font de manière précoce, dès que la végétation redémarre (présence de feuilles vertes), c'est à dire à partir du cumul de sommes de températures de **200°C à partir du 1er janvier**.

Le but est de favoriser le tallage des cultures !



En Cévennes, les préparations à la mise à l'herbe peuvent débuter, mais il n'est pas encore temps de sortir les animaux dans les parcelles !

Les gains hebdomadaires actuels pour les Cévennes sont d'environ 45°C, donc les 300°C pour la mise à l'herbe devraient tomber vers le 15-20 mars !

Dates clés pour l'optimisation de la gestion des prairies

Sommes de T° (base 1 ^{er} février)				
300°C	500°C	700-800°C	1000-1100°C	1200-1300°C
Mise à l'herbe	Fin du déprimage	Ensilage / Enrubannage	Foin précoce	Foin tardif

Conclusion des apports d'effluents d'élevage ! Tous les fumiers-lisiers doivent être épandus !



Les apports de fumier sur prairie doivent se faire de manière précoce : fin d'automne/hiver pour améliorer la minéralisation de la matière organique. Pour les plus tardifs il est encore temps !

Attention à ne pas épandre trop tardivement pour limiter le risque de retrouver du fumier dans le fourrage : perte de qualité.

Un apport de lisier entraîne un coup de fouet sur la prairie qui va démarrer et pousser rapidement grâce à l'azote, au phosphore et au potassium rapidement valorisables.

Attention à ne pas épandre trop tardivement pour limiter le risque de retrouver du lisier dans le fourrage : perte de qualité !

Les premiers passages de herse sur prairie peuvent débuter lorsque les conditions seront optimales et que les sols seront ressuyés !



Pour rappel :

Etats des sols interdits pour l'épandage



Les sols enneigés



Les sols gelés



Les sols inondés



Exceptions pour l'épandage sur sol gelé :

- Les fumiers compacts non susceptibles d'écoulements.
- Les composts d'effluents d'élevage.

Retrouver les Inf'Eau prairies et l'info ferti sur le site de la Chambre d'Agriculture de Lozère :
lozere.chambre-agriculture.fr – Production & Techniques – Fourrages – INFO prairie

Crédit photo : ©Gabin SEZILLE, ©Lucile SACHOT, Chambre d'Agriculture de la Lozère

Pour plus d'informations vous pouvez contacter les conseillers spécialisés
de la Chambre d'Agriculture au 04 66 65 62 00
Gabin SEZILLE (Agronomie)

Cumul des températures (cumul à partir du 1^{er} février- base 0°C - 18°C - Source : Météo France)

Situation au 16 mars 2025				
STATION		ALTITUDE	BASE 1 ^{er} JANVIER 2025	BASE 1 ^{er} FEVRIER 2025
Basse altitude (<800m)	Le Collet de Dèze	485m	587°C	330°C
	Saint Etienne Vallée Française	518m	614°C	350°C
	Florac	590m	484°C	274°C
	Villefort	620m	501°C	280°C
	Mende ville	710m	426°C	237°C
	Montrodat	763m	414°C	233°C
	St Germain du Teil	775m	450°C	254°C
Demi-Montagne (800m – 950m)	Rousses	812m	410°C	230°C
	Le Pont de Montvert	875m	424°C	233°C
	Le Massegros	890 m	355°C	220°C
	Altier	900m	374°C	232°C
	La Salle Prunet	903m	355°C	217°C
	St Pierre des Tripiers	929m	356°C	218°C
	Mende Chabrits	935m	384°C	218°C
Plateaux d'altitude (950m – 1200m)	Rimeize	939m	403°C	219°C
	Gatuzières	965m	370°C	211°C
	Sauveterre	1018m	331°C	188°C
	Aumont Aubrac	1018m	291°C	153°C
	Bassurels	1042m	321°C	180°C
	Les Salces	1075m	294°C	166°C
	Le Buisson	1088m	244°C	135°C
	Grandrieu	1163m	223°C	109°C
	Le Fau de Peyre	1163m	263°C	154°C
	Paulhac en Margeride	1175m	252°C	146°C
	Le Bleymard – bourg	1199m	262°C	151°C
Montagne (>1200m)	Châteauneuf de Randon	1247m	202°C	107°C
	La Panouse	1260m	212°C	114°C
	Le Bleymard	1418m	168°C	95°C

On utilise cette
colonne pour caler la
fertilisation (prairies,
céréales)

On utilise cette
colonne pour caler la
gestion des prairies
(mise à l'herbe,
fauche)

Conseil de la semaine : Début des mises à l'herbe dans les Cévennes ! Poursuite des apports azotés pour les plateaux d'altitude et en montagne !

En Cévennes, les mises à l'herbe peuvent débuter, les 300°C sont atteints ! Les animaux peuvent pâturer en priorité les parcelles les plus précoces et sèches ! Vigilance pour les parcelles humides afin de limiter le compactage !

Dates clés pour l'optimisation de la gestion des prairies

Sommes de T° (base 1 ^{er} février)				
300°C	500°C	700-800°C	1000-1100°C	1200-1300°C
Mise à l'herbe	Fin du déprimage	Ensilage / Enrubannage	Foin précoce	Foin tardif



Quelques repères pour l'optimisation du pâturage

Hauteur d'herbe optimale pour la rentrée des animaux dans la parcelle (10 / 12 cm d'herbe).

Hauteur d'herbe pour la sortie des animaux de la parcelle (environ 5 cm : au niveau du talon de la botte).

Si vous faites pâturer en dessous de cette hauteur d'herbe, l'herbe mettra plus de temps à repartir.



Au-delà de 15 cm d'herbe : réserver pour la fauche !

A cette hauteur d'herbe, les animaux vont pâturer mais créer des refus qui devront être broyés.

Pour les prairies comme pour les céréales :

L'efficacité de la fertilisation azotée est augmentée quand les apports se font de manière précoce, dès que la végétation redémarre (présence de feuilles vertes), c'est à dire à partir du cumul de sommes de températures de 200°C à partir du 1er janvier.

Le but est de favoriser le tallage des cultures !



**L'épandage d'azote sur les prairies doit se faire de manière précoce et optimale !
Pour garder une bonne qualité de fourrage, et éviter de retrouver de l'azote soluble dans les fourrages :**



Délai de 45 jours
minimum



Conclusion des apports d'effluents d'élevage ! Tous les fumiers-lisiers doivent être épandus !



Les apports de fumier et lisier sur les prairies doivent se faire de manière précoce : fin d'automne/hiver pour améliorer la minéralisation de la matière organique. Pour les plus tardifs : conclure les apports d'effluents !

Attention à ne pas épandre trop tardivement pour limiter le risque de retrouver du fumier dans le fourrage : perte de qualité.

Les passages de herse sur prairie peuvent continuer lorsque les conditions seront optimales et que les sols seront ressuyés !



Pour optimiser l'utilisation de la herse de prairie :

- Eviter un passage sur les prairies semées récemment
- Herser dans une fenêtre climatique adaptée en évitant un gel les 2/3 jours suivants, attention à la portance des sols
- Sur une prairie dégradée (campagnols, mousse...) ne pas avoir peur de faire 2 passages de herse !
- Après un pâturage, passage de herse pour étaler les bouses et aérer la prairie !

Pour rappel :

Etats des sols interdits pour l'épandage



Les sols enneigés



Les sols gelés



Les sols inondés



Exceptions pour l'épandage sur sol gelé :

- Les fumiers compacts non susceptibles d'écoulements.
- Les composts d'effluents d'élevage.

**Retrouver les Inf'Eau prairies et l'info ferti sur le site de la Chambre d'Agriculture de Lozère :
lozere.chambre-agriculture.fr – Production & Techniques – Fourrages – INFO prairie**

Crédit photo : ©Gabin SEZILLE, ©Lucile SACHOT, ©Marie-Amélie BROS, Chambre d'Agriculture de la Lozère

**Pour plus d'informations vous pouvez contacter les conseillers spécialisés
de la Chambre d'Agriculture au 04 66 65 62 00
Gabin SEZILLE (Agronomie)**

Cumul des températures (cumul à partir du 1^{er} février- base 0°C - 18°C - Source : Météo France)

Situation au 23 mars 2025				
STATION		ALTITUDE	BASE 1 ^{er} JANVIER 2025	BASE 1 ^{er} FEVRIER 2025
Basse altitude (<800m)	Le Collet de Dèze	485m	665°C	385°C
	Saint Etienne Vallée Française	518m	691°C	406°C
	Florac	590m	561°C	323°C
	Villefort	620m	575°C	330°C
	Mende ville	710m	503°C	286°C
	Montrodat	763m	488°C	278°C
	St Germain du Teil	775m	521°C	300°C
Demi-Montagne (800m – 950m)	Rousses	812m	472°C	271°C
	Le Pont de Montvert	875m	490°C	273°C
	Le Massegros	890 m	425°C	263°C
	Altier	900m	432°C	269°C
	La Salle Prunet	903m	414°C	254°C
	St Pierre des Tripiers	929m	422°C	260°C
	Mende Chabrits	935m	448°C	258°C
Plateaux d'altitude (950m – 1200m)	Rimeize	939m	486°C	259°C
	Gatuzières	965m	428°C	248°C
	Sauveterre	1018m	386°C	220°C
	Aumont Aubrac	1018m	350°C	182°C
	Bassurels	1042m	367°C	208°C
	Les Salces	1075m	343°C	194°C
	Le Buisson	1088m	292°C	157°C
	Grandrieu	1163m	276°C	136°C
	Le Fau de Peyre	1163m	312°C	178°C
	Paulhac en Margeride	1175m	308°C	176°C
	Le Bleymard – bourg	1199m	310°C	176°C
Montagne (>1200m)	Châteauneuf de Randon	1247m	244°C	128°C
	La Panouse	1260m	258°C	137°C
	Le Bleymard	1418m	199°C	107°C

On utilise cette
colonne pour caler la
fertilisation (prairies,
céréales)

On utilise cette
colonne pour caler la
gestion des prairies
(mise à l'herbe,
fauche)

**Conseil de la semaine : Poursuite des mises à l'herbe dans les zones de basse altitude !
Poursuite des apports azotés pour les plateaux d'altitude et en montagne !**

En basse altitude, les mises à l'herbe peuvent débuter, les 300°C sont atteints ! Les animaux peuvent pâturer en priorité les parcelles les plus précoces et sèches ! Vigilance pour les parcelles humides afin de limiter le compactage !

Dates clés pour l'optimisation de la gestion des prairies

Sommes de T° (base 1 ^{er} février)				
300°C	500°C	700-800°C	1000-1100°C	1200-1300°C
Mise à l'herbe	Fin du déprimage	Ensilage / Enrubannage	Foin précoce	Foin tardif



Quelques repères pour l'optimisation du pâturage

Hauteur d'herbe optimale pour la rentrée des animaux dans la parcelle (10 / 12 cm d'herbe).

Hauteur d'herbe pour la sortie des animaux de la parcelle (environ 5 cm : au niveau du talon de la botte).

Si vous faites pâturer en dessous de cette hauteur d'herbe, l'herbe mettra plus de temps à repartir.



Au-delà de 15 cm d'herbe : réserver pour la fauche !

A cette hauteur d'herbe, les animaux vont pâturer mais créer des refus qui devront être broyés.

Pour les prairies comme pour les céréales :

L'efficacité de la fertilisation azotée est augmentée quand les apports se font de manière précoce, dès que la végétation redémarre (présence de feuilles vertes), c'est à dire à partir du cumul de sommes de températures de 200°C à partir du 1er janvier.

Le but est de favoriser le tallage des cultures !



**L'épandage d'azote sur les prairies doit se faire de manière précoce et optimale !
Pour garder une bonne qualité de fourrage, et éviter de retrouver de l'azote soluble dans les fourrages :**



Délai de 45 jours
minimum



Conclusion des apports d'effluents d'élevage ! Tous les fumiers-lisiers doivent être épandus !



Les apports de fumier et lisier sur les prairies doivent se faire de manière précoce : fin d'automne/hiver pour améliorer la minéralisation de la matière organique. Pour les plus tardifs : conclure les apports d'effluents !

Attention à ne pas épandre trop tardivement pour limiter le risque de retrouver du fumier dans le fourrage : perte de qualité.

Les passages de herse sur prairie peuvent continuer lorsque les conditions seront optimales et que les sols seront ressuyés !



Pour optimiser l'utilisation de la herse de prairie :

- Eviter un passage sur les prairies semées récemment
- Herser dans une fenêtre climatique adaptée en évitant un gel les 2/3 jours suivants, attention à la portance des sols
- Sur une prairie dégradée (campagnols, mousse...) ne pas avoir peur de faire 2 passages de herse !
- Après un pâturage, passage de herse pour étaler les bouses et aérer la prairie !

Pour rappel :

Etats des sols interdits pour l'épandage



Les sols enneigés



Les sols gelés



Les sols inondés



Exceptions pour l'épandage sur sol gelé :

- Les fumiers compacts non susceptibles d'écoulements.
- Les composts d'effluents d'élevage.

**Retrouver les Inf'Eau prairies et l'info ferti sur le site de la Chambre d'Agriculture de Lozère :
lozere.chambre-agriculture.fr – Production & Techniques – Fourrages – INFO prairie**

Crédit photo : ©Gabin SEZILLE, ©Lucile SACHOT, ©Marie-Amélie BROS, Chambre d'Agriculture de la Lozère

**Pour plus d'informations vous pouvez contacter les conseillers spécialisés
de la Chambre d'Agriculture au 04 66 65 62 00
Gabin SEZILLE (Agronomie)**

Cumul des températures (cumul à partir du 1^{er} février- base 0°C - 18°C - Source : Météo France)

Situation au 30 mars 2025				
STATION		ALTITUDE	BASE 1 ^{er} JANVIER 2025	BASE 1 ^{er} FEVRIER 2025
Basse altitude (<800m)	Le Collet de Dèze	485m	777°C	464°C
	Saint Etienne Vallée Française	518m	799°C	487°C
	Florac	590m	636°C	395°C
	Villefort	620m	672°C	402°C
	Mende ville	710m	587°C	341°C
	Montrodât	763m	568°C	332°C
	St Germain du Teil	775m	601°C	354°C
Demi-Montagne (800m – 950m)	Rousses	812m	551°C	327°C
	Le Pont de Montvert	875m	587°C	336°C
	Le Massegros	890 m	499°C	309°C
	Altier	900m	503°C	320°C
	La Salle Prunet	903m	491°C	307°C
	St Pierre des Tripiers	929m	495°C	305°C
	Mende Chabrits	935m	517°C	303°C
Plateaux d'altitude (950m – 1200m)	Rimeize	939m	572°C	312°C
	Gatuzières	965m	497°C	292°C
	Sauveterre	1018m	451°C	261°C
	Aumont Aubrac	1018m	413°C	222°C
	Bassurels	1042m	436°C	251°C
	Les Salces	1075m	407°C	234°C
	Le Buisson	1088m	349°C	192°C
	Grandrieu	1163m	324°C	163°C
	Le Fau de Peyre	1163m	369°C	212°C
	Paulhac en Margeride	1175m	359°C	206°C
	Le Bleymard – bourg	1199m	366°C	210°C
Montagne (>1200m)	Châteauneuf de Randon	1247m	288°C	154°C
	La Panouse	1260m	305°C	163°C
	Le Bleymard	1418m	237°C	128°C

On utilise cette
colonne pour caler la
fertilisation (prairies,
céréales)

On utilise cette
colonne pour caler la
gestion des prairies
(mise à l'herbe,
fauche)

Conseil de la semaine : Début des mises à l'herbe en demi-montagne ! Poursuite des apports azotés en montagne !

En demi-montagne, les mises à l'herbe peuvent débuter ! Les 300°C sont atteints ! Les animaux peuvent pâturer en priorité les parcelles les plus précoces et sèches ! Vigilance pour les parcelles humides afin de limiter le compactage !

Pour les zones de basse altitude, il ne faut pas attendre d'avoir trop d'herbe pour sortir les animaux au risque de se faire déborder !

Dates clés pour l'optimisation de la gestion des prairies

Sommes de T° (base 1 ^{er} février)				
300°C	500°C	700-800°C	1000-1100°C	1200-1300°C
Mise à l'herbe	Fin du déprimage	Ensilage / Enrubannage	Foin précoce	Foin tardif



Quelques repères pour l'optimisation du pâturage

Hauteur d'herbe optimale pour la rentrée des animaux dans la parcelle (10 / 12 cm d'herbe).

Hauteur d'herbe idéale pour la sortie des animaux de la parcelle (environ 5 cm : au niveau du talon de la botte).

Si vous faites pâturer en dessous de cette hauteur d'herbe, l'herbe mettra plus de temps à repartir.



Au-delà de 15 cm d'herbe : réserver pour la fauche !

A cette hauteur d'herbe, les animaux vont pâturer mais créer des refus qui devront être broyés.

Pour les prairies comme pour les céréales :

L'efficacité de la fertilisation azotée est augmentée quand les apports se font de manière précoce, dès que la végétation redémarre (présence de feuilles vertes), c'est à dire à partir du cumul de sommes de températures de 200°C à partir du 1er janvier.

Le but est de favoriser le tallage des cultures !



**L'épandage d'azote sur les prairies doit se faire de manière précoce et optimale !
Pour garder une bonne qualité de fourrage, et éviter de retrouver de l'azote soluble dans les fourrages :**



Délai de 45 jours
minimum



Conclusion des apports d'effluents d'élevage ! Tous les fumiers-lisiers doivent être épandus !



Les apports de fumier et lisier sur les prairies doivent se faire de manière précoce : fin d'automne/hiver pour améliorer la minéralisation de la matière organique. Pour les plus tardifs : conclure les apports d'effluents !

Attention à ne pas épandre trop tardivement pour limiter le risque de retrouver du fumier dans le fourrage : perte de qualité.

Les passages de herse sur prairie peuvent continuer lorsque les conditions seront optimales et que les sols seront ressuyés !



Pour optimiser l'utilisation de la herse de prairie :

- Eviter un passage sur les prairies semées récemment
- Herser dans une fenêtre climatique adaptée en évitant un gel les 2/3 jours suivants, attention à la portance des sols
- Sur une prairie dégradée (campagnols, mousse...) ne pas avoir peur de faire 2 passages de herse !
- Après un pâturage, passage de herse pour étaler les bouses et aérer la prairie !

Pour rappel :

Etats des sols interdits pour l'épandage



Les sols enneigés



Les sols gelés



Les sols inondés



Exceptions pour l'épandage sur sol gelé :

- Les fumiers compacts non susceptibles d'écoulements.
- Les composts d'effluents d'élevage.

Retrouver les Inf'Eau prairies et l'info ferti sur le site de la Chambre d'Agriculture de Lozère :
lozere.chambre-agriculture.fr – Production & Techniques – Fourrages – INFO prairie

Crédit photo : ©Gabin SEZILLE, ©Lucile SACHOT, ©Marie-Amélie BROS, Chambre d'Agriculture de la Lozère

Pour plus d'informations vous pouvez contacter les conseillers spécialisés
de la Chambre d'Agriculture au 04 66 65 62 00
Gabin SEZILLE (Agronomie)

Cumul des températures (cumul à partir du 1^{er} février- base 0°C - 18°C - Source : Météo France)

Situation au 6 avril 2025				
STATION		ALTITUDE	BASE 1 ^{er} FEVRIER 2025	BASE 1 ^{er} FEVRIER 2024
Basse altitude (<800m)	Le Collet de Dèze	485m	552°C	672°C
	Saint Etienne Vallée Française	518m	578°C	697°C
	Florac	590m	473°C	570°C
	Villefort	620m	481°C	591°C
	Mende ville	710m	417°C	505°C
	Montrodat	763m	406°C	472°C
	St Germain du Teil	775m	435°C	494°C
Demi-Montagne (800m – 950m)	Rousses	812m	400°C	500°C
	Le Pont de Montvert	875m	410°C	489°C
	Le Massegros	890 m	383°C	439°C
	Altier	900m	391°C	441°C
	La Salle Prunet	903m	377°C	463°C
	St Pierre des Tripiers	929m	377°C	459°C
	Mende Chabrits	935m	376°C	452°C
Plateaux d'altitude (950m – 1200m)	Rimeize	939m	379°C	464°C
	Gatuzières	965m	360°C	439°C
	Sauveterre	1018m	327°C	405°C
	Aumont Aubrac	1018m	282°C	362°C
	Bassurels	1042m	313°C	412°C
	Les Salces	1075m	297°C	366°C
	Le Buisson	1088m	248°C	323°C
	Grandrieu	1163m	211°C	302°C
	Le Fau de Peyre	1163m	269°C	343°C
	Paulhac en Margeride	1175m	263°C	333°C
	Le Bleymard – bourg	1199m	266°C	353°C
Montagne (>1200m)	Châteauneuf de Randon	1247m	202°C	299°C
	La Panouse	1260m	216°C	290°C
	Le Bleymard	1418m	172°C	261°C

Dates clés pour l'optimisation de la gestion des prairies

Sommes de T° (base 1 ^{er} février)				
300°C	500°C	700-800°C	1000-1100°C	1200-1300°C
Mise à l'herbe	Fin du déprimage	Ensilage / Enrubannage	Foin précoce	Foin tardif

Conseil de la semaine : Fin du déprimage pour les Cévennes !

Poursuite des mises à l'herbe pour les zones de demi-montagne !

Préparation aux mises à l'herbe sur les plateaux d'altitude !

Finalisation des fertilisations en montagne !

Sur toutes les zones < 1000m, les mises à l'herbe peuvent s'effectuer !

Les 300°C sont atteints ! Les animaux peuvent pâturer en priorité les parcelles les plus précoces et sèches ! Vigilance pour les parcelles humides afin de limiter le compactage !

Pour les zones de basse altitude, il ne faut pas attendre d'avoir trop d'herbe pour sortir les animaux au risque de se faire déborder !



Quelques repères pour l'optimisation du pâturage

Hauteur d'herbe optimale pour la rentrée des animaux dans la parcelle (10 / 12 cm d'herbe).

Hauteur d'herbe idéale pour la sortie des animaux de la parcelle (environ 5 cm : au niveau du talon de la botte).

Si vous faites pâturer en dessous de cette hauteur d'herbe, l'herbe mettra plus de temps à repartir.



Au-delà de 15 cm d'herbe : réserver pour la fauche !

A cette hauteur d'herbe, les animaux vont pâturer mais créer des refus qui devront être broyés.

**L'épandage d'azote sur les prairies doit se faire de manière précoce et optimale !
Pour garder une bonne qualité de fourrage, et éviter de retrouver de l'azote soluble dans les fourrages :**



**Délai de 45 jours
minimum**



Etat des lieux de la pousse d'herbe en Lozère



Le déprimage sur les parcelles destinées à la fauche pour l'ensilage débute sur le secteur Trélans (env. 900m d'altitude).

On possède environ 400-500 kg MS disponible / hectare, avec un stade 3 feuilles optimal pour la mise à l'herbe !

Les pousses quotidiennes sont d'environ 10-15 kg MS/jour/ha sur les parcelles orientées au Nord, contre 45-50 kg MS/jour/ha sur les parcelles exposées au Sud !

**Retrouver les Inf'Eau prairies et l'info ferti sur le site de la Chambre d'Agriculture de Lozère :
lozere.chambre-agriculture.fr – Production & Techniques – Fourrages – INFO prairie**

Crédit photo : ©Gabin SEZILLE, ©Lucile SACHOT, ©Marie-Amélie BROS, Chambre d'Agriculture de la Lozère

**Pour plus d'informations vous pouvez contacter les conseillers spécialisés
de la Chambre d'Agriculture au 04 66 65 62 00
Gabin SEZILLE (Agronomie)**

Cumul des températures (cumul à partir du 1^{er} février- base 0°C - 18°C - Source : Météo France)

Situation au 13 avril 2025				
STATION		ALTITUDE	BASE 1 ^{er} FEVRIER 2025	BASE 1 ^{er} FEVRIER 2024
Basse altitude (<800m)	Le Collet de Dèze	485m	640°C	771°C
	Saint Etienne Vallée Française	518m	672°C	796°C
	Florac	590m	556°C	661°C
	Villefort	620m	559°C	684°C
	Mende ville	710m	496°C	594°C
	Montrodat	763m	483°C	556°C
	St Germain du Teil	775m	519°C	579°C
Demi-Montagne (800m – 950m)	Rousses	812m	473°C	582°C
	Le Pont de Montvert	875m	488°C	574°C
	Le Massegros	890 m	460°C	519°C
	Altier	900m	468°C	516°C
	La Salle Prunet	903m	451°C	541°C
	St Pierre des Tripiers	929m	453°C	540°C
	Mende Chabrits	935m	457°C	536°C
Plateaux d'altitude (950m – 1200m)	Rimeize	939m	444°C	544°C
	Gatuzières	965m	436°C	518°C
	Sauveterre	1018m	403°C	481°C
	Aumont Aubrac	1018m	342°C	432°C
	Bassurels	1042m	379°C	484°C
	Les Salces	1075m	366°C	438°C
	Le Buisson	1088m	304°C	389°C
	Grandrieu	1163m	257°C	364°C
	Le Fau de Peyre	1163m	336°C	411°C
	Paulhac en Margeride	1175m	325°C	403°C
	Le Bleymard – bourg	1199m	332°C	421°C
Montagne (>1200m)	Châteauneuf de Randon	1247m	260°C	358°C
	La Panouse	1260m	270°C	352°C
	Le Bleymard	1418m	229°C	320°C

Dates clés pour l'optimisation de la gestion des prairies

Sommes de T° (base 1 ^{er} février)				
300°C	500°C	700-800°C	1000-1100°C	1200-1300°C
Mise à l'herbe	Fin du déprimage	Ensilage / Enrubannage	Foin précoce	Foin tardif

Conseil de la semaine : Fin du déprimage pour les zones de basse altitude !

Poursuite du pâturage pour les zones de demi-montagne !

Mises à l'herbe sur les plateaux d'altitude !

Préparation aux mises à l'herbe en montagne !

Pour les Cévennes, on prépare les premiers chantiers de récolte! On s'approche des 700°C qui correspondent à des chantiers de récolte en ensilage ou enrubannage avec recherche de qualité !

Pour les zones de basse altitude, c'est la fin du déprimage ! Les 500°C sont atteints, les parcelles destinées à la fauche par la suite doivent être débrayées ! Les animaux peuvent continuer le tour de pâturage, vigilance pour les parcelles humides afin de limiter le compactage !



En demi-montagne, poursuite des mises à l'herbe! Les animaux peuvent déprimer les parcelles de fauche ! Le seuil des 500°C qui marque la fin du déprimage arrive rapidement ! Pour les plus tardifs il ne faut pas attendre avant de sortir les animaux au risque de se faire déborder !

Sur les plateaux d'altitude, les mises à l'herbe peuvent s'effectuer ! Les 300°C sont atteints ! Les animaux peuvent pâturer en priorité les parcelles les plus précoces et sèches ! Vigilance pour les parcelles humides afin de limiter le compactage !



En Montagne, on prépare la mise à l'herbe ! Les 300°C ne sont pas encore atteints mais les préparations aux premières mises à l'herbe peuvent s'effectuer ! Tous les apports de fertilisation doivent se conclure afin de respecter les délais entre les apports et les récoltes (que ce soit pâturage comme fauche) !



Quelques repères pour l'optimisation du pâturage

Hauteur d'herbe optimale pour la rentrée des animaux dans la parcelle (10 / 12 cm d'herbe).

Hauteur d'herbe idéale pour la sortie des animaux de la parcelle (environ 5 cm : au niveau du talon de la botte).

Si vous faites pâturer en dessous de cette hauteur d'herbe, l'herbe mettra plus de temps à repartir.



Au-delà de 15 cm d'herbe : réserver pour la fauche !

A cette hauteur d'herbe, les animaux vont pâturer mais créer des refus qui devront être broyés.

**L'épandage d'azote sur les prairies doit se faire de manière précoce et optimale !
Pour garder une bonne qualité de fourrage, et éviter de retrouver de l'azote soluble dans les fourrages :**



Délai de 45 jours minimum



Etat des lieux de la pousse d'herbe en Lozère

Secteur	Date	Hauteur d'herbe	Quantité d'herbe disponible / ha	Observations
Le Malzieu-Forain	10/04	5,4 cm d'herbe	89 kg MS	Moyenne de 15 parcelles (prairies temporaires et naturelles). La parcelle la plus précoce possède 566 kg MS disponible / ha.
Trélans	14/04	6 cm d'herbe	246 kg MS	Moyenne de 13 parcelles (prairies temporaires et naturelles). Mise à l'herbe réalisée le 8/04. Déprimage des parcelles de fauche en cours. 1 tMS disponible / ha sur les parcelles précoces qui vont être déprimées par la suite !
Grandrieu	08/04	4,7 cm d'herbe	- 29 kg MS	Moyenne de 15 parcelles (prairies naturelles et temporaires). Quantité d'herbe négative car le seuil est de 5cm d'herbe minimum auquel il ne faut pas descendre en dessous (surpâturage ou fauche trop rase).
Le Buisson	11/04	5,6 cm d'herbe	174 kg MS	Moyenne de 15 parcelles (prairies temporaires et naturelles). Mise à l'herbe effectuée le 07/04 Pousse d'herbe intéressante (40 kg MS/jour/ha) !
Nasbinals	11/04	5,3 cm d'herbe	72 kg MS	Moyenne de 7 prairies naturelles exclusivement pâturées. Pousse d'herbe assez faible pour le moment (entre 5 et 10 kg MS/jour/ha).



Retrouver les Inf'Eau prairies et l'info ferti sur le site de la Chambre d'Agriculture de Lozère :
lozere.chambre-agriculture.fr – Production & Techniques – Fourrages – INFO prairie

Crédit photo : ©Gabin SEZILLE, ©Lucile SACHOT, ©Marie-Amélie BROS, Chambre d'Agriculture de la Lozère

**Pour plus d'informations vous pouvez contacter les conseillers spécialisés
de la Chambre d'Agriculture au 04 66 65 62 00
Gabin SEZILLE (Agronomie)**

Cumul des températures (cumul à partir du 1^{er} février- base 0°C - 18°C - Source : Météo France)

Situation au 20 avril 2025				
STATION		ALTITUDE	BASE 1 ^{er} FEVRIER 2025	BASE 1 ^{er} FEVRIER 2024
Basse altitude (<800m)	Le Collet de Dèze	485m	715°C	859°C
	Saint Etienne Vallée Française	518m	749°C	885°C
	Florac	590m	626°C	742°C
	Villefort	620m	628°C	764°C
	Mende ville	710m	562°C	660°C
	Montrodat	763m	544°C	619°C
	St Germain du Teil	775m	584°C	642°C
Demi-Montagne (800m – 950m)	Rousses	812m	532°C	648°C
	Le Pont de Montvert	875m	548°C	643°C
	Le Massegros	890 m	519°C	577°C
	Altier	900m	523°C	573°C
	La Salle Prunet	903m	506°C	605°C
	St Pierre des Tripiers	929m	510°C	599°C
	Mende Chabrits	935m	513°C	597°C
Plateaux d'altitude (950m – 1200m)	Rimeize	939m	507°C	596°C
	Gatuzières	965m	490°C	575°C
	Sauveterre	1018m	455°C	535°C
	Aumont Aubrac	1018m	393°C	479°C
	Bassurels	1042m	426°C	541°C
	Les Salces	1075m	414°C	488°C
	Le Buisson	1088m	347°C	432°C
	Grandrieu	1163m	296°C	403°C
	Le Fau de Peyre	1163m	380°C	456°C
	Paulhac en Margeride	1175m	372°C	444°C
	Le Bleymard – bourg	1199m	374°C	471°C
Montagne (>1200m)	Châteauneuf de Randon	1247m	301°C	398°C
	La Panouse	1260m	309°C	390°C
	Le Bleymard	1418m	260°C	358°C

Dates clés pour l'optimisation de la gestion des prairies

Sommes de T° (base 1 ^{er} février)				
300°C	500°C	700-800°C	1000-1100°C	1200-1300°C
Mise à l'herbe	Fin du déprimage	Ensilage / Enrubannage	Foin précoce	Foin tardif

Conseil de la semaine : Préparation aux premiers chantiers de récolte pour les Cévennes !
Fin du déprimage pour les zones de demi-montagne !
Poursuite des mises à l'herbe sur les plateaux d'altitude !
Préparation et début des mises à l'herbe en montagne !

Pour les Cévennes, on prépare les premiers chantiers de récolte! On a atteint cette semaine les 700°C qui correspondent à des chantiers de récolte en ensilage ou enrubannage avec recherche de qualité !

Pour les zones de demi-montagne, c'est la fin du déprimage ! Les 500°C sont atteints, les parcelles destinées à la fauche par la suite doivent être débrayées ! Les animaux peuvent continuer le tour de pâturage, vigilance pour les parcelles humides afin de limiter le compactage !



Sur les plateaux d'altitude, poursuite des mises à l'herbe! Les animaux peuvent déprimer les parcelles de fauche ! Le seuil des 500°C qui marque la fin du déprimage arrive rapidement ! Pour les plus tardifs il ne faut pas attendre avant de sortir les animaux au risque de se faire déborder !

En montagne, les mises à l'herbe peuvent s'effectuer ! Les 300°C sont atteints ! Les animaux peuvent pâturer en priorité les parcelles les plus précoces et sèches ! Vigilance pour les parcelles humides afin de limiter le compactage !

Photo d'une parcelle (altitude 920m) destinée à la fauche pour l'ensilage !
Déprimage réalisé entre le 8 et le 12 avril par 24 couples, environ 400 kg MS consommé par ha.
Actuellement 1T264kg MS disponible / ha avec une belle proportion de trèfle !
Pousse d'herbe de 104 kg MS / jour / ha entre le 14 et le 22 avril !



Quelques repères pour l'optimisation du pâturage

Hauteur d'herbe optimale pour la rentrée des animaux dans la parcelle (10 / 12 cm d'herbe).

Hauteur d'herbe idéale pour la sortie des animaux de la parcelle (environ 5 cm : au niveau du talon de la botte).

Si vous faites pâturer en dessous de cette hauteur d'herbe, l'herbe mettra plus de temps à repartir.



Au-delà de 15 cm d'herbe : réserver pour la fauche !

A cette hauteur d'herbe, les animaux vont pâturer mais créer des refus qui devront être broyés.

**L'épandage d'azote sur les prairies doit se faire de manière précoce et optimale !
Pour garder une bonne qualité de fourrage, et éviter de retrouver de l'azote soluble dans les fourrages :**



Délai de 45 jours minimum



Etat des lieux de la pousse d'herbe en Lozère

Secteur	Date	Hauteur d'herbe	Quantité d'herbe disponible / ha	Observations
Le Malzieu-Forain	17/04	6,4 cm d'herbe	328 kg MS	Moyenne de 15 parcelles (prairies temporaires et naturelles). L'herbe se développe bien (passage de 89 kg à 328 kg MS disponible/ha) en une semaine !
Trélans	22/04	7,2 cm d'herbe	518 kg MS	Moyenne de 15 parcelles (prairies temporaires et naturelles). Mise à l'herbe réalisée le 8/04. Déprimage des parcelles de fauche en cours. Passage de 250 kg à 518 kg MS disponible / ha en 8 jours !
Grandrieu	22/04	6,1 cm d'herbe	245 kg MS	Moyenne de 15 parcelles (prairies naturelles et temporaires). La pousse d'herbe ralentit cette semaine à cause du coup de froid et des gelées !
Le Buisson	18/04	6,8 cm d'herbe	444 kg MS	Moyenne de 14 parcelles (prairies temporaires et naturelles). Mise à l'herbe effectuée le 07/04. Passage de 174 à 444kg MS disponible / ha en une semaine !
Nasbinals	18/04	5,9 cm d'herbe	200 kg MS	Moyenne de 7 prairies naturelles exclusivement pâturées. Pousse d'herbe qui se réveille bien : passage de 72 à 200 kg MS disponible / ha en une semaine !



Retrouver les Inf'eau prairies et les infos ferti sur le site de la Chambre d'Agriculture de Lozère :
lozere.chambre-agriculture.fr – Production & Techniques – Fourrages – INFO prairie

Crédit photo : ©Gabin SEZILLE, ©Lucile SACHOT, ©Marie-Amélie BROS, Chambre d'Agriculture de la Lozère

Pour plus d'informations vous pouvez contacter les conseillers spécialisés
de la Chambre d'Agriculture au 04 66 65 62 00
Gabin SEZILLE (Agronomie)

Cumul des températures (cumul à partir du 1^{er} février- base 0°C - 18°C - Source : Météo France)

Situation au 26 avril 2025				
STATION		ALTITUDE	BASE 1 ^{er} FEVRIER 2025	BASE 1 ^{er} FEVRIER 2024
Basse altitude (<800m)	Le Collet de Dèze	485m	796°C	908°C
	Saint Etienne Vallée Française	518m	835°C	934°C
	Florac	590m	694°C	784°C
	Villefort	620m	705°C	805°C
	Mende ville	710m	623°C	692°C
	Montrodat	763m	602°C	649°C
	St Germain du Teil	775m	641°C	675°C
Demi-Montagne (800m – 950m)	Rousses	812m	593°C	677°C
	Le Pont de Montvert	875m	609°C	676°C
	Le Massegros	890 m	572°C	603°C
	Altier	900m	585°C	592°C
	La Salle Prunet	903m	563°C	631°C
	St Pierre des Tripiers	929m	563°C	624°C
	Mende Chabrits	935m	567°C	619°C
Plateaux d'altitude (950m – 1200m)	Rimeize	939m	568°C	623°C
	Gatuzières	965m	542°C	596°C
	Sauveterre	1018m	504°C	555°C
	Aumont Aubrac	1018m	437°C	495°C
	Bassurels	1042m	479°C	559°C
	Les Salces	1075m	459°C	506°C
	Le Buisson	1088m	389°C	444°C
	Grandrieu	1163m	339°C	414°C
	Le Fau de Peyre	1163m	421°C	466°C
	Paulhac en Margeride	1175m	413°C	453°C
	Le Bleymard – bourg	1199m	419°C	482°C
Montagne (>1200m)	Châteauneuf de Randon	1247m	342°C	406°C
	La Panouse	1260m	347°C	397°C
	Le Bleymard	1418m	297°C	363°C

Dates clés pour l'optimisation de la gestion des prairies

Sommes de T° (base 1 ^{er} février)				
300°C	500°C	700-800°C	1000-1100°C	1200-1300°C
Mise à l'herbe	Fin du déprimage	Ensilage / Enrubannage	Foin précoce	Foin tardif

Conseil de la semaine : Début des premiers chantiers de récolte pour les Cévennes !
Fin du déprimage pour les zones de demi-montagne !
Poursuite des mises à l'herbe sur les plateaux d'altitude !
Début des mises à l'herbe en montagne !

Pour les Cévennes, c'est le début des premiers chantiers de récolte! On se situe entre les 700 et les 800°C qui correspondent à des chantiers de récolte en ensilage ou enrubannage ! Les conditions météo annoncées cette fin de semaine semblent favorables !



Pour les zones de demi-montagne, c'est la fin du déprimage ! Les 500°C sont atteints, les parcelles destinées à la fauche par la suite doivent être débrayées ! Les animaux peuvent continuer le tour de pâturage, vigilance pour les parcelles humides afin de limiter le compactage !

Sur les plateaux d'altitude, poursuite des mises à l'herbe! Les animaux peuvent déprimer les parcelles de fauche ! Le seuil des 500°C qui marque la fin du déprimage arrive rapidement ! Pour les plus tardifs il ne faut pas attendre avant de sortir les animaux au risque de se faire déborder !

En montagne, les mises à l'herbe peuvent s'effectuer ! Les 300°C sont atteints ! Les animaux peuvent pâturer en priorité les parcelles les plus précoces et sèches ! Vigilance pour les parcelles humides afin de limiter le compactage !



Quelques repères pour l'optimisation du pâturage

Hauteur d'herbe optimale pour la rentrée des animaux dans la parcelle (10 / 12 cm d'herbe).

Hauteur d'herbe idéale pour la sortie des animaux de la parcelle (environ 5 cm : au niveau du talon de la botte).

Si vous faites pâturer en dessous de cette hauteur d'herbe, l'herbe mettra plus de temps à repartir.



Au-delà de 15 cm d'herbe : réserver pour la fauche !

A cette hauteur d'herbe, les animaux vont pâturer mais créer des refus qui devront être broyés.

L'épandage d'azote sur les prairies doit se faire de manière précoce et optimale !
Pour garder une bonne qualité de fourrage, et éviter de retrouver de l'azote soluble dans les fourrages :



Délai de 45 jours minimum



Etat des lieux de la pousse d'herbe en Lozère

Secteur	Date	Hauteur d'herbe	Quantité d'herbe disponible / ha	Observations
Le Malzieu-Forain	24/04	8,1 cm d'herbe	753 kg MS	Moyenne de 14 parcelles (prairies temporaires et naturelles). Déprimage en cours des parcelles de fauche prévues pour l'ensilage ! L'herbe se développe bien (passage de 328 à 753 kg MS disponible/ha) en une semaine !
Trélans	28/04	9,2 cm d'herbe	1T051 kg MS	Moyenne de 14 parcelles (prairies temporaires et naturelles). Mise à l'herbe réalisée le 8/04. Déprimage des parcelles de fauche en cours. Passage de 518 kg à 1T051kg MS disponible / ha en 6 jours !
Grandrieu	22/04	6,1 cm d'herbe	245 kg MS	Moyenne de 15 parcelles (prairies naturelles et temporaires). Sortie des vaches au pâturage depuis le 17/04. La pousse d'herbe ralentit cette semaine à cause du coup de froid et des gelées !
Le Buisson	25/04	8,7 cm d'herbe	947 kg MS	Moyenne de 15 parcelles (prairies temporaires et naturelles). Mise à l'herbe effectuée le 07/04 ! Premier tour de pâturage en train de se conclure et début du second tour ! Passage de 444kg à 947 kg MS disponible / ha en une semaine !
Nasbinals	25/04	7 cm d'herbe	472 kg MS	Moyenne de 7 prairies naturelles exclusivement pâturées. Pousse d'herbe qui se réveille bien : passage de 200 à 472 kg MS disponible / ha en une semaine !



Retrouver les Inf'eau prairies et les infos ferti sur le site de la Chambre d'Agriculture de Lozère :
lozere.chambre-agriculture.fr – Production & Techniques – Fourrages – INFO prairie

Crédit photo : ©Gabin SEZILLE, ©Lucile SACHOT, ©Marie-Amélie BROS, Chambre d'Agriculture de la Lozère

Pour plus d'informations vous pouvez contacter les conseillers spécialisés
de la Chambre d'Agriculture au 04 66 65 62 00
Gabin SEZILLE (Agronomie)


Cumul des températures (cumul à partir du 1^{er} février- base 0°C - 18°C - Source : Météo France)

Situation au 4 mai 2025				
STATION		ALTITUDE	BASE 1 ^{er} FEVRIER 2025	BASE 1 ^{er} FEVRIER 2024
Basse altitude (<800m)	Le Collet de Dèze	485m	925°C	997°C
	Saint Etienne Vallée Française	518m	968°C	1023°C
	Florac	590m	810°C	864°C
	Villefort	620m	822°C	888°C
	Mende ville	710m	733°C	768°C
	Montrodât	763m	710°C	720°C
	St Germain du Teil	775m	761°C	746°C
Demi-Montagne (800m – 950m)	Rousses	812m	702°C	746°C
	Le Pont de Montvert	875m	720°C	743°C
	Le Massegros	890 m	683°C	670°C
	Altier	900m	699°C	652°C
	La Salle Prunet	903m	672°C	696°C
	St Pierre des Tripiers	929m	673°C	689°C
	Mende Chabrits	935m	677°C	619°C
Plateaux d'altitude (950m – 1200m)	Rimeize	939m	672°C	688°C
	Gatuzières	965m	649°C	659°C
	Sauveterre	1018m	610°C	619°C
	Aumont Aubrac	1018m	534°C	558°C
	Bassurels	1042m	580°C	621°C
	Les Salces	1075m	556°C	565°C
	Le Buisson	1088m	479°C	495°C
	Grandrieu	1163m	423°C	471°C
	Le Fau de Peyre	1163m	516°C	515°C
	Paulhac en Margeride	1175m	516°C	503°C
	Le Bleymard – bourg	1199m	518°C	532°C
Montagne (>1200m)	Châteauneuf de Randon	1247m	432°C	454°C
	La Panouse	1260m	434°C	444°C
	Le Bleymard	1418m	380°C	402°C

Dates clés pour l'optimisation de la gestion des prairies

Sommes de T° (base 1 ^{er} février)				
300°C	500°C	700-800°C	1000-1100°C	1200-1300°C
Mise à l'herbe	Fin du déprimage	Ensilage / Enrubannage	Foin précoce	Foin tardif

Conseil de la semaine :



Pour les zones de basse altitude, c'est le moment de faucher pour les premiers chantiers de récolte!

Cette semaine, les conditions météo ne sont pas optimales ! Cependant, les sommes de température avancent rapidement et le stade des prairies également ! Pour rappel : l'optimum entre qualité et quantité se trouve au stade début épiaison (ce qui correspond à 3 épis sur 1m linéaire).



Pour les zones de demi-montagne, les préparations aux premiers chantiers de récolte peuvent s'effectuer!

Les 700°C sont atteints ou proches, ce qui correspond à une récolte en ensilage-enrubannage avec recherche de qualité ! Les animaux peuvent continuer le tour de pâturage, vigilance pour les parcelles humides afin de limiter le compactage !

Sur les plateaux d'altitude, c'est la fin du déprimage!

Le seuil des 500°C qui marque la fin du déprimage est atteint ! Les parcelles destinées à la fauche doivent être débrayées ! Pour les plus tardifs il ne faut pas attendre avant de sortir les animaux au risque de se faire déborder !

En montagne, les mises à l'herbe peuvent s'effectuer !

Les 300°C sont atteints ! Les animaux peuvent pâturer en priorité les parcelles les plus précoces et sèches ! Vigilance pour les parcelles humides afin de limiter le compactage !



Quelques conseils pour réussir son chantier de récolte :

Pour l'ensilage d'herbe :



- Récolte au stade optimal (début épiaison dans l'idéal) pour allier qualité et quantité !
- Ne pas faucher trop bas (environ 5 – 6 cm minimum) pour limiter les butyriques, et favoriser une repousse de la prairie !
- S'assurer d'avoir une fenêtre climatique favorable pour que l'herbe puisse se ressuyer correctement et atteindre 25%-30% de MS.
- S'assurer d'une bonne finesse de hachage.
- Soigner la confection du tas d'ensilage par un tassage important !



Pour l'enrubannage :

- Récolte au stade optimal (début épiaison dans l'idéal) pour allier qualité et quantité !
- Ne pas faucher trop bas (environ 5 – 6 cm minimum) pour limiter les butyriques, et favoriser une repousse de la prairie !
- S'assurer d'avoir une fenêtre climatique de 2/3 jours pour pouvoir pré-faner et atteindre 50% de MS.
- Possibilité d'utiliser les couteaux sur certaines presses pour faciliter la préparation de la ration et la distribution.
- Limiter au maximum la manutention des bottes pour conserver une bonne qualité de conservation !



Mise à l'herbe effectuée des animaux sur les contreforts de l'Aubrac !



Quelques repères pour l'optimisation du pâturage

Hauteur d'herbe optimale pour la rentrée des animaux dans la parcelle (10 / 12 cm d'herbe).

Hauteur d'herbe idéale pour la sortie des animaux de la parcelle (environ 5 cm : au niveau du talon de la botte).

Si vous faites pâturer en dessous de cette hauteur d'herbe, l'herbe mettra plus de temps à repartir.



Au-delà de 15 cm d'herbe : réserver pour la fauche !

A cette hauteur d'herbe, les animaux vont pâturer mais créer des refus qui devront être broyés.

L'épandage d'azote sur les prairies doit se faire de manière précoce et optimale !
Pour garder une bonne qualité de fourrage, et éviter de retrouver de l'azote soluble dans les fourrages :



Délai de 45 jours minimum



Etat des lieux de la pousse d'herbe en Lozère

Secteur	Date	Hauteur d'herbe	Quantité d'herbe disponible / ha	Observations
Le Malzieu-Forain	30/04	9,6 cm d'herbe	1T160 kg MS	Moyenne de 15 parcelles (prairies temporaires et naturelles). Déprimage en cours des parcelles de fauche prévues pour l'ensilage ! L'herbe se développe bien (passage de 753 kg MS à 1T160 kg MS disponible/ha) en 6 jours !
Trélans	05/05	14,9 cm d'herbe (D+F) 9,5 cm d'herbe (P)	2T445 kg MS (D+F) 1T151 kg MS (P)	Moyenne de 6 parcelles en déprimage + fauche. Moyenne de 7 parcelles de pâturage. Mise à l'herbe réalisée le 8/04. Le déprimage des parcelles pour la fauche ensilage est fini, déprimage des parcelles de fauche en foin en cours.
Grandrieu	06/05	7,3 cm d'herbe	561 kg MS	Moyenne de 14 parcelles (prairies naturelles et temporaires). Sortie des vaches au pâturage depuis le 17/04. Déprimage en cours sur les parcelles prévues en fauche pour récolter en foin ! Croissance moyenne de 37 kg MS/jour/ha depuis le 29/04 !
Le Buisson	30/04	11,7 cm d'herbe (F) 8,4 cm d'herbe (P)	1T742 kg MS (F) 853 kg MS (P)	Moyenne de 11 parcelles prévues pour la fauche (F). Moyenne de 10 parcelles de pâturage (P). Croissance très importante sur les prairies temporaires (100-120 kg MS/jour/ha). Pousse moins forte sur les prairies naturelles (50-60 kg MS/jour/ha).
Nasbinals	30/04	7,9 cm d'herbe	705 kg MS	Moyenne de 7 prairies naturelles exclusivement pâturées. Pousse d'herbe qui se réveille bien : + 47 kg MS/jour/ha entre le 25 et le 30/04 !

Retrouver les Inf'eau prairies et les infos ferti sur le site de la Chambre d'Agriculture de Lozère :
lozere.chambre-agriculture.fr – Production & Techniques – Fourrages – INFO prairie

Crédit photo : ©Gabin SEZILLE, ©Lucile SACHOT, ©Marie-Amélie BROS, Chambre d'Agriculture de la Lozère

**Pour plus d'informations vous pouvez contacter les conseillers spécialisés
de la Chambre d'Agriculture au 04 66 65 62 00
Gabin SEZILLE (Agronomie)**

Inf'eau prairie Lozère

13 mai 2025



Cumul des températures


(Cumul à partir du 1^{er} février – base 0°C – 18°C) - Source : Météo France

Situation au 11 mai 2025


	Station	Altitude	Base au 1 ^{er} février 2025	Base au 1 ^{er} février 2024
Basse altitude (< 800 m) 	Collet de Dèze	485m	1010°C	1106°C
	Saint-Etienne Vallée Française	518m	1056°C	1131°C
	Florac	590m	888°C	961°C
	Villefort	620m	901°C	986°C
	Mende (ville)	710m	805°C	859°C
	Montrodat	763m	778°C	810°C
	Saint-Germain du Teil	775m	831°C	839°C
Demi-Montagne (800 m – 950 m) 	Rousses	812m	768°C	834°C
	Pont-de-Montvert	875m	789°C	834°C
	Massegros	890 m	748°C	756°C
	Altier	900m	764°C	731°C
	Salle Prunet	903m	735°C	782°C
	Saint-Pierre des Tripiers	929m	737°C	775°C
	Mende (Chabrits)	935m	739°C	770°C
	Rimeize	939m	739°C	777°C
Plateaux d'altitude (950 m – 1 200 m) 	Gatuzières	965m	708°C	745°C
	Sauveterre	1018m	658°C	703°C
	Aumont-Aubrac	1018m	587°C	633°C
	Bassurels	1042m	632°C	700°C
	Salces	1075m	607°C	642°C
	Buisson	1088m	527°C	564°C
	Grandrieu	1163m	463°C	539°C
	Fau de Peyre	1163m	565°C	586°C
	Paulhac en Margeride	1175m	565°C	575°C
	Bleymard (bourg)	1199m	565°C	606°C
Montagne (> 1 200 m) 	Châteauneuf-de-Randon	1247m	474°C	521°C
	Panouse	1260m	476°C	511°C
	Bleymard	1418m	414°C	467°C

Dates clés pour l'optimisation de la gestion des prairies

Sommes de températures (base 1^{er} février)



300°C



500°C



700 – 800°C



1 000 –
1 100°C



1 200 –
1 300°C

Mise à l'herbe

Fin du déprimage

Ensilage/Enrubannage

Foin précoce

Foin tardif



Le conseil de la semaine :



Basse altitude



Demi-Montagne



Plateau d'altitude



Montagne

Pour les zones < 1000m :
profiter de la fenêtre
climatique de cette fin de
semaine pour réaliser les
chantiers de récolte !

Pour les zones < 1000m :
profiter de la fenêtre
climatique de cette fin de
semaine pour réaliser les
chantiers de récolte !

Fin du déprimage
Préparation aux chantiers
de récolte qui vont
pouvoir débuter dès la
semaine prochaine !

Poursuite de la mise à
l'herbe et du déprimage



Pour les zones de basse altitude,
C'est le moment de faucher pour continuer les
chantiers de récolte !

Cette fin de semaine, les conditions météo sont optimales ! Les
chantiers de récolte en ensilage/enrubannage doivent se
poursuivre !

En Cévennes, les premiers chantiers de récolte en foin précoce
peuvent débuter : les 1000°C sont atteints !

Pour les zones de demi-montagne,
Début des chantiers de récolte !

Les 700°C sont atteints, ce qui correspond à une récolte en ensilage-
enrubannage avec recherche de qualité !

Les conditions météo de cette fin de semaine sont optimales !



Sur les plateaux d'altitude,
C'est la fin du déprimage !

Le seuil des 500°C qui marque la fin du déprimage est atteint ! Les
parcelles destinées à la fauche doivent être débrayées !

Les préparations pour les premiers chantiers de récolte peuvent
s'effectuer : les 700°C arrivent rapidement !

Poursuite des mises à l'herbe !

Les 300°C sont atteints ! Les animaux peuvent pâturer en priorité les
parcelles les plus précoces et sèches ! Vigilance pour les parcelles
humides afin de limiter le compactage !

Pour les plus tardifs, il ne faut pas attendre pour sortir les animaux
au risque de se faire déborder par la pousse d'herbe !



Quelques conseils pour réussir son chantier de récolte :

Pour l'ensilage d'herbe :

- Récolte au stade optimal (début épiaison dans l'idéal) pour allier qualité et quantité
- Ne pas faucher trop bas (environ 5 – 6 cm minimum) pour limiter les butyriques, et favoriser une repousse de la prairie
- S'assurer d'avoir une fenêtre climatique favorable pour que l'herbe puisse se ressuyer correctement et atteindre 25 – 30 % de MS
- S'assurer d'une bonne finesse de hachage
- Soigner la confection du tas d'ensilage par un tassage important



Pour l'enrubannage :

- Récolte au stade optimal (début épiaison dans l'idéal) pour allier qualité et quantité
- Ne pas faucher trop bas (environ 5 – 6 cm minimum) pour limiter les butyriques, et favoriser une repousse de la prairie
- S'assurer d'avoir une fenêtre climatique favorable de 2/3 jours pour pouvoir pré-faner et atteindre 50 % de MS
- Possibilité d'utiliser les couteaux sur certaines presses pour faciliter la préparation de la ration et la distribution
- Limiter au maximum la manutention des bottes pour conserver une bonne qualité de conservation



*Sur le secteur
Grandrieu, on se
trouve cette
semaine à
463°C !*

*Déprimage des
prairies
naturelles de
fauche en cours !*



Quelques repères pour l'optimisation du pâturage :



HAUTEUR OPTIMALE

POUR LA RENTRÉE DES ANIMAUX dans la parcelle

10 – 12 cm d'herbe



HAUTEUR IDÉALE

POUR LA SORTIE DES ANIMAUX de la parcelle

Si vous faites pâturer en dessous de cette hauteur d'herbe, elle mettra plus de temps à repartir

Environ 5 cm : au niveau du talon de la botte



RÉSERVER POUR LA FAUCHE !

À cette hauteur d'herbe, les animaux vont pâturer mais créer des refus qui devront être broyés

Au-delà de 15 cm



**L'épandage d'azote sur les prairies doit se faire de manière précoce et optimale !
Pour garder une bonne qualité de fourrage, et éviter de retrouver de l'azote soluble dans
les fourrages :**



Délai de
45 jours
minimum





État des lieux de la pousse d'herbe en Lozère

	Secteur 	Date 	Hauteur d'herbe 	Quantité d'herbe disponible / ha
	Le Malzieu- Forain	7 mai	9,4 cm (P) 12 cm (F)	1T124 kg MS 1T798 kg MS
Observations 	Moyenne de 14 parcelles (prairies temporaires et naturelles). Déprimage en cours des parcelles de fauche depuis le 20/04. Pousse importante : + 81 kg MS de pousse / jour / ha entre le 30/04 et le 07/05 !			
	Trélans	12 mai	10,2 cm	1T342 kg MS
Observations 	Moyenne de 8 parcelles de pâturage. Mise à l'herbe réalisée le 8/04. Fauche pour l'ensilage après déprimage prévu dans 15/20 jours, toutes les parcelles de fauche possèdent + de 3 tonnes MS/ha.			
	Grandrieu	6 mai	7,3 cm	561 kg MS
Observations 	Moyenne de 14 parcelles (prairies naturelles et temporaires). Sortie des vaches au pâturage depuis le 17/04. Déprimage en cours sur les parcelles prévues en fauche pour récolter en foin Croissance moyenne de 37 kg MS/jour/ha depuis le 29/04			
	Le Buisson	9 mai	17,9 cm (F) 10,7 cm (P)	3T040 kg MS (F) 1T448 kg MS (P)
Observations 	Moyenne de 6 parcelles prévues pour la fauche (F). Moyenne de 7 parcelles de pâturage (P). 2 ^{ème} tour de pâturage en train de se terminer ! La fauche s'annonce très prometteuse avec + de 3 tonnes MS/ha sur toutes les parcelles !			
	Nasbinals	9 mai	11,1 cm	1T588 kg MS
Observations 	Moyenne de 6 prairies naturelles exclusivement pâturées. Mise à l'herbe effectuée début mai ! Pousse d'herbe très importante : + 102 kg MS de pousse / jour / ha entre le 30/04 et le 09/05 !			

Partenaires financiers de nos actions :



Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE

Crédit photo : ©Gabin SEZILLE, ©Lucile SACHOT, ©Marie-Amélie BROS, Chambre d'Agriculture de la Lozère



Votre interlocuteur :

Gabin SEZILLE,
Conseillé spécialisé agronomie et environnement

Retrouvez les Inf'eau prairies et les infos ferti
lozere.chambres-agriculture.fr
(S'informer – Bulletins d'information)



Inf'eau prairie Lozère

20 mai 2025



Cumul des températures

(Cumul à partir du 1^{er} février – base 0°C – 18°C) - Source : Météo France

Situation au 18 mai 2025				
	Station	Altitude	2025	Différence depuis le 11/05
Basse altitude (< 800 m) 	Le Collet de Dèze	485m	1121°C	+ 111°C
	Saint-Etienne Vallée Française	518m	1173°C	+ 117°C
	Florac	590m	985°C	+ 97°C
	Villefort	620m	1002°C	+ 101°C
	Mende (Ville)	710m	895°C	+ 90 °C
	Montrodat	763m	866°C	+ 88°C
	Saint-Germain du Teil	775m	919°C	+ 88°C
Demi-Montagne (800 m – 950 m) 	Rousses	812m	855°C	+ 87°C
	Le Pont-de-Montvert	875m	881°C	+ 92°C
	Le Massegros	890 m	837°C	+ 89°C
	Altier	900m	856°C	+ 92°C
	La Salle Prunet	903m	822°C	+ 87°C
	Saint-Pierre des Tripiers	929m	821°C	+ 84°C
	Mende (Chabrits)	935m	826°C	+ 87°C
	Rimeize	939m	822°C	+ 83°C
Plateaux d'altitude (950 m – 1 200 m) 	Gatuzières	965m	793°C	+ 85°C
	Sauveterre	1018m	741°C	+ 83°C
	Aumont-Aubrac	1018m	653°C	+ 66°C
	Bassurels	1042m	713°C	+ 81°C
	Les Salces	1075m	685°C	+ 78°C
	Le Buisson	1088m	590°C	+ 63°C
	Grandrieu	1163m	521°C	+ 58°C
	Fau de Peyre	1163m	634°C	+ 69°C
	Paulhac en Margeride	1175m	634°C	+ 69°C
	Bleymard (bourg)	1199m	642°C	+ 77°C
Montagne (> 1 200 m) 	Châteauneuf-de-Randon	1247m	537°C	+ 63°C
	La Panouse	1260m	540°C	+ 64°C
	Bleymard	1418m	480°C	+ 66°C

Dates clés pour l'optimisation de la gestion des prairies

Sommes de températures (base 1^{er} février)





Le conseil de la semaine :



Basse altitude



Demi-Montagne



Plateau d'altitude



Montagne

Aucun chantier de récolte en sec n'est possible avant vendredi !

Conclusion des chantiers d'ensilage/enrubannage !

Poursuite des chantiers de récolte en ensilage/enrubannage.

Vigilance sur les fenêtres météo !

Début des premiers chantiers de récolte en ensilage/enrubannage dès que les conditions météo seront favorables !

Fin du déprimage



Pour les zones de basse altitude,
Les conditions météo semblent peu favorables cette semaine pour les récoltes en sec !

Des précipitations sont annoncées jusqu'à vendredi ! Une fenêtre météo un peu plus favorable semble ensuite se dessiner pour le week-end et le début de semaine prochaine !

Les chantiers de récolte en ensilage/enrubannage doivent se conclure !

Pour les zones de demi-montagne,
Poursuite des chantiers de récolte en ensilage/enrubannage !

Les 800°C sont atteints, ce qui correspond à une récolte en ensilage-enrubannage avec un optimum entre quantité et qualité !

Vigilance pour les fenêtres météo !



Sur les plateaux d'altitude,
Début des chantiers de récolte !

Les 700°C sont atteints ou proches : ce qui correspond à une récolte en ensilage / enrubannage avec recherche de qualité !

Les conditions météo semblent plutôt favorables le week-end prochain !

En montagne,
Fin du déprimage !

Le seuil des 500°C qui marque la fin du déprimage est atteint! Les parcelles destinées à la fauche doivent être débrayées !

Pour les plus tardifs, il ne faut pas attendre pour sortir les animaux au risque de se faire déborder par la pousse d'herbe !



Quelques conseils pour réussir son chantier de récolte :

Pour l'ensilage d'herbe :

- Récolte au stade optimal (début épiaison dans l'idéal) pour allier qualité et quantité
- Ne pas faucher trop bas (environ 5 – 6 cm minimum) pour limiter les butyriques, et favoriser une repousse de la prairie
- S'assurer d'avoir une fenêtre climatique favorable pour que l'herbe puisse se ressuyer correctement et atteindre 25 – 30 % de MS
- S'assurer d'une bonne finesse de hachage
- Soigner la confection du tas d'ensilage par un tassage important



Pour l'enrubannage :

- Récolte au stade optimal (début épiaison dans l'idéal) pour allier qualité et quantité
- Ne pas faucher trop bas (environ 5 – 6 cm minimum) pour limiter les butyriques, et favoriser une repousse de la prairie
- S'assurer d'avoir une fenêtre climatique favorable de 2/3 jours pour pouvoir pré-faner et atteindre 50 % de MS
- Possibilité d'utiliser les couteaux sur certaines presses pour faciliter la préparation de la ration et la distribution
- Limiter au maximum la manutention des bottes pour conserver une bonne qualité de conservation



*Sur le secteur Trélans,
Stade début épiaison sur les
parcelles déprimées vers le 20
avril
Floraison des trèfles
Photo du 19/05*



Quelques repères pour l'optimisation du pâturage :



HAUTEUR OPTIMALE

POUR LA RENTRÉE DES ANIMAUX dans la parcelle

10 – 12 cm d'herbe



HAUTEUR IDÉALE

POUR LA SORTIE DES ANIMAUX de la parcelle

Si vous faites pâturer en dessous de cette hauteur d'herbe, elle mettra plus de temps à repartir

Environ 5 cm : au niveau du talon de la botte



RÉSERVER POUR LA FAUCHE !

À cette hauteur d'herbe, les animaux vont pâturer mais créer des refus qui devront être broyés

Au-delà de 15 cm



**L'épandage d'azote sur les prairies doit se faire de manière précoce et optimale !
Pour garder une bonne qualité de fourrage, et éviter de retrouver de l'azote soluble dans les fourrages :**



Délai de
45 jours
minimum





État des lieux de la pousse d'herbe en Lozère

	Secteur 	Date 	Hauteur d'herbe 	Quantité d'herbe disponible / ha
	Le Malzieu- Forain	15 mai	13,7 cm	2T158 kg MS
Observations 	Moyenne sur 15 parcelles mesurées (prairies naturelles et temporaires). Les parcelles prévues pour la fauche arrivent à 3 tonnes MS/ha après déprimage ! Pousse importante : + 94 kg MS de pousse / jour / ha entre le 07/05 et le 15/05 !			
	Trélans	19 mai	12,5 cm	1T892 kg MS
Observations 	Moyenne de 8 parcelles de pâturage. Mise à l'herbe réalisée le 8/04. Fauche pour l'ensilage après déprimage prévu dans 10 jours, toutes les parcelles de fauche possèdent + de 3 tonnes MS/ha.			
	Grandrieu	20 mai	9,7 cm	1T213 kg MS
Observations 	Moyenne de 14 parcelles (prairies naturelles et temporaires). Sortie des vaches au pâturage depuis le 17/04. Finalisation du tour de déprimage. Croissance moyenne de 74 kg MS/jour/ha depuis le 13/05.			
	Le Buisson	16 mai	11,4 cm	1T652 kg MS
Observations 	Moyenne de 6 parcelles de pâturage. 2 ^{ème} tour de pâturage en train de se terminer ! La fauche s'annonce très prometteuse avec + de 3 tonnes MS/ha sur toutes les parcelles !			
	Nasbinals	16 mai	12,7 cm	2T012 kg MS
Observations 	Moyenne de 6 prairies naturelles exclusivement pâturées. Mise à l'herbe effectuée début mai ! Premier tour de pâturage en cours ! Pousse d'herbe très importante : + 93 kg MS / jour / ha !			

Partenaires financiers de nos actions :



Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR



Crédit photo : ©Gabin SEZILLE, ©Lucile SACHOT, ©Marie-Amélie BROS, Chambre d'Agriculture de la Lozère



Votre interlocuteur :

Gabin SEZILLE,
Conseillé spécialisé agronomie et environnement

Retrouvez les Inf'eau prairies et les infos ferti
lozere.chambres-agriculture.fr
(S'informer – Bulletins d'information)



Inf'eau prairie Lozère

26 mai 2025



Cumul des températures


(Cumul à partir du 1^{er} février – base 0°C – 18°C) - Source : Météo France

Situation au 24 mai 2025

	Station	Altitude	2025	Différence depuis le 18/05
Basse altitude (< 800 m) 	Le Collet de Dèze	485m	1217°C	+ 96°C
	Saint-Etienne Vallée Française	518m	1271°C	+ 98°C
	Florac	590m	1071°C	+ 86°C
	Villefort	620m	1092°C	+ 90°C
	Mende (Ville)	710m	971°C	+ 76°C
	Montrodat	763m	938°C	+ 72°C
	Saint-Germain du Teil	775m	995°C	+ 76°C
Demi-Montagne (800 m – 950 m) 	Rousses	812m	932°C	+ 77°C
	Le Pont-de-Montvert	875m	958°C	+ 77°C
	Le Massegros	890 m	907°C	+ 70°C
	Altier	900m	932°C	+ 76°C
	La Salle Prunet	903m	895°C	+ 73°C
	Saint-Pierre des Tripiers	929m	891°C	+ 70°C
	Mende (Chabrits)	935m	895°C	+ 69°C
	Rimeize	939m	892°C	+ 70°C
Plateaux d'altitude (950 m – 1 200 m) 	Gatuzières	965m	860°C	+ 67°C
	Sauveterre	1018m	807°C	+ 66°C
	Aumont-Aubrac	1018m	712°C	+ 59°C
	Bassurels	1042m	779°C	+ 66°C
	Les Salces	1075m	748°C	+ 63°C
	Le Buisson	1088m	647°C	+ 57°C
	Grandrieu	1163m	575°C	+ 54°C
	Fau de Peyre	1163m	698°C	+ 64°C
	Paulhac en Margeride	1175m	694°C	+ 60°C
	Le Bleymard (bourg)	1199m	703°C	+ 61°C
Montagne (> 1 200 m) 	Châteauneuf-de-Randon	1247m	594°C	+ 57°C
	La Panouse	1260m	596°C	+ 56°C
	Le Bleymard	1418m	531°C	+ 51°C


Dates clés pour l'optimisation de la gestion des prairies

Sommes de températures (base 1^{er} février)



300°C

Mise à l'herbe



500°C

Fin du déprimage



700 – 800°C

Ensilage/Enrubannage



1 000 –
1 100°C

Foin précoce



1 200 –
1 300°C

Foin tardif



Le conseil de la semaine :



Basse altitude



Demi-Montagne



Plateau d'altitude



Montagne

Fauche possible pour récolte en sec !

Une fenêtre climatique est favorable cette semaine !

Conclusion des chantiers de récolte en ensilage/enrubannage.

Possibilité de commencer à récolter en foin précoce !

Profiter de la fenêtre météo de cette semaine pour réaliser les chantiers d'ensilage / enrubannage !

Fin du déprimage
Préparation pour les premiers chantiers de récolte



Pour les zones de basse altitude,
Profiter de la fenêtre météo favorable pour les récoltes en sec !

Aucune précipitation n'est annoncée d'ici samedi soir ! Il faut profiter de cette fenêtre météo pour faucher et récolter en foin !
Le pâturage se poursuit sur les autres parcelles !



Pour les zones de demi-montagne,
Conclusion des chantiers de récolte en ensilage/enrubannage, début des chantiers de récolte en foin !

Les chantiers de récolte par voie humide doivent se conclure ! On approche des 1000°C donc les premiers chantiers en sec peuvent s'effectuer ! La fenêtre météo est favorable !



Sur les plateaux d'altitude,
Chantiers de récolte en ensilage / enrubannage !

Les 700-800°C sont atteints ou proches : ce qui correspond à une récolte en ensilage / enrubannage avec un optimum qualité - quantité !

Les conditions météo sont très favorables, et les stades des prairies avancent rapidement !

En montagne,
Fin du déprimage, préparations pour les premiers chantiers de récolte !

Le seuil des 500°C qui marque la fin du déprimage est atteint ! Les parcelles destinées à la fauche doivent être débrayées !
Les préparations pour les premiers chantiers de récolte par voie humide peuvent débuter !



Quelques conseils pour réussir son chantier de récolte :

Pour l'ensilage d'herbe :

- Récolte au stade optimal (début épiaison dans l'idéal) pour allier qualité et quantité
- Ne pas faucher trop bas (environ 6-7 cm minimum) pour limiter les butyriques, et favoriser une repousse de la prairie
- S'assurer d'avoir une fenêtre climatique favorable pour que l'herbe puisse se ressuyer correctement et atteindre 25 – 30 % de MS
- S'assurer d'une bonne finesse de hachage
- Soigner la confection du tas d'ensilage par un tassage important



Pour l'enrubannage :

- Récolte au stade optimal (début épiaison dans l'idéal) pour allier qualité et quantité
- Ne pas faucher trop bas (environ 6-7 cm minimum) pour limiter les butyriques, et favoriser une repousse de la prairie
- S'assurer d'avoir une fenêtre climatique favorable de 2/3 jours pour pouvoir pré-faner et atteindre 50 % de MS
- Possibilité d'utiliser les couteaux sur certaines presses pour faciliter la préparation de la ration et la distribution
- Limiter au maximum la manutention des bottes pour conserver une bonne qualité de conservation




Pour le foin :

- Récolte au stade optimal (pleine épiaison/début floraison dans l'idéal) pour allier qualité et quantité !
- Ne pas faucher trop bas (environ 6-7 cm minimum) pour favoriser une repousse de la prairie, et de préférence l'après-midi ou en soirée pour favoriser un taux de sucre dans le fourrage
- Etre vigilant avec les feuilles des légumineuses notamment lors de l'andainage !
- S'assurer d'avoir une fenêtre climatique de 4/5 jours pour pouvoir faner correctement et atteindre 85% de MS.





Quelques repères pour l'optimisation du pâturage :



HAUTEUR OPTIMALE

POUR LA RENTRÉE DES ANIMAUX dans la parcelle

10 – 12 cm d'herbe



HAUTEUR IDÉALE

POUR LA SORTIE DES ANIMAUX de la parcelle

Si vous faites pâturer en dessous de cette hauteur d'herbe, elle mettra plus de temps à repartir

Environ 5 cm : au niveau du talon de la botte



RÉSERVER POUR LA FAUCHE !

À cette hauteur d'herbe, les animaux vont pâturer mais créer des refus qui devront être broyés

Au-delà de 15 cm



**L'épandage d'azote sur les prairies doit se faire de manière précoce et optimale !
Pour garder une bonne qualité de fourrage, et éviter de retrouver de l'azote soluble dans
les fourrages :**



Délai de
45 jours
minimum





État des lieux de la pousse d'herbe en Lozère

	Secteur 	Date 	Hauteur d'herbe 	Quantité d'herbe disponible / ha
	Le Malzieu- Forain	22 mai	11,7 cm	1T712 kg MS
Observations 	Moyenne sur 12 parcelles mesurées (prairies naturelles et temporaires). Les parcelles sont récoltées cette semaine : ensilage et enrubbage ! Pousse d'herbe qui ralentit : + 24 kg MS de pousse / jour / ha entre le 15/05 et le 22/05.			
	Trélans	26 mai	18,3 cm (F) 7,7 cm (P)	3T131 kg MS (F) 654 kg MS (P)
Observations 	Moyenne de 3 parcelles de pâturage et 2 parcelles de fauche. Mise à l'herbe réalisée le 8/04. Fauche pour l'ensilage après déprimage prévu vendredi, stade début épiaison. Second tour sur les pâtures en cours.			
	Grandrieu	27 mai	10 cm	1T267 kg MS
Observations 	Moyenne de 12 parcelles (prairies naturelles et temporaires). Sortie des vaches au pâturage depuis le 17/04. Premier tour de pâturage terminé, second tour en cours ! Croissance moyenne de 49 kg MS/jour/ha depuis le 20/05.			
	Le Buisson	23 mai	12 cm	1T830 kg MS
Observations 	Moyenne de 7 parcelles de pâturage. 3 ^{ème} tour de pâturage en cours ! La fauche s'annonce très prometteuse avec + de 3 tonnes MS/ha sur toutes les parcelles !			
	Nasbinals	23 mai	14 cm	2T281 kg MS
Observations 	Moyenne de 5 prairies naturelles exclusivement pâturées. Mise à l'herbe effectuée début mai ! Premier tour de pâturage en train de se conclure ! Pousse d'herbe importante : + 83 kg MS / jour / ha !			

Partenaires financiers de nos actions :



Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR



Crédit photo : ©Gabin SEZILLE, ©Lucile SACHOT, ©Marie-Amélie BROS, Chambre d'Agriculture de la Lozère



Votre interlocuteur :

Gabin SEZILLE,
Conseillé spécialisé agronomie et environnement

Retrouvez les Inf'eau prairies et les infos ferti
lozere.chambres-agriculture.fr
(S'informer – Bulletins d'information)



Inf'eau prairie Lozère

3 juin 2025




Cumul des températures

(Cumul à partir du 1^{er} février – base 0°C – 18°C) - Source : Météo France

Situation au 1 ^{er} juin 2025				
	Station	Altitude	2025	Différence depuis le 24/05
Basse altitude (< 800 m) 	Le Collet de Dèze	485m	1361°C	+ 144°C
	Saint-Etienne Vallée Française	518m	1415°C	+ 144°C
	Florac	590m	1211°C	+ 140°C
	Villefort	620m	1234°C	+ 142°C
	Mende (Ville)	710m	1101°C	+ 130°C
	Montrodat	763m	1067°C	+ 129°C
	Saint-Germain du Teil	775m	1124°C	+ 129°C
Demi-Montagne (800 m – 950 m) 	Rousses	812m	1067°C	+ 135°C
	Le Pont-de-Montvert	875m	1091°C	+ 133°C
	Le Massegros	890 m	1032°C	+ 125°C
	Altier	900m	1067°C	+ 135°C
	La Salle Prunet	903m	1027°C	+ 132°C
	Saint-Pierre des Tripiers	929m	1016°C	+ 125°C
	Mende (Chabrits)	935m	1024°C	+ 129°C
	Rimeize	939m	1013°C	+ 121°C
Plateaux d'altitude (950 m – 1 200 m) 	Gatuzières	965m	987°C	+ 127°C
	Sauveterre	1018m	931°C	+ 124°C
	Aumont-Aubrac	1018m	825°C	+ 113°C
	Bassurels	1042m	906°C	+ 127°C
	Les Salces	1075m	867°C	+ 119°C
	Le Buisson	1088m	755°C	+ 108°C
	Grandrieu	1163m	681°C	+ 106°C
	Fau de Peyre	1163m	815°C	+ 117°C
	Paulhac en Margeride	1175m	810°C	+ 116°C
	Le Bleymard (bourg)	1199m	827°C	+ 124°C
Montagne (> 1 200 m) 	Châteauneuf-de-Randon	1247m	707°C	+ 113°C
	La Panouse	1260m	710°C	+ 114°C
	Le Bleymard	1418m	644°C	+ 113°C


Dates clés pour l'optimisation de la gestion des prairies

Sommes de températures (base 1^{er} février)



300°C

Mise à l'herbe



500°C

Fin du déprimage



700 – 800°C

Ensilage/Enrubannage



1 000 –
1 100°C

Foin précoce



1 200 –
1 300°C

Foin tardif



Le conseil de la semaine :



Basse altitude



Demi-Montagne



Plateau d'altitude



Montagne

Dès qu'une fenêtre météo se présente, fauche pour clôturer les récoltes en foin !

Dès que le temps le permettra : fauche pour récolte en foin !

Poursuite des chantiers d'ensilage / enrubannage !

Vigilance sur les fenêtres météo !

Début des premiers chantiers de récolte en ensilage / enrubannage !

Vigilance sur les fenêtres météo !



Pour les zones de basse altitude,

La météo annoncée cette semaine n'est pas favorable pour les récoltes en foin !

Des orages sont annoncés quasiment tous les jours cette semaine et la semaine prochaine !

Dès qu'une fenêtre météo se présente, il faut conclure les chantiers de fenaïson !



Pour les zones de demi-montagne,

La météo annoncée cette semaine n'est pas favorable pour les récoltes en foin !

Les chantiers de récolte par voie humide doivent être conclus ! Les 1000°C sont atteints donc il est temps de récolter en sec dès qu'une fenêtre météo sera favorable !



Sur les plateaux d'altitude,

Poursuite des chantiers de récolte en ensilage / enrubannage dès que possible !

Les 800°C sont atteints : ce qui correspond à une récolte en ensilage / enrubannage avec un optimum qualité - quantité !

Une fenêtre climatique de 2 jours semble se dessiner pour des récoltes par voie humide en fin de week-end !

Les premières récoltes en foin précoce peuvent s'effectuer mais les conditions météo annoncées cette semaine ne sont pas favorables !

En montagne,

Premiers chantiers de récolte en ensilage / enrubannage dès que possible !

Le seuil des 700°C qui représente des récoltes en ensilage / enrubannage avec recherche de qualité peuvent s'effectuer dès que possible ! Une fenêtre climatique de 2 jours semble se dessiner en fin de week-end !



Quelques conseils pour réussir son chantier de récolte :

Pour l'ensilage d'herbe :

- Récolte au stade optimal (début épiaison dans l'idéal) pour allier qualité et quantité
- Ne pas faucher trop bas (environ 6-7 cm minimum) pour limiter les butyriques, et favoriser une repousse de la prairie
- S'assurer d'avoir une fenêtre climatique favorable pour que l'herbe puisse se ressuyer correctement et atteindre 25 – 30 % de MS
- S'assurer d'une bonne finesse de hachage
- Soigner la confection du tas d'ensilage par un tassage important



Pour l'enrubannage :

- Récolte au stade optimal (début épiaison dans l'idéal) pour allier qualité et quantité
- Ne pas faucher trop bas (environ 6-7 cm minimum) pour limiter les butyriques, et favoriser une repousse de la prairie
- S'assurer d'avoir une fenêtre climatique favorable de 2/3 jours pour pouvoir pré-faner et atteindre 50 % de MS
- Possibilité d'utiliser les couteaux sur certaines presses pour faciliter la préparation de la ration et la distribution
- Limiter au maximum la manutention des bottes pour conserver une bonne qualité de conservation



Pour le foin :

- Récolte au stade optimal (pleine épiaison/début floraison dans l'idéal) pour allier qualité et quantité !
- Ne pas faucher trop bas (environ 6-7 cm minimum) pour favoriser une repousse de la prairie, et de préférence l'après-midi ou en soirée pour favoriser un taux de sucre dans le fourrage
- Etre vigilant avec les feuilles des légumineuses notamment lors de l'andainage !
- S'assurer d'avoir une fenêtre climatique de 4/5 jours pour pouvoir faner correctement et atteindre 85% de MS.





Quelques repères pour l'optimisation du pâturage :



HAUTEUR OPTIMALE

POUR LA RENTRÉE DES ANIMAUX dans la parcelle

10 – 12 cm d'herbe



HAUTEUR IDÉALE

POUR LA SORTIE DES ANIMAUX de la parcelle

Si vous faites pâturer en dessous de cette hauteur d'herbe, elle mettra plus de temps à repartir

Environ 5 cm : au niveau du talon de la botte



RÉSERVER POUR LA FAUCHE !

À cette hauteur d'herbe, les animaux vont pâturer mais créer des refus qui devront être broyés

Au-delà de 15 cm



**L'épandage d'azote sur les prairies doit se faire de manière précoce et optimale !
Pour garder une bonne qualité de fourrage, et éviter de retrouver de l'azote soluble dans
les fourrages :**



Délai de
45 jours
minimum





État des lieux de la pousse d'herbe en Lozère

	Secteur 	Date 	Hauteur d'herbe 	Quantité d'herbe disponible / ha
	Le Malzieu- Forain	28 mai	11,6 cm	1T677 kg MS
Observations 	Moyenne sur 12 parcelles mesurées (prairies naturelles et temporaires). Ensilage et enrubannage réalisés la semaine dernière ! La pousse d'herbe est importante : + 73 kg MS de pousse / jour / ha entre le 22 et le 28/05.			
	Trélans	3 juin	7,1 cm (F) 7,4 cm (P)	480 kg MS (F) 561 kg MS (P)
Observations 	Moyenne de 4 parcelles de pâturage et 5 parcelles de fauche. Mise à l'herbe réalisée le 8/04. Ensilage réalisé après déprimage : 6 tonnes MS récoltées / ha avec un très bon stade ! Hauteur minimale de fauche de 7cm respectée ! Conclusion du 2^{ème} tour de pâturage et début du 3^{ème} en fin de semaine !			
	Grandrieu	27 mai	10 cm	1T267 kg MS
Observations 	Moyenne de 12 parcelles (prairies naturelles et temporaires). Sortie des vaches au pâturage depuis le 17/04. Premier tour de pâturage terminé, second tour en cours ! Croissance moyenne de 49 kg MS/jour/ha depuis le 20/05.			
	Le Buisson	2 juin	11,4 cm	1T654 kg MS
Observations 	Moyenne de 6 parcelles de pâturage. 3^{ème} tour de pâturage en cours ! Premières récoltes en foin effectuées la semaine dernière : 5 tonnes MS / ha de moyenne !			
	Nasbinals	2 juin	14,1 cm	2T303 kg MS
Observations 	Moyenne de 6 prairies naturelles exclusivement pâturées. Mise à l'herbe effectuée début mai ! Premier tour de pâturage en train de se conclure ! Pousse d'herbe importante : + 74 kg MS / jour / ha !			

Partenaires financiers de nos actions :



Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR



Crédit photo : ©Gabin SEZILLE, ©Lucile SACHOT, ©Marie-Amélie BROS, Chambre d'Agriculture de la Lozère



Votre interlocuteur :

Gabin SEZILLE,
Conseiller spécialisé agronomie et environnement

Retrouvez les Inf'eau prairies et les infos ferti
lozere.chambres-agriculture.fr
(S'informer – Bulletins d'information)



Inf'eau prairie Lozère

10 juin 2025




Cumul des températures

(Cumul à partir du 1^{er} février – base 0°C – 18°C) - Source : Météo France

Situation au 8 juin 2025				
	Station	Altitude	2025	Différence depuis le 01/06
Basse altitude (< 800 m) 	Le Collet de Dèze	485m	1486°C	+ 125°C
	Saint-Etienne Vallée Française	518m	1540°C	+ 125°C
	Florac	590m	1334°C	+ 123°C
	Villefort	620m	1357°C	+ 123°C
	Mende (Ville)	710m	1223°C	+ 122°C
	Montrodat	763m	1184°C	+ 117°C
	Saint-Germain du Teil	775m	1239°C	+ 115°C
Demi-Montagne (800 m – 950 m) 	Rousses	812m	1181°C	+ 114°C
	Le Pont-de-Montvert	875m	1207°C	+ 116°C
	Le Massegros	890 m	1143°C	+ 111°C
	Altier	900m	1182°C	+ 115°C
	La Salle Prunet	903m	1140°C	+ 113°C
	Saint-Pierre des Tripiers	929m	1125°C	+ 109°C
	Mende (Chabrits)	935m	1138°C	+ 114°C
	Rimeize	939m	1127°C	+ 114°C
Plateaux d'altitude (950 m – 1 200 m) 	Gatuzières	965m	1098°C	+ 111°C
	Sauveterre	1018m	1039°C	+ 108°C
	Aumont-Aubrac	1018m	928°C	+ 103°C
	Bassurels	1042m	1014°C	+ 108°C
	Les Salces	1075m	966°C	+ 99°C
	Le Buisson	1088m	853°C	+ 98°C
	Grandrieu	1163m	779°C	+ 98°C
	Fau de Peyre	1163m	912°C	+ 97°C
	Paulhac en Margeride	1175m	908°C	+ 98°C
	Le Bleymard (bourg)	1199m	930°C	+ 103°C
Montagne (> 1 200 m) 	Châteauneuf-de-Randon	1247m	803°C	+ 96°C
	La Panouse	1260m	802°C	+ 92°C
	Le Bleymard	1418m	736°C	+ 92°C

Dates clés pour l'optimisation de la gestion des prairies

Sommes de températures (base 1^{er} février)



300°C

Mise à l'herbe



500°C

Fin du déprimage



700 – 800°C

Ensilage/Enrubannage



1 000 –
1 100°C

Foin précoce



1 200 –
1 300°C

Foin tardif



Le conseil de la semaine :



Basse altitude



Demi-Montagne



Plateau d'altitude



Montagne

Chantiers de récolte en foin !

Fauche des secondes coupes pour les parcelles récoltées tôt !

Chantiers de récolte en foin !

Finalisation des chantiers d'ensilage / enrubannage !

Début des récoltes en sec !

Profiter de la fenêtre météo pour réaliser les chantiers de récolte en ensilage / enrubannage !



Les chantiers de récolte en foin doivent se conclure !

La fenêtre météo de cette semaine est très favorable ! Les chantiers de fenaion doivent se conclure !

Pour les parcelles ayant pu être récoltées tôt dans la saison, les secondes coupes peuvent débuter !

Pour les zones de demi-montagne, Poursuite des chantiers de fenaion !

La fenêtre météo cette semaine est très favorable aux chantiers de fenaion !

Il ne faut pas attendre pour réaliser les chantiers avant de vraiment perdre en qualité !



Sur les plateaux d'altitude, Conclusion des chantiers de récolte en ensilage / enrubannage et début des chantiers en sec !

La fenêtre météo de cette semaine est très favorable pour les chantiers de récolte !

Il faut conclure les chantiers de récolte par voie humide, et les premiers chantiers de foin précoce peuvent s'effectuer !



En montagne, Réalisation des chantiers de récolte en ensilage / enrubannage !

Le seuil des 800°C qui représente des récoltes en ensilage / enrubannage avec l'optimum quantité – qualité est atteint ! Les chantiers d'ensilage / enrubannage peuvent s'effectuer !

Les premiers chantiers de récolte en foin peuvent s'effectuer également, la fenêtre météo est très favorable !



Quelques conseils pour réussir son chantier de récolte :

Pour l'ensilage d'herbe :

- Récolte au stade optimal (début épiaison dans l'idéal) pour allier qualité et quantité
- Ne pas faucher trop bas (environ 6-7 cm minimum) pour limiter les butyriques, et favoriser une repousse de la prairie
- S'assurer d'avoir une fenêtre climatique favorable pour que l'herbe puisse se ressuyer correctement et atteindre 25 – 30 % de MS
- S'assurer d'une bonne finesse de hachage
- Soigner la confection du tas d'ensilage par un tassage important



Pour l'enrubannage :

- Récolte au stade optimal (début épiaison dans l'idéal) pour allier qualité et quantité
- Ne pas faucher trop bas (environ 6-7 cm minimum) pour limiter les butyriques, et favoriser une repousse de la prairie
- S'assurer d'avoir une fenêtre climatique favorable de 2/3 jours pour pouvoir pré-faner et atteindre 50 % de MS
- Possibilité d'utiliser les couteaux sur certaines presses pour faciliter la préparation de la ration et la distribution
- Limiter au maximum la manutention des bottes pour conserver une bonne qualité de conservation




Pour le foin :

- Récolte au stade optimal (pleine épiaison/début floraison dans l'idéal) pour allier qualité et quantité !
- Ne pas faucher trop bas (environ 6-7 cm minimum) pour favoriser une repousse de la prairie, et de préférence l'après-midi ou en soirée pour favoriser un taux de sucre dans le fourrage
- Etre vigilant avec les feuilles des légumineuses notamment lors de l'andainage !
- S'assurer d'avoir une fenêtre climatique de 4/5 jours pour pouvoir faner correctement et atteindre 85% de MS.





Quelques repères pour l'optimisation du pâturage :



HAUTEUR OPTIMALE

POUR LA RENTRÉE DES ANIMAUX dans la parcelle

10 – 12 cm d'herbe



HAUTEUR IDÉALE

POUR LA SORTIE DES ANIMAUX de la parcelle

Si vous faites pâturer en dessous de cette hauteur d'herbe, elle mettra plus de temps à repartir

Environ 5 cm : au niveau du talon de la botte



RÉSERVER POUR LA FAUCHE !

À cette hauteur d'herbe, les animaux vont pâturer mais créer des refus qui devront être broyés

Au-delà de 15 cm



L'épandage d'azote sur les prairies doit se faire de manière précoce et optimale !
Pour garder une bonne qualité de fourrage, et éviter de retrouver de l'azote soluble dans les fourrages :



Délai de
45 jours
minimum





État des lieux de la pousse d'herbe en Lozère

	Secteur 	Date 	Hauteur d'herbe 	Quantité d'herbe disponible / ha
	Le Malzieu- Forain	5 juin	11,1 cm	1T559 kg MS
Observations 	Moyenne sur 10 parcelles mesurées (prairies naturelles et temporaires). Fenaïson en cours cette semaine ! La pousse d'herbe est correcte + 61 kg MS de pousse / jour / ha entre le 28/05 et le 05/06.			
	Trélans	10 juin	8 cm (F) 7,5 cm (P)	727 kg MS (F) 601 kg MS (P)
Observations 	Moyenne de 5 parcelles de fauche après ensilage, repousse de 8cm de moyenne ! Moyenne de 4 parcelles de pâturage ! Fenaïson cette semaine après déprimage ! Très bon stade et volume intéressant ! 3^{ème} tour de pâturage en cours !			
	Grandrieu	4 juin	11,6 cm	1T664 kg MS
Observations 	Moyenne de 12 parcelles (prairies naturelles et temporaires). Sortie des vaches au pâturage depuis le 17/04. Fenaïson en cours cette semaine ! Croissance importante de 92 kg MS/jour/ha entre le 27/05 et le 04/06 !			
	Le Buisson	11 juin	13 cm	2T066 kg MS
Observations 	Début du 4^{ème} tour de pâturage! Récolte de foin cette semaine sur plusieurs parcelles ! 2 tonnes MS / ha sur les regains des parcelles fauchées début mai !			
	Nasbinals	2 juin	14,1 cm	2T303 kg MS
Observations 	Moyenne de 6 prairies naturelles exclusivement pâturées. Mise à l'herbe effectuée début mai ! Premier tour de pâturage en train de se conclure ! Pousse d'herbe importante : + 74 kg MS / jour / ha !			

Partenaires financiers de nos actions :



Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR



Crédit photo : ©Gabin SEZILLE, ©Lucile SACHOT, ©Marie-Amélie BROS, Chambre d'Agriculture de la Lozère



C'est quoi le bulletin Inf'Eau ?

Pour ce premier numéro de l'Inf'Eau pour la campagne d'irrigation 2025 nous vous rappelons son objectif : **vous transmettre des informations liées à l'irrigation et la gestion de la ressource en eau afin d'utiliser l'eau de manière efficace.**

Le bulletin est constitué de trois parties :

- Etat de la ressource en eau et actualités réglementaires
- Tendance météo et conseils irrigation basés sur le réseau de parcelles de référence
- Suivi d'expérimentations et article lié à l'irrigation et à l'eau

Campagne d'irrigation 2025

Les assemblées des irrigants se sont tenues le 27 mars 2025. Les tours d'eau ont été présentés et validés durant les AG et ont été envoyés à la DDT48. Les irrigants intégrés dans la gestion collective devraient recevoir à la mi-juin juin les tableaux validés par les services de l'état ainsi que leur registre de prélèvement.

Etat de la ressource en eau et actualités réglementaires

Bilan pluviométrique et hydrologique

Le **début du printemps a été pluvieux** avec un excédent de pluie par rapport à la moyenne historique sur la quasi-totalité du département (par exemple + 17mm à Montrodat en avril) mais a au contraire été **fortement déficitaire le mois dernier, en mai** (de - 18,5 mm à Montrodat à -78,6 mm au Collet de Dèze, équivalent à une réduction respective de -23% et de - 60% par rapport à la moyenne historique).




Figure 1. Graphique comparant les précipitations et les températures moyennes de 2025 avec celles de la norme historique (1991-2020) à Montrodat (CDA 48).

Les débits des rivières sont pour l'instant satisfaisants comme l'indique la carte ci-dessous de l'Observatoire national des étiages et aucun arrêté préfectoral régulant les prélèvements d'eau n'a été publié.




Figure 2. Carte de l'état des rivières Lozériennes en termes de débit au 27 mai 2025 (ONDE).



Tendance météo et conseils irrigation

Une semaine de chaleur est annoncée en Lozère avec des températures allant jusqu'à 31°C. L'évapotranspiration (ETP) des plantes augmentent donc avec une moyenne entre 4,7 mm et 5,8 mm par jour.

Cependant, les pluies de début juin (environ 10 mm le 02/06 et 20 mm le 04/06 sur le secteur de Montrodat/Grèze) ont bien humidifié les sols. Les sondes tensiométriques nous indiquent sur une parcelle limono-argileuse peu profonde de Montrodat que le sol est actuellement en situation de confort hydrique (figure 3). De plus, de nouvelles précipitations devraient arriver en fin de semaine sur le nord du département (environ 6 mm entre samedi et dimanche) mais devraient être moins importantes dans le sud.




Figure 3. Graphique de l'état hydrique du sol d'une parcelle limono-argileuse peu profonde de Montrodar (CDA48).

Concernant la luzerne, les pluies de début juin ont en effet permis d'éviter d'irriguer après la première coupe. Comme le rappelle le graphique ci-dessous les recommandations pour l'irrigation de la luzerne sont de 2 apports de 50 mm sur sol profond et de 3 apports de 40 mm sur sol superficiel.

Calendrier d'irrigation de la Luzerne




Figure 4. Graphique des besoins hydriques de la luzerne en sol superficiel et profond (OGAYA).

Résultat de l'étude Lot 2050

Le syndicat mixte du bassin du Lot a lancé depuis 2024 une étude pour comprendre plus précisément les impacts du changement climatique sur la ressource en eau du bassin versant du Lot avec pour objectifs d'anticiper les répercussions sur les territoires.

Une fiche concernant le bassin versant du Lot Amont et de la Colagne a été réalisée pour présenter les diagnostics hydro-climatique et celui des vulnérabilités : [Lot 2050 Fiche Synthèse Lot Amont et Colagne](#). Cette fiche valorise également les enseignements des ateliers de concertation réalisés entre juin et septembre 2024, comme celui de Chanac, auprès d'une centaine d'acteurs du bassin du Lot.

Entre autres, l'étude met en avant l'augmentation de la fréquence des années sèches. Le graphique ci-dessous met en évidence qu'un étiage comme celui de 2022 pourrait revenir tous les 6 ans d'ici 2085 avec un scénario de stabilisation des émissions de gaz à effet de serre (scénario 4.5). Cependant si les émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter (scénario 8.5), un tel étiage pourrait frapper tous les 2 ans d'ici 2085.




Figure 5. Graphique estimant le retour d'un étiage comme celui de 2022 selon les scénarios de changement climatique 8.5 et 4.5 (Syndicat mixte du bassin du Lot).

Financé par :



Inf'eau prairie Lozère

17 juin 2025




Cumul des températures

(Cumul à partir du 1^{er} février – base 0°C – 18°C) - Source : Météo France

Situation au 15 juin 2025				
	Station	Altitude	2025	Différence depuis le 8/06
Basse altitude (< 800 m) 	Le Collet de Dèze	485m	1612°C	+ 126°C
	Saint-Etienne Vallée Française	518m	1666°C	+ 126°C
	Florac	590m	1460°C	+ 126°C
	Villefort	620m	1483°C	+ 126°C
	Mende (Ville)	710m	1347°C	+ 124°C
	Montrodat	763m	1308°C	+ 124°C
	Saint-Germain du Teil	775m	1364°C	+ 125°C
Demi-Montagne (800 m – 950 m) 	Rousses	812m	1307°C	+ 126°C
	Le Pont-de-Montvert	875m	1331°C	+ 124°C
	Le Massegros	890 m	1268°C	+ 125°C
	Altier	900m	1306°C	+ 124°C
	La Salle Prunet	903m	1266°C	+ 126°C
	Saint-Pierre des Tripiers	929m	1250°C	+ 125°C
	Mende (Chabrits)	935m	1262°C	+ 124°C
	Rimeize	939m	1247°C	+ 120°C
Plateaux d'altitude (950 m – 1 200 m) 	Gatuzières	965m	1221°C	+ 123°C
	Sauveterre	1018m	1163°C	+ 124°C
	Aumont-Aubrac	1018m	1045°C	+ 117°C
	Bassurels	1042m	1139°C	+ 125°C
	Les Salces	1075m	1088°C	+ 122°C
	Le Buisson	1088m	971°C	+ 118°C
	Grandrieu	1163m	888°C	+ 109°C
	Fau de Peyre	1163m	1033°C	+ 121°C
	Paulhac en Margeride	1175m	1026°C	+ 118°C
	Le Bleymard (bourg)	1199m	1052°C	+ 122°C
Montagne (> 1 200 m) 	Châteauneuf-de-Randon	1247m	920°C	+ 117°C
	La Panouse	1260m	919°C	+ 117°C
	Le Bleymard	1418m	856°C	+ 120°C

Dates clés pour l'optimisation de la gestion des prairies

Sommes de températures (base 1^{er} février)



300°C

Mise à l'herbe



500°C

Fin du déprimage



700 – 800°C

Ensilage/Enrubannage



1 000 –
1 100°C

Foin précoce



1 200 –
1 300°C

Foin tardif



Le conseil de la semaine :



Basse altitude



Demi-Montagne



Plateau d'altitude



Montagne

Conclusion des chantiers de récolte en foin !

Fauche des secondes coupes pour les parcelles récoltées tôt !

Conclusion des chantiers de récolte en foin !

Fauche des secondes coupes pour les parcelles récoltées tôt !

Chantiers de récolte en foin !

Finalisation des chantiers d'ensilage / enrubannage !

Début des récoltes en sec !



Pour les zones de basse altitude, Les chantiers de récolte en foin doivent se conclure !

La fenêtre météo de cette semaine est très favorable ! Les chantiers de fenaion doivent se conclure !

Pour les parcelles ayant pu être récoltées tôt dans la saison, les secondes coupes peuvent débuter !



Pour les zones de demi-montagne, Poursuite des chantiers de fenaion !


La fenêtre météo de cette semaine est très favorable ! Les chantiers de fenaion doivent se conclure !

Pour les parcelles ayant pu être récoltées tôt dans la saison, les secondes coupes peuvent débuter !

Sur les plateaux d'altitude, Chantiers de récolte en sec !

La fenêtre météo de cette semaine est très favorable pour les chantiers de récolte !

C'est le moment de faucher pour récolter en foin !



En montagne, Conclusion des chantiers de récolte en ensilage / enrubannage et début des chantiers en sec !

La fenêtre météo de cette semaine est très favorable pour les chantiers de récolte !

Il faut conclure les chantiers de récolte par voie humide, et les premiers chantiers de foin précoce peuvent s'effectuer !



Quelques conseils pour réussir son chantier de récolte :

Pour l'ensilage d'herbe :

- Récolte au stade optimal (début épiaison dans l'idéal) pour allier qualité et quantité
- Ne pas faucher trop bas (environ 6-7 cm minimum) pour limiter les butyriques, et favoriser une repousse de la prairie
- S'assurer d'avoir une fenêtre climatique favorable pour que l'herbe puisse se ressuyer correctement et atteindre 25 – 30 % de MS
- S'assurer d'une bonne finesse de hachage
- Soigner la confection du tas d'ensilage par un tassage important



Pour l'enrubannage :

- Récolte au stade optimal (début épiaison dans l'idéal) pour allier qualité et quantité
- Ne pas faucher trop bas (environ 6-7 cm minimum) pour limiter les butyriques, et favoriser une repousse de la prairie
- S'assurer d'avoir une fenêtre climatique favorable de 2/3 jours pour pouvoir pré-faner et atteindre 50 % de MS
- Possibilité d'utiliser les couteaux sur certaines presses pour faciliter la préparation de la ration et la distribution
- Limiter au maximum la manutention des bottes pour conserver une bonne qualité de conservation




Pour le foin :

- Récolte au stade optimal (pleine épiaison/début floraison dans l'idéal) pour allier qualité et quantité !
- Ne pas faucher trop bas (environ 6-7 cm minimum) pour favoriser une repousse de la prairie, et de préférence l'après-midi ou en soirée pour favoriser un taux de sucre dans le fourrage
- Etre vigilant avec les feuilles des légumineuses notamment lors de l'andainage !
- S'assurer d'avoir une fenêtre climatique de 4/5 jours pour pouvoir faner correctement et atteindre 85% de MS.





Quelques repères pour l'optimisation du pâturage :



HAUTEUR OPTIMALE

POUR LA RENTRÉE DES ANIMAUX dans la parcelle

10 – 12 cm d'herbe



HAUTEUR IDÉALE

POUR LA SORTIE DES ANIMAUX de la parcelle

Si vous faites pâturer en dessous de cette hauteur d'herbe, elle mettra plus de temps à repartir

Environ 5 cm : au niveau du talon de la botte



RÉSERVER POUR LA FAUCHE !

À cette hauteur d'herbe, les animaux vont pâturer mais créer des refus qui devront être broyés

Au-delà de 15 cm



L'épandage d'azote sur les prairies doit se faire de manière précoce et optimale !
Pour garder une bonne qualité de fourrage, et éviter de retrouver de l'azote soluble dans les fourrages :



Délai de
45 jours
minimum





État des lieux de la pousse d'herbe en Lozère

	Secteur 	Date 	Hauteur d'herbe 	Quantité d'herbe disponible / ha
	Le Malzieu- Forain	12 juin	9,9 cm	1T238 kg MS
Observations 	Moyenne sur 14 parcelles mesurées (prairies naturelles et temporaires). Chantiers d'ensilage et enrubbage réalisés les semaines précédentes, chantiers de foin cette semaine ! La pousse d'herbe ralentit fortement : +9 kg MS de pousse / jour / ha entre le 5 et le 12/06.			
	Trélans	16 juin	8,2 cm (F) 7,7 cm (P)	807 kg MS (F) 653 kg MS (P)
Observations 	Toutes les premières coupes ont été conclues ! Bonne reprise après ensilage : + 78 kg MS de pousse / jour / ha entre le 10 et le 16/06 (moyenne sur 4 parcelles). Conclusion du 3^{ème} tour de pâturage en cours !			
	Grandrieu	13 juin	9,4 cm	1T118 kg MS
Observations 	Moyenne de 14 parcelles (prairies naturelles et temporaires). Sortie des vaches au pâturage depuis le 17/04. Conclusion des premières coupes ! Croissance qui ralentit : +21 kg MS/jour/ha entre le 04/06 et le 13/06 !			
	Le Buisson	11 juin	13 cm	2T066 kg MS
Observations 	Début du 4^{ème} tour de pâturage! Récolte de foin cette semaine sur plusieurs parcelles ! 2 tonnes MS / ha sur les regains des parcelles fauchées début mai !			
	Nasbinals	12 juin	13,7 cm	2T184 kg MS
Observations 	Moyenne de 6 prairies naturelles exclusivement pâturées. Second tour de pâturage en cours ! Pousse d'herbe encore importante : + 76 kg MS / jour / ha entre le 2 et le 12/06 !			

Partenaires financiers de nos actions :



Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR



Crédit photo : ©Gabin SEZILLE, ©Lucile SACHOT, ©Marie-Amélie BROS, Chambre d'Agriculture de la Lozère



Sommaire :

1. Campagne d'irrigation 2025
2. Etat de la ressource en eau et actualités réglementaires

3. Tendance météo et conseils irrigation
4. Aide aux investissements de protection contre la sécheresse

Campagne d'irrigation 2025

Les tours d'eau ont été acceptés par la DDT48. Ils entrent en vigueur à partir du 2 juin 2025. Les irrigants intégrés dans la gestion collective doivent recevoir les tableaux validés par les services de l'état ainsi que leur registre de prélèvement dans les prochains jours.

Etat de la ressource en eau et actualités réglementaires

La semaine précédente (10/06-17-06) a été sèche et les orages de ce weekend n'ont pas été très importants. Les Cévennes et les Causses ont reçu en moyenne moins de 1 mm de pluie sur le weekend (Figure 1). La vallée du Lot et la majorité du nord du département ont quant à eux bénéficié d'entre 1 et 5 mm de pluie. Du côté de la Margeride, les précipitations ont été ponctuellement beaucoup plus conséquentes avec des pluies atteignant les 20 mm sur Cheylard-l'Évêque.




Figure 1. Pluviométrie (mm) du 15/06/2025 en Lozère.

Les débits des rivières sont pour l'instant toujours satisfaisants et aucun arrêté préfectoral régulant les prélèvements d'eau n'a été publié.

Tendance météo et conseils irrigation

La chaleur continue en Lozère pour la semaine du 17/06 au 23/06 avec des températures allant jusqu'à 30°C sur tout le département. L'évapotranspiration (ETP) des plantes augmentent donc avec une moyenne entre 5 mm et 6,5 mm par jour.

Aucune précipitation n'est prévue avant la semaine suivante (25/06) et les sols superficiels s'assèchent rapidement. Selon nos tensiomètres¹, **les parcelles ayant reçu peu de pluie ce weekend (1-2 mm) ont atteint le seuil de vigilance** en termes de tension de l'eau dans le sol et nécessiteront sûrement de l'irrigation cette semaine selon le type de culture (figure 2).

Le lancement de **l'irrigation sur les parcelles ayant reçu plus de pluie ce weekend (plus de 5 mm) est moins urgent**. Après une pluie de 4,4 mm ce weekend, les sondes tensiométriques nous indiquent sur une parcelle limono-argileuse peu profonde de Montrodat que le sol est actuellement en situation de confort hydrique à 15 cm de profondeur mais que le seuil de vigilance a été dépassé à 30 cm de profondeur. Sur une parcelle de ce type l'irrigation peut encore attendre quelques jours mais sera sûrement nécessaire d'ici la fin de la semaine.

Quant aux **parcelles à sol plus profond**, particulièrement celles de la vallée du Lot, elles sont encore fraîches et **ne nécessiteront normalement pas d'irrigation cette semaine**.




Figure 2. Graphique de l'état hydrique du sol d'une parcelle limono-argileuse peu profonde de Grèzes ayant reçu seulement 1 mm ce weekend (CDA48).

¹ Les sondes tensiométriques permettent de mesurer la tension en eau des sols qui correspond à la force de succion qui doit être fournie par les racines des plantes pour extraire l'eau du sol. Plus le sol contient d'eau, plus la tension est faible puisque la plante accède plus facilement à l'eau autour de ses racines. A l'inverse, lorsque l'accès à l'eau est réduit, la tension augmente car les racines doivent fournir plus d'effort pour extraire l'eau du sol. Ces outils permettent donc d'irriguer exactement selon les besoins de la plante sans gaspiller l'eau.

Zoom sur l'irrigation du maïs

Le maïs est sensible au stress hydrique particulièrement durant les périodes de montaison, de floraison et de formation des grains. En Lozère, le maïs ayant généralement été semé entre mi-mai et début juin, la plante est actuellement à 5-6 feuilles pour les semis plus tardif et 7-8 feuilles pour les semis plus précoce. Les besoins en eau sont donc faibles pour le moment mais deviendront plus importants à partir de 10-12 feuilles.




Figure 3. Graphique des besoins hydriques du maïs aux différents stades de croissance (Arvalis).

Aide aux investissements de protection contre la sécheresse

Ce dispositif d'aide vise à financer des investissements permettant d'améliorer la résilience individuelle des exploitations agricoles face à la problématique de la gestion de la ressource en eau et aux épisodes de sécheresse dont la fréquence augmente.

Pour que la demande soit éligible, elle doit obligatoirement comprendre au moins un matériel d'irrigation et au moins un outil d'aide à la décision. La période de dépôt des demandes d'aide est ouverte. Elle se clôturera à la consommation de l'enveloppe ou au plus tard le 31 décembre 2025. Vous pourrez trouver plus d'information à l'adresse ci-dessous ou en contactant la Chambre d'Agriculture.

LIEN : <https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Dispositifs-par-filiere/Aides-nationales/Aide-aux-investissements-en-exploitations-pour-la-protection-contre-la-secheresse>

Financé par :



Inf'eau prairie Lozère

24 juin 2025




Cumul des températures

(Cumul à partir du 1^{er} février – base 0°C – 18°C) - Source : Météo France

Situation au 22 juin 2025				
	Station	Altitude	2025	Différence depuis le 15/06
Basse altitude (< 800 m) 	Le Collet de Dèze	485m	1738°C	+ 126°C
	Saint-Etienne Vallée Française	518m	1792°C	+ 126°C
	Florac	590m	1586°C	+ 126°C
	Villefort	620m	1609°C	+ 126°C
	Mende (Ville)	710m	1473°C	+ 126°C
	Montrodat	763m	1434°C	+ 126°C
	Saint-Germain du Teil	775m	1489°C	+ 125°C
Demi-Montagne (800 m – 950 m) 	Rousses	812m	1433°C	+ 126°C
	Le Pont-de-Montvert	875m	1457°C	+ 126°C
	Le Massegros	890 m	1393°C	+ 125°C
	Altier	900m	1431°C	+ 125°C
	La Salle Prunet	903m	1390°C	+ 124°C
	Saint-Pierre des Tripiers	929m	1375°C	+ 125°C
	Mende (Chabrits)	935m	1387°C	+ 125°C
	Rimeize	939m	1366°C	+ 119°C
Plateaux d'altitude (950 m – 1 200 m) 	Gatuzières	965m	1347°C	+ 126°C
	Sauveterre	1018m	1286°C	+ 123°C
	Aumont-Aubrac	1018m	1165°C	+ 120°C
	Bassurels	1042m	1263°C	+ 124°C
	Les Salces	1075m	1211°C	+ 123°C
	Le Buisson	1088m	1091°C	+ 120°C
	Grandrieu	1163m	1001°C	+ 121°C
	Fau de Peyre	1163m	1153°C	+ 120°C
	Paulhac en Margeride	1175m	1144°C	+ 118°C
	Le Bleymard (bourg)	1199m	1174°C	+ 122°C
Montagne (> 1 200 m) 	Châteauneuf-de-Randon	1247m	1037°C	+ 117°C
	La Panouse	1260m	1036°C	+ 117°C
	Le Bleymard	1418m	973°C	+ 117°C

Dates clés pour l'optimisation de la gestion des prairies

Sommes de températures (base 1^{er} février)



300°C

Mise à l'herbe



500°C

Fin du déprimage



700 – 800°C

Ensilage/Enrubannage



1 000 –
1 100°C

Foin précoce



1 200 –
1 300°C

Foin tardif



Le conseil de la semaine :



Basse altitude



Demi-Montagne



Plateau d'altitude



Montagne

Valorisation des secondes coupes (fauche ou pâturage) !

Valorisation des secondes coupes (fauche ou pâturage) !

Finalisation des chantiers de fenaion !

Valorisation des secondes coupes (fauche ou pâturage) !

Poursuite des chantiers de fenaion !



Pour les zones de basse altitude, Valorisation des secondes coupes (fauche ou pâturage) !

Les prairies souffrent des fortes chaleurs et du manque d'eau !
L'herbe a stoppé sa pousse, on retrouve même de la perte de biomasse sur pied, il faut donc valoriser l'herbe maintenant par une fauche ou le pâturage des animaux !



Pour les zones de demi-montagne, Valorisation des secondes coupes (fauche ou pâturage) !

Les prairies souffrent des fortes chaleurs et du manque d'eau !
L'herbe a stoppé sa pousse, on retrouve même de la perte de biomasse sur pied, il faut donc valoriser l'herbe maintenant par une fauche ou le pâturage des animaux !



Sur les plateaux d'altitude, Finalisation des chantiers de fenaion !

La fenêtre météo de cette semaine est très favorable pour les chantiers de récolte !

C'est le moment de faucher pour récolter en foin !

Pour les premières parcelles ayant été récoltées dans la saison, il faut valoriser les secondes coupes au risque de perdre du volume sur pied !

En montagne, Poursuite des chantiers de fenaion !

La fenêtre météo de cette semaine est très favorable pour les chantiers de récolte !

Tous les chantiers de récolte par voie humide doivent être terminés, et les chantiers de récolte en sec peuvent se poursuivre !



Quelques conseils pour réussir son chantier de récolte :

Pour l'ensilage d'herbe :

- Récolte au stade optimal (début épiaison dans l'idéal) pour allier qualité et quantité
- Ne pas faucher trop bas (environ 6-7 cm minimum) pour limiter les butyriques, et favoriser une repousse de la prairie
- S'assurer d'avoir une fenêtre climatique favorable pour que l'herbe puisse se ressuyer correctement et atteindre 25 – 30 % de MS
- S'assurer d'une bonne finesse de hachage
- Soigner la confection du tas d'ensilage par un tassage important



Pour l'enrubannage :

- Récolte au stade optimal (début épiaison dans l'idéal) pour allier qualité et quantité
- Ne pas faucher trop bas (environ 6-7 cm minimum) pour limiter les butyriques, et favoriser une repousse de la prairie
- S'assurer d'avoir une fenêtre climatique favorable de 2/3 jours pour pouvoir pré-faner et atteindre 50 % de MS
- Possibilité d'utiliser les couteaux sur certaines presses pour faciliter la préparation de la ration et la distribution
- Limiter au maximum la manutention des bottes pour conserver une bonne qualité de conservation




Pour le foin :

- Récolte au stade optimal (pleine épiaison/début floraison dans l'idéal) pour allier qualité et quantité !
- Ne pas faucher trop bas (environ 6-7 cm minimum) pour favoriser une repousse de la prairie, et de préférence l'après-midi ou en soirée pour favoriser un taux de sucre dans le fourrage
- Etre vigilant avec les feuilles des légumineuses notamment lors de l'andainage !
- S'assurer d'avoir une fenêtre climatique de 4/5 jours pour pouvoir faner correctement et atteindre 85% de MS.





Quelques repères pour l'optimisation du pâturage :



HAUTEUR OPTIMALE

POUR LA RENTRÉE DES ANIMAUX dans la parcelle

10 – 12 cm d'herbe



HAUTEUR IDÉALE

POUR LA SORTIE DES ANIMAUX de la parcelle

Si vous faites pâturer en dessous de cette hauteur d'herbe, elle mettra plus de temps à repartir

Environ 5 cm : au niveau du talon de la botte



RÉSERVER POUR LA FAUCHE !

À cette hauteur d'herbe, les animaux vont pâturer mais créer des refus qui devront être broyés

Au-delà de 15 cm



L'épandage d'azote sur les prairies doit se faire de manière précoce et optimale !
Pour garder une bonne qualité de fourrage, et éviter de retrouver de l'azote soluble dans les fourrages :



Délai de
45 jours
minimum





État des lieux de la pousse d'herbe en Lozère

	Secteur 	Date 	Hauteur d'herbe 	Quantité d'herbe disponible / ha
	Le Malzieu- Forain	20 juin	9,1 cm	1T048 kg MS
Observations 	Moyenne sur 14 parcelles mesurées (prairies naturelles et temporaires). Conclusion des premières coupes cette semaine ! La pousse d'herbe ralentit : +15 kg MS de pousse / jour / ha entre le 12 et le 20/06.			
	Trélans	23 juin	8,2 cm	795 kg MS
Observations 	Agrandissement du tour de pâturage cette semaine. Les secondes coupes s'assèchent sur pied et la pousse ralentit ! Fauche prévue en fin de semaine ! En moyenne sur 12 parcelles : + 35 kg MS/jour/ha entre le 16 et le 23/06 !			
	Grandrieu	23 juin	8,8 cm	926 kg MS
Observations 	Moyenne de 15 parcelles (prairies naturelles et temporaires). 2^{ème} tour de pâturage en cours Conclusion des premières coupes ! Croissance qui ralentit encore : +15 kg MS/jour/ha entre le 13/06 et le 23/06 !			
	Le Buisson	19 juin	8,2 cm	794 kg MS
Observations 	4^{ème} tour de pâturage en cours Fauche des secondes coupes ! Perte de biomasse sur pied sur plusieurs parcelles. Croissance faible : + 5 kg MS/jour/ha entre le 11/06 et le 19/06 !			
	Nasbinals	20 juin	11,9 cm	1T755 kg MS
Observations 	Moyenne de 6 prairies naturelles exclusivement pâturées. Second tour de pâturage en cours ! Perte de biomasse sur pied sur plusieurs parcelles ! Croissance faible : + 13 kg MS/jour/ha entre le 12/06 et le 20/06 !			

Partenaires financiers de nos actions :



Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
Région Occitanie

Sommaire :

1. Etat de la ressource en eau et actualités réglementaires
2. Tendance météo et conseils irrigation
3. Essai pour optimiser l'irrigation grâce aux outils d'aide à la décision et au travail du sol.

Etat de la ressource en eau et actualités réglementaires

Les **sols ont continué à s'assécher la semaine précédente** (17/06-23-06) et les orages n'ont touché que le sud du Mont Lozère. Florac a par exemple reçu 64,5 mm entre vendredi et dimanche alors qu'il n'y a eu aucune précipitation sur Chanac (figure 1).

Les températures très chaudes des derniers jours induisent des besoins en eau importants pour les plantes (5 à 6,8 mm d'évapotranspiration potentielle [ETP] par jour). En moyenne sur les 36 stations suivies en Lozère par le site « Info sécheresse », **les températures de la semaine dernières ont été à plus de 3° C au-dessus de la normale**. La campagne d'irrigation a donc commencé pour plusieurs exploitations ayant des sols superficiels et séchants.




Figure 1. Pluviométrie (mm) des 7 derniers jours (18/06-24/06).

Le niveau des rivières a diminué rapidement ces derniers jours et se rapproche du seuil de vigilance sécheresse. **Aucun arrêté préfectoral régulant les prélèvements d'eau n'a été publié** pour le moment mais un arrêté préfectoral pour passer en état de vigilance sécheresse est en cours de préparation.

Tendance météo et conseils irrigation

Mise à part de faibles averses (0.5 mm) prévues dans la nuit du mercredi au jeudi sur la plupart du département qui vont faire légèrement redescendre les températures, la semaine du 24/06 au 30/06 va continuer avec la **chaleur et aucune précipitation significative**. Des températures à plus de 30°C sont prévues pour quasiment tout le département.

CHANAC

Mercredi 25 juin	Jeudi 26 juin	Vendredi 27 juin	Samedi 28 juin	Dimanche 29 juin
Pluie 0,3 mm	Pluie 0 mm	Pluie 0 mm	Pluie 0 mm	Pluie 0 mm
ETP 6,9 mm	ETP 4,4 mm	ETP 5,6 mm	ETP 6,2 mm	ETP 6,7 mm
Température 18,4 / 33,6 °C	Température 16 / 25,2 °C	Température 13,8 / 29 °C	Température 16,6 / 33,2 °C	Température 14,8 / 33,6 °C
Humidité 47 %	Humidité 65 %	Humidité 55 %	Humidité 48 %	Humidité 45 %
Vent 7 / 15 km/h	Vent 7 / 15 km/h	Vent 6 / 14 km/h	Vent 5 / 11 km/h	Vent 4 / 5 km/h

Conseils selon le type de culture :

Les besoins en eau du maïs vont commencer à augmenter à partir du stade 10-12 feuilles et sa sensibilité au stress hydrique est particulièrement importante au moment de la floraison.




Figure 2. Besoin en eau du maïs selon le stade de développement (Terre-net)

La dose d'irrigation du maïs se réfléchit selon le type de sol, la quantité d'eau disponible et les tours d'eau et sera donc spécifique à chaque exploitation. On note toutefois qu'une dose de **25 mm tous les 7 jours** vaut mieux qu'une dose plus importante de manière moins fréquente. Chaque précipitation de 5 mm repousse l'irrigation d'un jour.


		Rythme d'irrigation en période sans pluie	Dose fréquence	Nombre d'irrigations
VOLUME /ha nécessaire en début de campagne pour couvrir les besoins 8 ans sur 10	240 mm*	5 mm/jour	30 mm tous les 6 jours	8
		-29 %		
	175 mm	3,6 mm/jour	25 mm tous les 7 jours	7
VOLUME effectivement disponible cette année	150 mm	3,1 mm/jour	25 mm tous les 8 jours	6
	125 mm	2,6 mm/jour	25 mm tous les 9-10 jours	5

(*) 2400 m³/ha

Figure 3. Exemple de rythme d'irrigation adapté à un volume d'eau limité et en situation de référence sans restriction (Arvalis)

Conseils selon type de sol :

Selon nos tensiomètres, **les parcelles en sol superficiel limoneux sableuse ont atteint le seuil de vigilance** à 30 cm de profondeur en termes de tension de l'eau dans le sol malgré un passage d'irrigation de 30 mm jeudi dernier.



Quant aux **parcelles à sol plus profond**, particulièrement celles de la vallée du Lot, elles sont encore humides en profondeur. Il faut donc raisonner l'irrigation et la quantité selon le stade de la plante et en prenant en compte cette humidité.

Essai pour optimiser l'irrigation grâce aux outils d'aide à la décision et au travail du sol.

Un essai est en cours afin de réaliser des économies d'eau sur la culture de la luzerne dans des systèmes d'élevage de moyenne montagne (vallée du Lot en Lozère).

Deux leviers d'optimisation sont étudiés :

- un levier technologique avec l'utilisation d'un outil d'aide à la décision (OAD) composée de sondes tensiométriques connectées afin de comparer une modalité d'irrigation habituelle pour l'exploitant et une modalité d'irrigation « optimisée » grâce à un OAD.
- un levier agronomique avec l'étude de l'impact de différent travail du sol sur la résilience au stress hydrique de la luzerne. On se demandera si les 3 principes de l'agriculture de conservation des sols (ACS) permettent de mieux stocker l'eau dans les sols.

Les résultats de ces leviers seront également évalués en termes de valeur alimentaire et de rendement. En effet, l'objectif de produire de la luzerne est avant tout de pouvoir atteindre une autonomie alimentaire et protéique.



Financé par :

