



BULLETIN FOURRAGES

16 mai 2025 – Numéro 2

Météo compliquée pour les récoltes

Sommes de températures : l'avance se maintient

Données Météo France


données actualisées au	Précipitations (mm)			Somme de températures depuis le 1er février (°C-jour) 2025	écart par rapport à la moyenne (20 ans)	Repères pour la fauche		
	du	au	30			Foin fibreux prairie précoce ⁽¹⁾	Foin de qualité prairie tardive ⁽²⁾	Foin fibreux prairie tardive
	4-mai	10-mai	derniers jours					
10-mai-25						1200 °j à 1300 °j	1500 °j	1600 °j
AUCH	48 mm	127 mm		1089°	-5 jours	16-mai 22-mai	4-juin	10-juin
CONDOM	14 mm	83 mm		1131°	-4 jours	21-mai 27-mai	9-juin	16-juin
FLEURANCE	19 mm	79 mm		1138°	-6 jours	20-mai 26-mai	8-juin	15-juin
LAHAS	44 mm	123 mm		1115°	-5 jours	13-mai 19-mai	31-mai	7-juin
LANNEPAX	19 mm	120 mm		1115°	-4 jours	15-mai 20-mai	2-juin	9-juin
LE HOUGA	19 mm	105 mm		1125°	-4 jours	15-mai 20-mai	2-juin	9-juin
MAUMUSSON	44 mm	141 mm		1150°	-3 jours	15-mai 20-mai	2-juin	9-juin
MAUROY	47 mm	120 mm		1156°	-6 jours	14-mai 20-mai	2-juin	8-juin
MIRANDE	25 mm	103 mm		1122°	-5 jours	15-mai 20-mai	2-juin	8-juin
PEYRUSSE-GRANDE	48 mm	144 mm		1113°	-4 jours	13-mai 18-mai	31-mai	7-juin
SADEILLAN	44 mm	127 mm		1092°	-4 jours	12-mai 18-mai	30-mai	6-juin
BLAJAN	48 mm	178 mm		1014°	0 jours	16-mai 21-mai	4-juin	10-juin
PARLEBOSCQ	18 mm	112 mm		1118°	-2 jours	19-mai 25-mai	7-juin	13-juin
CASTELNAU MAGNOAC	75 mm	178 mm		1028°	-6 jours	17-mai 22-mai	4-juin	11-juin
MAUBOURGUET	35 mm	100 mm		1120°	-4 jours	14-mai 20-mai	1-juin	8-juin

*cumul des températures moyennes journalières depuis le 1er février. Prévisions : à partir des prévisions Météo France pour les 14 prochains jours puis des valeurs moyennes sur 20 ans

(1) : Flore à dominante dactyle, fétuque élevée (naturels ou semés), ray-grass italien ou hybride, pâturin commun, fromental...

(2) Flore à dominante agrostides, Triset, Brachypodes, variétés 1/2 tardives à tardives de R-G anglais...

🌱 Prévisions : une semaine perturbée par les orages



Prévisions Météo France pour Mirande au 16/05 – quantités de pluie : prévisions Weenat

🌱 Conseils de saison :

🌱 Récoltes des foins en conditions météo incertaines

La récolte des foins risque cette année encore d'être compliquée par des conditions orageuses, avec des créneaux de récolte raccourcis par des averses fréquentes.

Quelques conseils pour des récoltes de foin en conditions « limites » :

- **Faucher haut** (7-8 cm) pour faciliter la circulation de l'air sous les andains et les isoler du sol humide.
- Si la faucheuse laisse des andains étroits (étalement sur moins de 80% de la surface du sol), réaliser un **fanage au plus tôt après la fauche** pour maximiser la surface d'exposition à l'air et au soleil.
- Pour faciliter la fin du séchage au champ en conditions peu favorables, réaliser un pré-andainage en constituant d'abord des petits andains et en les regroupant juste avant le pressage.
- **Limiter le diamètre des balles** si le foin risque d'être pressé pas tout à fait sec : plus le volume de la balle est faible, plus il y a de surface en contact avec l'extérieur par kilo de foin, ce qui rend plus facile l'évacuation de la chaleur et de l'humidité
- **Faire des balles moins serrées**, moins denses : le séchage sera facilité par une meilleure circulation de l'air. A l'inverse, des balles plus serrées c'est plus de matière dans la balle et donc plus de « carburant » pour le processus d'échauffement.
- **Attention** : pour **enrubanner un fourrage déjà très sec** mais pas assez pour une bonne conservation en foin parce que la pluie arrive plus tôt que prévu, **les critères à respecter pour le pressage sont inversés** par rapport à ceux conseillés pour un foin. Pour une bonne conservation en enrubannage, il faut le moins d'air possible dans la balle. Il faut donc réaliser des **balles très serrées** pour réduire au maximum la présence d'air dans la balle, et de **plus gros diamètre**, pour avoir le moins de surface en contact avec l'extérieur par rapport à la quantité de fourrage.
- En cas de doute sur la teneur en humidité au pressage, **laisser les balles à l'extérieur** (2 à 3 semaines), et ne les rentrer qu'après avoir **contrôlé leur température** à l'aide d'une sonde (coût autour de 100-150 €).
- Si des balles douteuses sont rentrées à l'abri, ne pas les empiler ou au moins éviter de trop les serrer pour que l'air circule, assurer une ventilation maximale du bâtiment et suivre régulièrement leur température.



Pour plus de précisions, vous pouvez télécharger sur notre site internet une [note technique sur les foins récoltés en conditions humides](#).

Des conditions favorables pour les semis de fourrages d'été

Avec le retour de la chaleur et les pluies régulières, la période est favorable pour les semis de **fourrages estivaux à base de sorgho ou millet** fourrager. Ces espèces qui résistent bien au sec une fois implantées sont une solution **pour prolonger le pâturage en été**. Cela permet de limiter le surpâturage des prairies et d'économiser des stocks, tout en continuant d'offrir du fourrage vert aux animaux. Semés dès que possible, par exemple après un méteil ou une 1^{ère} coupe d'une prairie dégradée, ils pourront permettre plusieurs exploitations à partir de fin juin – début juillet.

On peut les associer à des légumineuses adaptées aux conditions estivales : trèfle de Perse, trèfle d'Alexandrie ou trèfle vésiculeux (à éviter en sols argileux). Plus d'information sur le choix des espèces et les conditions de culture dans la [fiche technique « Dérobées estivales »](#), téléchargeable sur notre site internet.

Pâturage : s'adapter aux conditions humides

- Les **fortes pluies** de ces derniers jours et celles encore prévues vont dégrader la portance des pâtures. **Quelques pistes pour limiter les dégâts :**

- Re-découper les parcelles (ou utiliser un fil avant) pour limiter la surface à disposition des animaux et leurs déplacements.
- Pour les animaux rentrés tous les jours pour la traite ou l'allaitement des veaux, **limiter la durée de pâturage à quelques heures dans la journée** permet de réduire le piétinement. La consommation d'herbe et la production laitière ne sont pas forcément réduites, car en 3-4 jours **les vaches adaptent leur rythme de consommation** à leurs nouveaux horaires de pâturage et passent alors une plus grande partie de leur temps à brouter pour maximiser leur ingestion d'herbe. De ce fait elles se déplacent moins et dégradent moins le sol. C'est ce qui a été mesuré dans plusieurs essais réalisés par l'INRAE avec des vaches ou des chèvres laitières. Des essais réalisés dans des pays avec des conditions souvent pluvieuses au pâturage (Irlande...) ont confirmé ces résultats et mesuré l'impact positif de cette pratique sur l'état du sol.

En dessous de 8-9 h de pâturage par jour, un complément de fourrage est nécessaire pour maintenir la production des vaches laitières (voir tableau).

Cette pratique peut être réalisée aussi avec des animaux qui ne rentrent pas en bâtiment, en les parquant en dehors des heures de pâturage sur une parcelle ou partie de parcelle sacrifiée. Un fourrage complémentaire pourra être apporté si le temps d'accès à la pâture est insuffisant.

Pâturage : gestion des refus d'herbe haute et épiée

A cette période les refus ont tendance à s'accumuler dans les prairies, avec beaucoup d'espèces épiées souvent mal consommées. Surtout quand les mises à l'herbe ont été retardées pour cause de sols trop détrempés, ou quand la surface pâturée est trop importante par rapport au nombre d'animaux et à la croissance de l'herbe. Une **fauche de ces refus** permettra de **relancer la croissance de l'herbe** en mettant fin au cycle reproducteur. S'ils sont très abondants ils peuvent être récoltés, mais il est aussi possible de **les faire consommer au sol par les vaches** après quelques heures de séchage. Faucher à environ 8 cm : il doit rester du vert pour une repousse rapide.

