



4 mars 2025
n° 1

MARDI 04	MERCREDI 05	JEUDI 06	VENDREDI 07	SAMEDI 08	DIMANCHE 09	LUNDI 10
6° / 17°	4° / 18°	4° / 19°	7° / 19°	10° / 19°	8° / 15°	5° / 15°
-	-	-	0 à 1 mm	2 à 5 mm	12 à 37 mm	1 mm

Source : www.meteofrance.com - Tarbes

Données météo

données actualisées au	Précipitations (mm)			Somme de températures depuis le 1er février (°C-jour)			Mise à l'herbe ovins	Mise à l'herbe bovins		
	du	au	30 derniers jours	2025	2024	année moy		prairies TP / RGI	prairies précoces	prairies tardives
3-mars-25	25-févr.	3-mars	jours				200 °j	250 °j	300 °j	400 °j
Ossun	5 mm	52 mm		248°	207	212	24-févr.	3-mars	9-mars	20-mars
Vic-en-Bigorre	3 mm	52 mm		204°	270	220	2-mars	8-mars	13-mars	23-mars
Saint Lary	6 mm	49 mm		179°	147	136	6-mars	14-mars	21-mars	3-avr
Luz St Sauveur	5 mm	60 mm		208°	213	187	9-mars	9-mars	9-mars	9-mars
Campistrous	3 mm	48 mm		243°	228	195	24-févr.	3-mars	9-mars	20-mars
Lomné	3 mm	66 mm		212°	174	206	1-mars	7-mars	13-mars	24-mars
Adast	5 mm	42 mm		233°	211	199	26-févr.	4-mars	10-mars	10-mars
Castelnau-Magnoac	7 mm	43 mm		240°	264	166	25-févr.	4-mars	10-mars	20-mars
Tournay	4 mm	56 mm		248°	196	223	24-févr.	3-mars	9-mars	19-mars

Estimation selon altitude depuis le 1^{er} février

A 200m	A 300m	A 400m	A 500m	A 600m	A 700m	A 800m	900m	1000m
Vic	Tarbes		Bagnères	Lannemezan		Luz		
237°jour	239°jour	227°jour	220°jour	233°jour	207°jour	204°jour	179°jour	154°jour

Repères intervention

	Mise à l'herbe
Prairie temporaire	250 °Cjour
Prairie permanente fertile et précoce	300 °Cjour
Prairie permanente plus tardive	400 °Cjour

Une mise à l'herbe à prévoir début mars cette année !

A faire cette semaine

- Avec les températures douces du mois de février, l'herbe est en avance cette année. Les mises à l'herbe vont pouvoir se faire assez vite sur les prairies productives et/ou précoces.
- Attention à la portance des sols. Avec les précipitations importantes de ces derniers mois, il est primordial de commencer le pâturage par les parcelles les plus portantes, même si elles sont un peu éloignées du bâtiment.
- La fertilisation se fait normalement à 200°jour depuis le 1^{er} janvier ce qui correspondait à fin janvier cette année. Vous pouvez encore faire cette fertilisation si les prairies n'ont pas encore démarré.
- C'est le moment de préparer ses clôtures et d'organiser son pâturage en fonction des lots de cette année ! (cf article ci-dessous)

Organiser un pâturage tournant


Plusieurs systèmes de pâturage existent : au fil, tournant, libre. Avec l'augmentation des troupeaux et la recherche de la simplification des systèmes de conduite, le pâturage libre s'impose fréquemment. Cependant, ce qui est bon pour le temps de travail ne l'est pas forcément pour la prairie, ni pour les stocks !

Le pâturage tournant : un bon compromis entre la conduite au fil et le pâturage libre


Le pâturage libre se fait sur des grands parcs. Les animaux consomment sans contrainte l'herbe disponible. Mais les parcs de grandes dimensions présentent souvent une flore hétérogène, avec des parties plus appétentes que d'autres. Les animaux iront naturellement prélever l'herbe la plus appétente, surpacageant ces zones, et délaissant (donc sous exploitant) celles de moindre qualité.

Le principe du pâturage tournant est de faire circuler assez rapidement les animaux dans des parcs de dimensions restreintes. Ce type d'organisation permet de contraindre les animaux à bien valoriser toute la surface du parc, tout en évitant le surpâturage, comme le sous pâturage.

Le pâturage en système tournant permet à la prairie d'exprimer tout son potentiel de production.



Printemps



Tout début printemps
Été - Automne

Comment organiser le pâturage tournant ?

Pour connaître la taille idéale des parcs il faut respecter **2 principes**:

- les animaux ne doivent pas revenir sur une même parcelle avant **21 jours** pour les prairies précoces et 25 jours pour les plus tardives.

Ce laps de temps permet à la plante de reconstituer ses réserves racinaires et de repousser dans de bonnes conditions en assurant une production maximale,

- les animaux peuvent rester 3 à 4 jours sur un même parc, mais il ne faudra **jamais dépasser 6 jours**. En effet, au bout du sixième jour, l'herbe consommée le premier jour peut être à nouveau pâturée, sans avoir eu le temps de reconstituer ses réserves.

Exemple : un éleveur doit faire pâturer un lot de 30 vaches allaitantes sur 11 ha plutôt tardifs (on prendra donc un temps de retour sur les parcelles de 24 jours). L'éleveur ne laissera ses animaux que 4 jours sur chaque parc. Voici le calcul pour déterminer la surface de chaque parc :

$$11 \text{ ha} / (25 \text{ jours} + 4 \text{ jours}) = 0,38 \text{ ha/jour}$$

$$0,38 \text{ ha/jour} * 4 \text{ jours} = 1.52 \text{ ha}$$

Les parcs devront faire en moyenne 1.50 ha, ce qui fait environ 7 parcs à constituer.

Si des parcelles sont plus petites que les 1.50ha, on adaptera le nombre de jour à la surface (1 jour pour 0.28ha)

Pour connaître la surface nécessaire pour un lot, on peut se baser aux références suivantes :

Types de prairies	Surface nécessaire
Prairie artificielle	25ares/UGB
Prairie permanente productive	30 à 40 ares/UGB
Prairie peu productive	+ de 40 ares/UGB

Ces surfaces sont celles nécessaires pour le pâturage de printemps, il faudra rajouter des surfaces complémentaires lorsque l'herbe pousse moins : Début de printemps avec le déprimage des parcelles de fauche et fin de printemps lorsque les conditions météo deviennent moins favorables (chaud et sec) en pâturant les repousses des fauches précoces.

Voici donc l'organisation " idéale" du pâturage ; l'organisation concrète tiendra compte des contraintes du relief, de la disponibilité en eau, mais sans pour autant oublier les fondamentaux du pâturage tournant !



12 mars 2025
n° 2

MERCREDI 12	JEUDI 13	VENDREDI 14	SAMEDI 15	DIMANCHE 16	LUNDI 17	MARDI 18
7° / 13°	5° / 9°	3° / 8°	1° / 10°	2° / 10°	3° / 12°	2° / 15°
8 à 9 mm	5 à 6 mm	4 à 11 mm	2 à 3 mm	0 à 1 mm	0 à 2 mm	1 mm

Source : www.meteofrance.com - Tarbes

Données météo

données actualisées au	Précipitations (mm)			Somme de températures depuis le 1er février (°C-jour)			Mise à l'herbe ovins	Mise à l'herbe bovins		
	du 4-mars	au 10-mars	30 derniers jours	2025	2024	année moy		prairies TP / RGI	prairies précoces	prairies tardives
10-mars-25							200 °j	250 °j	300 °j	400 °j
Ossun	16 mm	56 mm	319°	261	270		24-févr.	3-mars	7-mars	18-mars
Vic-en-Bigorre	8 mm	27 mm	314°	321	284		25-févr.	4-mars	8-mars	18-mars
Saint Lary	34 mm	65 mm	240°	193	174		5-mars	11-mars	18-mars	31-mars
Luz St Sauveur	35 mm	78 mm	270°	267	236		7-mars	7-mars	7-mars	7-mars
Campistrous	7 mm	44 mm	311°	280	247		24-févr.	4-mars	8-mars	19-mars
Lomné	11 mm	61 mm	280°	222	263		1-mars	7-mars	12-mars	23-mars
Adast	12 mm	38 mm	307°	265	251		26-févr.	5-mars	9-mars	9-mars
Castelnau-Magnoac	4 mm	34 mm	311°	316	204		25-févr.	4-mars	8-mars	19-mars
Tournay	8 mm	53 mm	319°	248	283		24-févr.	3-mars	8-mars	18-mars

Estimation selon altitude depuis le 1^{er} février

A 200m	A 300m	A 400m	A 500m	A 600m	A 700m	A 800m	900m	1000m
Vic	Tarbes		Bagnères	Lannemezan		Luz		
330°jour	318°jour	306°jour	298°jour	309°jour	278°jour	272°jour	247°jour	222°jour

Repères intervention

	Mise à l'herbe
Prairie temporaire	250 °Cjour
Prairie permanente fertile et précoce	300 °Cjour
Prairie permanente plus tardive	400 °Cjour

A faire cette semaine

- Les 300°jour qui annoncent une sortie souhaitable des animaux dans les prairies commence à être atteints sur les parties basses du département. Attention cependant à la portance des sols, certaines zones ayant été bien arrosées. Essayez de trouver des parcelles portantes, même si ça n'est pas celles qui sont habituellement pâturées en premier. Il est important de ne pas trop retarder la mise à l'herbe, tant pour les animaux que pour les prairies.
- Attention, la mise à l'herbe est une étape primordiale à la fois pour la réussite de la saison de pâturage mais également délicate pour le troupeau. Il faut l'anticiper pour la gérer au mieux (cf. articles ci-dessous)

La mise à l'herbe : un moment clé de la saison de pâturage

Réussir sa saison de pâturage, c'est à dire garder des performances animales optimales et une prairie productive et en bon état, impose de respecter quelques règles simples ; elles ne sont cependant pas toujours évidentes à mettre en œuvre.

La mise à l'herbe est notamment une période clef, pour les animaux et pour les prairies.

Une erreur courante consiste à lâcher le bétail tardivement, par crainte de manquer d'herbe ou de revoir le mauvais temps en sortant les animaux trop tôt.

Attendre que l'herbe soit suffisamment haute pour démarrer sa saison de pâturage aura cependant pour conséquence de se faire dépasser par la pousse lorsqu'elle sera explosive, d'entrer trop tardivement dans les parcelles suivantes, et donc de gaspiller l'herbe disponible par refus et piétinement. Une erreur d'exploitation de ce type se répercute sur toute la saison de pâturage, voire sur les suivantes.



Il est donc primordial de sortir le bétail le plus tôt possible (après un repos hivernal de 2 mois des prairies), dès que les conditions climatiques et de portance du sol le permettent, et sans attendre une hauteur de végétation supérieure à 7 - 8 cm (cf photo ci contre).

Ce pâturage précoce, qui est en fait un « pré-pâturage » à effectuer assez rapidement sur plusieurs parcelles, présente en effet de nombreux avantages :

- Assurer une transition alimentaire avec la ration hivernale : l'herbe de printemps contient davantage de sucres solubles et de matières azotées qu'une ration hivernale, mais beaucoup moins de matières sèches. Pouvoir l'assimiler demande une adaptation de la flore de la panse des ruminants, ce qui nécessite environ 3 semaines.
- Nettoyer les parcelles avant la pleine pousse (diverses en feuilles et touffes de graminées, non encore trop dures pour être pâturées), et de favoriser les légumineuses, qui sont des plantes de lumière
- Favoriser aussi la densification du gazon, grâce au tallage des graminées, et d'améliorer la qualité du fourrage en orientant la végétation à faire des repousses plus courtes en tiges et plus feuillues.
- Déprimer les parcelles destinées à la fauche afin de décaler légèrement la période de fauche sans conséquence sur le rendement et donc optimiser la qualité du foin en le faisant dans de meilleures conditions.
- Etaler la pousse de l'herbe pour la période de plein pâturage
- Valoriser une herbe de bonne qualité et très digestible, en économisant les stocks et les concentrés.



La mise à l'herbe : coté troupeau

La mise à l'herbe est un moment attendu et apprécié par l'éleveur, surtout lorsque le printemps daigne enfin succéder à un long hiver. Passées les indispensables remises en état des clôtures et des points d'abreuvement, les pâtures ne tarderont pas à reverdir. Pour bénéficier pleinement de cette alimentation de haute qualité et peu coûteuse, il convient de préparer cette mise à l'herbe car elle peut avoir un impact sur la santé des animaux.

Une bonne gestion de l'herbe au début du printemps sera déterminante pour la saison de pâturage et sur la qualité des récoltes de fourrages à venir.

Respecter une transition alimentaire sur 3 semaines minimum

La transition entre la ration hivernale et la ration estivale doit être progressive. Il faut que la flore du rumen (panse) de vos animaux puisse s'adapter au nouveau régime alimentaire.

La digestion des aliments commence par une phase de fermentation dans la panse des ruminants. La flore microbienne responsable de ces fermentations se spécialise en fonction de la nature des aliments consommés. Plus la ration hivernale sera différente de la composition de l'herbe jeune et plus la transition sera nécessaire et longue.

Les caractéristiques de l'herbe jeune sont :

- **sa grande richesse en eau,**
- **sa faible teneur en cellulose et amidon,**
- **sa richesse en azote et sucres solubles.**

Quelles sont les grandes règles à respecter pour assurer une bonne transition alimentaire ?

- Une durée de pâturage de 2 à 3 heures par jour la première semaine est recommandée. Cette durée sera ensuite augmentée progressivement.

- Les animaux seront d'abord sortis l'après-midi lorsque leur panse est pleine.

- Parallèlement à la mise à l'herbe, une diminution progressive des concentrés azotés de la ration devra être effectuée car l'herbe est naturellement riche en azote mais un apport en céréales pourra être maintenu même en faible quantité afin de rééquilibrer la ration journalière. Par ailleurs, l'apport énergétique de la céréale sera bien venu en période froide.

De plus, cette visite quotidienne permet une meilleure surveillance des animaux pour détecter certains troubles alimentaires

Pensez à l'apport minéral :

L'herbe jeune, surtout quand elle provient de prairies temporaires à flore peu variée ou dans le cas de prairies permanentes à flore dégradée, est souvent pauvre en constituants minéraux importants : sodium, magnésium, sélénium, iode. Il ne faut donc pas oublier de maintenir l'apport en oligo-éléments par la mise à disposition d'un bloc à lécher en pâture.

Préparer les animaux à la mise à l'herbe en réalisant un apport de 30g de chlorure de Magnésium /gros bovin/jour, 2 à 3 semaines avant la mise à l'herbe.

Gérez le parasitisme :

Avec l'hiver doux que nous venons de passer, les larves infestantes sont là en quantité.

Cette contamination résiduelle est en moyenne de 300 larves/kg de matière sèche avec des écarts importants qui sont dus essentiellement au mode d'exploitation de la parcelle à la fin de l'année précédente, au type d'animaux, à la date de retrait de la parcelle, son chargement et le mode de déparasitage.

VIGILANCE : La prévention chez les jeunes bovins la première année :

Cette catégorie est la plus exposée au risque parasitaire à cause de l'absence ou la faiblesse des défenses immunitaires. L'objectif de la prévention du parasitisme sera de développer au cours des deux premières années de pâturage une immunité forte tout en préservant la croissance des animaux et une valorisation maximale de l'herbe.

Cas des veaux de race allaitante nés en l'automne :

Il s'agit des veaux issus de vêlages précoces (octobre à décembre), mis à l'herbe avec les mères. Ces animaux consomment des quantités d'herbe significatives dès la mise à l'herbe et, en l'absence de défenses immunitaires, ils multiplient les parasites, contaminent la parcelle et leur croissance peut en pâtir.

Un protocole qui consiste à protéger les mâles par l'application d'un antiparasitaire en mode Longue Action pour assurer une meilleure croissance (on épargnera toutefois, le veau destiné à une carrière de reproducteur), alors que les femelles ne seront pas protégées et pourront ainsi forger leur immunité avec la faible infestation qu'elles créeront (les mères immunisées et les mâles protégés ne multiplieront pas ou peu les parasites).

Au sevrage (précoce), les femelles pourront être déparasitées avec un antiparasitaire à action rémanente si elles restent sur des parcelles pâturées, ou à action instantanée si on leur attribue des repousses après fauche.

Cas des veaux de race allaitante nés en fin d'hiver et au printemps :

Il s'agit des veaux issus de vêlages plus tardifs (janvier à mars), mis à l'herbe avec les mères. Ces animaux consomment peu d'herbe au départ et les faibles niveaux de contamination garantis par les mères permettent une installation progressive de l'immunité.

Cependant, il n'est pas rare qu'au milieu de l'été, avec la conjonction de facteurs favorisant (météo, chargement), le risque de strongyloses cliniques apparaisse.

Il est donc prudent de déparasiter les veaux avec un antiparasitaire à action rémanente s'ils restent sur des parcelles pâturées, ou à action instantanée s'ils sont transférés sur des repousses après fauche.

Cas des bovins adultes :

Les bovins adultes ont en général développé leur immunité face aux parasites. Seuls les bovins présentant des signes d'infestation parasitaire important (poils piqué, ventre gonflé, diarrhées et/ou toux) subiront au cas par cas un traitement antiparasitaire à action instantanée.

En conclusion, la mise à l'herbe n'est jamais anodine et si on souhaite profiter au maximum des apports de l'herbe jeune dans l'alimentation des bovins, il est impératif de respecter ces quelques règles.

En mettant en œuvre ces principes, on améliorera la valorisation de l'herbe tout en favorisant l'immunité des animaux et par conséquent leur croissance.



Pascale Martin
Chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées



18 mars 2025
n° 3

MARDI 18	MERCREDI 19	JEUDI 20	VENDREDI 21	SAMEDI 22	DIMANCHE 23	LUNDI 24
0° / 18°	5° / 21°	5° / 24°	11° / 18°	11° / 20°	7° / 13°	6° / 13°
-	-	-	2 à 6 mm	0 à 2 mm	8 à 20 mm	4 à 9 mm

Source : www.meteofrance.com - Tarbes

Données météo

données actualisées au	Précipitations (mm)		Somme de températures depuis le 1er février (°C-jour)			Mise à l'herbe bovins			Fin déprimage	
	du	au 30 derniers				prairies TP / RGI	prairies précoces	prairies tardives	prairies précoces	prairies tardives
16-mars-25	10-mars	16-mars jours	2025	2024	année moy	250 °j	300 °j	400 °j	500 °j	800 °j
Ossun	15 mm	42 mm	357°	316	322	3-mars	7-mars	20-mars	30-mars	24-avr
Vic-en-Bigorre	24 mm	45 mm	357°	382	341	4-mars	8-mars	20-mars	29-mars	23-avr
Saint Lary	25 mm	80 mm	263°	234	218	11-mars	21-mars	3-avr	14-avr	11-mai
Luz St Sauveur	15 mm	68 mm	290°	312	286	7-mars	7-mars	7-mars	7-mars	7-mars
Campistrous	22 mm	46 mm	340°	333	294	4-mars	8-mars	22-mars	1-avr	26-avr
Lomné	35 mm	70 mm	311°	273	314	7-mars	12-mars	25-mars	4-avr	29-avr
Adast	16 mm	41 mm	342°	318	301	5-mars	9-mars	9-mars	21-mars	31-mars
Castelnau-Magnoac	10 mm	27 mm	351°	377	237	4-mars	8-mars	21-mars	30-mars	25-avr
Tournay	46 mm	71 mm	361°	304	339	3-mars	8-mars	20-mars	29-mars	23-avr

Estimation selon altitude depuis le 1^{er} février

A 200m	A 300m	A 400m	A 500m	A 600m	A 700m	A 800m	900m	1000m
Vic	Tarbes		Bagnères	Lannemezan		Luz		
371°jour	358°jour	341°jour	330°jour	338°jour	304°jour	294°jour	269°jour	243°jour

Repères intervention

	Mise à l'herbe	Fin déprimage
Prairie temporaire	250 °Cjour	500 °Cjour
Prairie permanente fertile et précoce	300 °Cjour	500 °Cjour
Prairie permanente plus tardive	400 °Cjour	800 °Cjour

A faire cette semaine

- La mise à l'herbe peut maintenant se faire sur tous types de prairies, dès lors que la hauteur d'herbe est suffisante (7cm suffisent). Privilégiez les parcelles les plus portantes même si les prairies peuvent supporter un peu de piétinement (enfouissement du sabot jusqu'à 5cm) en début de saison sans conséquence sur la pérennité de la prairie.
- C'est le moment de faire déprimer vos parcelles de fauche. Si elles sont portantes, passez rapidement pour faire taller les graminées et « épaissir » l'herbe.
- Attention le déprimage doit se terminer avant les 500°Cjour qui auront lieu dès la fin du mois à basse altitude.


Le déprimage

Le déprimage est une technique qui vise à faire pâturer l'herbe avant que le bourgeon terminal de la plante ne se trouve à 5 cm (on parle alors de stade épi 5 cm) soit 500°jour.

Lors d'un déprimage, les animaux pâturent mais ne prélèvent pas l'épi de la plante qui est trop bas dans le couvert, l'épiaison n'est donc pas compromise. Ceci permet de décaler la pousse de l'herbe des parcelles destinées à la fauche et de favoriser le tallage des graminées, en améliorant ainsi la qualité des fourrages produits, sans diminuer le rendement.

Le déprimage ne se justifie par forcément pour les parcelles qui vont être exploitées tôt (parcelles enrubannées, ensilées, ou destinées au séchage en grange). Cette technique, bien qu'intéressante pour améliorer la qualité de l'herbe, ne devra pas être systématisée à l'ensemble des parcelles afin de limiter les risques dus à une éventuelle sécheresse.

En cas de fauche tardive le déprimage permet de diminuer les pertes par sénescence du fourrage récolté et de limiter l'utilisation des stocks en avançant la mise à l'herbe.



L'étêtage

Le déprimage ne doit pas être confondu avec l'étêtage, plus tardif (après 500°jour sur parcelles fertiles), au cours duquel l'apex est prélevé par les animaux. Le fourrage récolté suite à un étêtage contient peu de tiges, c'est un fourrage uniquement feuillu de type regain. La qualité nutritionnelle est très bonne mais le rendement récolté très inférieur à celui d'un foin.

Les repères à connaître sont les suivants :

Prairie temporaire ou permanente fertile	Prairie de fertilité moyenne	Prairie peu fertile
DEPRIMAGE		
500°jour	500°jour	800°jour
ETETAGE		

En résumé :

	DEPRIMAGE	ETETAGE
DEFINITION	Le futur épi n'est pas coupé par la pâture	Le futur épi est coupé
IMPACT SUR LA REPOUSSE	REPOUSSE REPRODUCTIVE Epiaison décalée d'une semaine, la tige repoussera moins haute, sera plus appétente, et il y aura plus de feuilles	REPOUSSE VEGETATIVE (pour les espèces non remontantes : RGA, dactyle, fétuques, ... ; pas pour le RGI, qui fera un épi)
INTERETS	- Favoriser le tallage (densification du gazon) et l'appétence - Optimiser la qualité de foin récolté (moindres pertes de quantités)	- Favoriser les repousses feuillues - Donner la priorité à la qualité de foin (pertes en quantité)



25 mars 2025
n° 4

MARDI 25	MERCREDI 26	JEUDI 27	VENDREDI 28	SAMEDI 29	DIMANCHE 30	LUNDI 31
7° / 14°	6° / 15°	7° / 15°	8° / 15°	6° / 13°	7° / 15°	7° / 14°
3 à 5 mm	3 à 4 mm	2 à 3 mm	4 à 5 mm	6 à 8 mm	0 à 1 mm	-

Source : www.meteofrance.com - Tarbes

Données météo

données actualisées au	Altitude (m)	Précipitations (mm)			Somme de températures depuis le 1er février (°C-jour)			Mise à l'herbe bovins			Fin déprimage	
		du	au	30 derniers jours	2025	2024	année moy	prairies TP / RGI	prairies précoces	prairies tardives	prairies précoces	prairies tardives
23-mars-25		17-mars	23-mars					250 °j	300 °j	400 °j	500 °j	800 °j
Ossun	360 m	8 mm	48 mm		426°	388	384	3-mars	7-mars	20-mars	30-mars	24-avr
Vic-en-Bigorre	219 m	5 mm	46 mm		429°	487	406	4-mars	8-mars	20-mars	29-mars	22-avr
Saint Lary	767 m	43 mm	122 mm		330°	295	269	11-mars	19-mars	1-avr	12-avr	10-mai
Luz St Sauveur		53 mm	118 mm		355°	377	348	7-mars	7-mars	7-mars	7-mars	7-mars
Campistrous	593 m	6 mm	52 mm		408°	399	352	4-mars	8-mars	21-mars	1-avr	26-avr
Lomné	447 m	11 mm	78 mm		380°	336	376	7-mars	12-mars	25-mars	3-avr	29-avr
Adast	445 m	24 mm	63 mm		426°	385	364	5-mars	9-mars	9-mars	20-mars	30-mars
Castelnau-Magnoac	298 m	4 mm	31 mm		423°	481	277	4-mars	8-mars	20-mars	30-mars	24-avr
Tournay	164 m	10 mm	79 mm		433°	375	408	3-mars	8-mars	20-mars	29-mars	23-avr

Estimation selon altitude depuis le 1^{er} février

A 200m	A 300m	A 400m	A 500m	A 600m	A 700m	A 800m	900m	1000m
Vic	Tarbes		Bagnères	Lannemezan		Luz		
444°jour	429°jour	415°jour	404°jour	407°jour	372°jour	360°jour	335°jour	309°jour

Repères intervention

	Mise à l'herbe	Fin déprimage
Prairie temporaire	250 °Cjour	500 °Cjour
Prairie permanente fertile et précoce	300 °Cjour	500 °Cjour
Prairie permanente plus tardive	400 °Cjour	800 °Cjour

A faire cette semaine

- Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, il devient urgent de mettre à l'herbe vos animaux pour qu'ils profitent d'un aliment équilibré et peu coûteux. Attention, plus vous mettez à l'herbe tard, plus vous avez de chance d'être dépassé par l'herbe, qui perdra en qualité.
- Les conditions pluvieuses ne doivent pas retarder cette mise à l'herbe. La prairie peut supporter un peu de piétinement à cette période.
- Suivez les repères de hauteur d'herbe ci-dessous, ils vous permettront de pâturer toujours une herbe de qualité, d'augmenter la production et de faire durer vos prairies.
- Sur les parcelles prévues pour la fauche, les 500°jours seront atteints la semaine prochaine jusqu'à 800m d'altitude. Il faudra donc sortir les animaux de ces parcelles sous peine d'affecter le futur rendement en foin.

Des repères visuels et vos bottes pour gérer le pâturage

Bien faire pâturer, c'est savoir gérer au bon moment :

- **le démarrage de la saison de pâturage,**
- **l'entrée des animaux sur les parcelles,**
- **et leur sortie des prairies.**

Différents outils de gestion plus ou moins perfectionnés existent.

Il y en a un particulièrement pratique et facile d'accès : vos bottes ! Et le résultat est immédiatement disponible.

Prenez l'habitude de parcourir régulièrement vos prairies et vous vous ferez rapidement vos repères.

Anticiper votre mise à l'herbe !



Hauteur de 8 cm

L'herbe arrive au niveau de la cheville

La mise à l'herbe (c'est à dire l'entrée sur la première parcelle à faire pâturer de l'année) doit se faire de façon précoce, avant que l'herbe n'atteigne les 8 cm de hauteur (elle arrive à la hauteur de la cheville).

La rotation doit alors se faire très rapidement, il faut avoir l'impression de « courir après l'herbe ».

Si vous attendez d'avoir une hauteur « correcte » d'herbe sur la première parcelle, vous allez vous faire dépasser par la pousse. Dès lors, vous ferez pâturer une herbe trop haute, mal valorisée par vos animaux, créer de refus et donc perdre de l'herbe produite !

Faites entrer vos animaux à 12 cm d'herbe



Une entrée optimum des animaux se fera à 10/12 cm d'herbe (l'herbe arrive à hauteur du mollet). Cette hauteur vous garantit une herbe en quantité suffisante et de qualité.

Si vous mettez les animaux dans une parcelle avec une hauteur d'herbe plus élevée, l'herbe sera de moindre qualité et mal pâturée, créant ainsi des refus et l'obligation de les broyer.

Hauteur : 12 cm

Hauteur bas du mollet

A 5 cm il faut sortir



La sortie des animaux des parcelles se fera à une hauteur de 5 cm quand l'herbe arrive au niveau du talon de la botte. Si vous faites pâturer en dessous de cette hauteur, la plante mettra plus de temps à repartir car elle devra auparavant reconstituer ses réserves.

Une hauteur inférieure à 5 cm est également critique dans la gestion du parasitisme.

Hauteur : 5 cm

Hauteur du talon



31 mars 2025
n° 5

LUNDI 31	MARDI 01	MERCREDI 02	JEUDI 03	VENDREDI 04	SAMEDI 05	DIMANCHE 06
2° / 19°	4° / 22°	6° / 19°	9° / 19°	8° / 21°	9° / 18°	10° / 17°
-	-	1 mm	1 mm	1 à 2 mm	10 à 14 mm	1 à 2 mm

Source : www.meteofrance.com - Tarbes

Données météo

données actualisées au	Altitude (m)	Précipitations (mm)		Somme de températures depuis le 1er février (°C-jour)			Mise à l'herbe bovins		Fin déprimage		ensilage-enrubanné prairies très précoces
		du 23-mars	au 30 derniers jours	2025	2024	année moy	prairies précoces	prairies tardives	prairies précoces	prairies tardives	
29-mars-25							300 °j	400 °j	500 °j	800 °j	700 °j
Ossun	360 m	19 mm	55 mm	483°	438	442	7-mars	20-mars	30-mars	25-avr	17-avr
Vic-en-Bigorre	219 m	8 mm	44 mm	493°	547	466	8-mars	20-mars	29-mars	22-avr	15-avr
Saint Lary	826 m	21 mm	124 mm	371°	327	313	19-mars	1-avr	13-avr	10-mai	2-mai
Luz St Sauveur	910 m	20 mm	125 mm	390°	418	402	17-mars	30-mars	9-avr	5-mai	27-avr
Campistrous	593 m	26 mm	59 mm	455°	444	405	8-mars	21-mars	2-avr	27-avr	19-avr
Lomné	447 m	31 mm	86 mm	432°	380	431	12-mars	25-mars	4-avr	29-avr	21-avr
Adast	446 m	19 mm	70 mm	477°	428	417	9-mars	20-mars	31-mars	26-avr	18-avr
Castelnau-Magnoac	298 m	8 mm	24 mm	484°	539	316	8-mars	20-mars	30-mars	24-avr	17-avr
Tournay	263 m	43 mm	104 mm	494°	425	471	8-mars	20-mars	29-mars	23-avr	15-avr

Estimation selon altitude depuis le 1^{er} février

A 200m	A 300m	A 400m	A 500m	A 600m	A 700m	A 800m	900m	1000m
Vic	Tarbes		Bagnères	Lannemezan		Luz		
505°jour	484°jour	468°jour	453°jour	453°jour	415°jour	398°jour	373°jour	347°jour

Repères intervention

	Mise à l'herbe	Fin déprimage
Prairie temporaire	250 °Cjour	500 °Cjour
Prairie permanente fertile et précoce	300 °Cjour	500 °Cjour
Prairie permanente plus tardive	400 °Cjour	800 °Cjour

A faire cette semaine

- Le beau temps de cette semaine va permettre la sortie des derniers troupeaux à basse altitude et devrait être profitable à la pousse de l'herbe avec l'augmentation des températures nocturnes.
- Les parcelles précoces prévues pour la fauche vont devoir être libérées rapidement pour les plus basses afin de ne pas pénaliser la production de foin.
- Si vous souhaitez évaluer la fertilité de vos prairies et anticiper leurs besoins en fertilisation, c'est le moment de réaliser des indices de nutrition (cf ci-dessous).
- Les premiers chantiers d'ensilage de prairies très précoce (type Ray Grass Italien) sont prévus pour la mi-avril cette année.

Les indices de nutrition : un outil incontournable pour piloter la fertilisation de vos prairies


Les indices de nutrition des prairies vous permettent de faire le point sur les niveaux de nutrition en azote, phosphore et potasse de vos prairies et donc de piloter au mieux la fertilisation en fonction de vos objectifs.

Les analyses d'herbe sont facilement interprétables et traduisent directement ce que les plantes sont capables de puiser dans le sol en N, P, K, ce qui n'est pas le cas pour les analyses de sol.

Les indices de nutrition permettent :

- de cibler la fertilisation au plus juste pour augmenter le potentiel de production d'une prairie,
- de faire des économies sur le poste fertilisation en faisant, en connaissance de cause, des impasses sécurisées,
- de connaître le potentiel d'une prairie récemment acquise.

La détermination des indices de nutrition se fait en laboratoire à partir d'échantillons d'herbe, grâce au dosage des éléments présents dans les graminées. Les résultats obtenus sous forme d'indices s'interprètent selon les indications ci jointes.



Et dans la pratique ?

Sur quelle prairie faire des indices de nutrition ?

Tout type de prairies

Implantées depuis minimum 2 ans

Avec moins de 25% de légumineuses (sinon il faudra retirer les légumineuses de l'échantillon)

Quand faire les indices ?

Au mois d'avril, en conditions poussantes (éviter les périodes de sécheresse ou d'excès d'eau).

Au moins 3 semaines après la sortie des animaux de la prairie.

Comment les faire ?

Pour les indices P et K, prélever à la cisaille 20 poignées d'herbe (coupées à une hauteur de 4/5 cm) dans une zone représentative de la prairie. Amener les échantillons le jour même au laboratoire ou, si ce n'est pas possible, les congeler immédiatement.

Attention, pour l'indice N il est nécessaire de connaître le rendement le jour du prélèvement. Pour cela, couper l'herbe sur une surface connue (50cm x 50cm), la peser et calculer la matière sèche. Compte tenu du protocole et du matériel nécessaire, l'intervention d'un technicien est possible.

Dans tous les cas, les échantillons doivent faire environ 500g.

Où faire faire les analyses ?

En général, tous les laboratoires agronomiques peuvent faire des indices de nutrition. L'analyse consiste à doser N, P et K contenus dans l'échantillon d'herbe et à le traduire en indices à partir de formules.

Pour quel coût ?

Une analyse comprenant les trois indices (IN, IP et IK) vous coûtera autour de 40 euros.

Pour tout complément d'information sur la pratique, ou pour vous aider à interpréter les résultats de vos analyses, n'hésitez pas à me contacter.



22/04/2025
n° 7

MARDI 22	MERCREDI 23	JEUDI 24	VENREDI 25	SAMEDI 26	DIMANCHE 27	LUNDI 28
10° / 12°	7° / 16°	10° / 19°	5° / 22°	10° / 17°	9° / 17°	9° / 22°
7 mm	1 mm	-	-	4 à 6 mm	1 à 3 mm	-

Source : www.meteofrance.com - Tarbes

Données météo

données actualisées au	Altitude (m)	Précipitations (mm)			Somme de températures depuis le 1 ^{er} février (°C-jour)			Fin déprimage		ensilage-enrubanné prairies très précoces	ensilage-enrubanné prairies précoces
		du 14-avr.	au 20-avr.	30 derniers jours	2025	2024	année moy	prairies précoces	prairies tardives	700 °j	800 °j
20-avr.-25								500 °j	800 °j		
Ossun	360 m	33 mm	71 mm		752°	644	693	30-mars	23-avr	14-avr	23-avr
Vic-en-Bigorre	219 m	31 mm	55 mm		770°	831	739	29-mars	22-avr	13-avr	22-avr
Saint Lary	826 m	66 mm	99 mm		614°	494	508	8-avr	6-mai	28-avr	6-mai
Luz St Sauveur	910 m	58 mm	99 mm		633°	573	628	7-avr	4-mai	26-avr	4-mai
Campistrous	593 m	44 mm	85 mm		709°	638	637	2-avr	26-avr	18-avr	26-avr
Lomné	447 m	60 mm	125 mm		683°	568	677	4-avr	29-avr	21-avr	29-avr
Adast	446 m	58 mm	96 mm		743°	636	629	31-mars	24-avr	16-avr	24-avr
Castelnau-Magnoac	298 m	35 mm	57 mm		751°	811	492	30-mars	23-avr	15-avr	23-avr
Tournay	263 m	41 mm	127 mm		763°	629	727	29-mars	22-avr	13-avr	22-avr

Estimation selon altitude depuis le 1^{er} février

A 200m	A 300m	A 400m	A 500m	A 600m	A 700m	A 800m	900m	1000m
Vic	Tarbes		Bagnères	Lannemezan		Luz		
777°jour	755°jour	731°jour	710°jour	707°jour	664°jour	641°jour	616°jour	590°jour

Repères intervention

	Fin déprimage	Ensilage, enrubanné, séchage en grange
Prairie temporaire	500 °Cjour	700 °Cjour
Prairie permanente fertile et précoce	500 °Cjour	800 °Cjour
Prairie permanente plus tardive	800 °Cjour	1000 °Cjour



Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGRO-ALIMENTAIRE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE

Liberté Égalité Fraternité

A faire cette semaine

- Le déprimage peut se poursuivre uniquement sur les parcelles de fauche à flore tardive de montagne.
- Coté pâturage, le premier tour de pâturage doit être terminé pour bien étêter les graminées et profiter d'une repousse feuillue de bonne qualité avec le moins de refus possible.
- Le météo rend les récoltes précoces compliquées mais en fonction des zones et si les parcelles sont portantes, il sera possible d'envisager des coupes cette semaine.
- Dans la mesure du possible (et de la météo), soyez attentifs aux stades des graminées lors de vos récoltes d'ensilage ou d'enrubannage pour assurer un fourrage de qualité.



30/04/2025
n° 8

MERCREDI 30	JEUDI 01	VENDREDI 02	SAMEDI 03	DIMANCHE 04	LUNDI 05	MARDI 06
9° / 26°	13° / 24°	12° / 27°	14° / 25°	13° / 20°	13° / 19°	9° / 17°
-	-	-	4 à 6 mm	24 à 28 mm	7 à 11 mm	1 mm

Source : www.meteofrance.com - Tarbes

Données météo

données actualisées au	Altitude (m)	Précipitations (mm)		Somme de températures depuis le 1er février (°C-jour)			Fin déprimaq	ensilage-ensrubanné	ensilage-ensrubanné	Foin de qualité
		du 22-avr.	au 30-avr.	2025	2024	année moy	prairies tardives	prairies très précoces	prairies précoces	prairies précoces
28-avr.-25			derniers jours				800 °j	700 °j	800 °j	1100 °j
Ossun	360 m	32 mm	95 mm	854°	735	795	24-avr	14-avr	24-avr	15-mai
Vic-en-Bigorre	219 m	26 mm	74 mm	877°	915	845	22-avr	13-avr	22-avr	12-mai
Saint Lary	826 m	15 mm	93 mm	701°	571	593	6-mai	27-avr	6-mai	29-mai
Luz St Sauveur	910 m	23 mm	102 mm	714°	655	715	5-mai	26-avr	5-mai	27-mai
Campistrous	593 m	27 mm	91 mm	799°	723	729	28-avr	18-avr	28-avr	19-mai
Lomné	447 m	27 mm	130 mm	779°	654	776	29-avr	21-avr	29-avr	21-mai
Adast	446 m	31 mm	107 mm	840°	724	723	24-avr	16-avr	24-avr	16-mai
Castelnau-Magnoac	298 m	45 mm	95 mm	855°	890	566	24-avr	15-avr	24-avr	15-mai
Tournay	263 m	34 mm	124 mm	869°	724	833	23-avr	13-avr	23-avr	13-mai

Estimation selon altitude depuis le 1^{er} février

A 200m	A 300m	A 400m	A 500m	A 600m	A 700m	A 800m	900m	1000m
Vic	Tarbes		Bagnères	Lannemezan		Luz		
882°jour	860°jour	829°jour	805°jour	797°jour	752°jour	724°jour	699°jour	674°jour

Repères intervention

	Fin déprimaq	Ensilage, ensrubanné, séchage en grange
Prairie temporaire	500 °Cjour	700 °Cjour
Prairie permanente fertile et précoce	500 °Cjour	800 °Cjour
Prairie permanente plus tardive	800 °Cjour	1000 °Cjour



A faire cette semaine

- Le déprimaq peut se poursuivre uniquement sur les parcelles de fauche à flore tardive au-delà de 700m d'altitude.
- Certaines coupes précoces d'ensilage ont pu se faire cette semaine sur des stades encore bons. Attention tout de même à la portance des parcelles après les cumuls de pluie des semaines passées afin de ne pas les abimer mais également pour de souiller les fourrages avec de la terre.
- Les premières coupes de foin sont à prévoir dans une quinzaine de jour à basse altitude.



06/05/2025
n° 9

MARDI 06	MERCREDI 07	JEUDI 08	VENDREDI 09	SAMEDI 10	DIMANCHE 11	LUNDI 12
8° / 14°	7° / 18°	6° / 19°	10° / 18°	10° / 22°	11° / 20°	12° / 19°
5 à 8 mm	1 mm	0 à 2 mm	3 à 4 mm	1 à 4 mm	2 à 4 mm	9 à 14 mm

Source : www.meteofrance.com - Tarbes

Données météo

données actualisées au	Altitude (m)	Précipitations (mm)		Somme de températures depuis le 1er février (°C-jour)			Fin déprima	ensilage-enrubanné	Foin de qualité
		du 28-avr.	au 4-mai	30 derniers jours	2025	2024	année moy	prairies tardives	prairies précoces
4-mai-25								800 °j	1100 °j
Ossun	360 m	15 mm	109 mm	953°	797	865	24-avr	24-avr	14-mai
Vic-en-Bigorre	219 m	32 mm	104 mm	979°	984	921	22-avr	22-avr	11-mai
Saint Lary	826 m	7 mm	97 mm	799°	620	661	4-mai	4-mai	27-mai
Luz St Sauveur	910 m	27 mm	118 mm	809°	700	787	3-mai	3-mai	26-mai
Campistrous	593 m	36 mm	126 mm	896°	781	792	28-avr	28-avr	18-mai
Lomné	447 m	47 mm	177 mm	873°	710	845	29-avr	29-avr	20-mai
Adast	446 m	14 mm	118 mm	940°	787	796	24-avr	24-avr	15-mai
Castelnau-Magnoac	298 m	27 mm	121 mm	953°	956	628	24-avr	24-avr	14-mai
Tournay	263 m	29 mm	151 mm	969°	786	917	23-avr	23-avr	13-mai

Estimation selon altitude depuis le 1^{er} février

A 200m	A 300m	A 400m	A 500m	A 600m	A 700m	A 800m	900m	1000m
Vic	Tarbes		Bagnères	Lannemezan		Luz		
982°jour	960°jour	927°jour	902°jour	895°jour	850°jour	821°jour	796°jour	771°jour

Repères intervention

	Fin déprima	Ensilage, enrubanné, séchage en grange	Foin de bonne valeur alimentaire
Prairie temporaire	500 °Cjour	800 °Cjour	1000 °Cjour
Prairie permanente fertile et précoce	500 °Cjour	900 °Cjour	1100 °Cjour
Prairie permanente plus tardive	800 °Cjour	1000 °Cjour	1200 °Cjour

A faire cette semaine

- Au-delà de 900m d'altitude le déprima doit se terminer. Il est important de libérer les surfaces prévues pour la fauche pour ne pas affecter la production.
- Passé le second tour de pâturage, il est possible de prévoir un broyage des refus. En effet, les graminées ont épié et ont pu être refusé par les troupeaux. Le broyage permettra un redémarrage uniforme de la végétation et une meilleure repousse (en quantité et qualité) uniquement feuillue. Ce broyage doit être prévu dès la sortie des animaux sans attendre que l'herbe ne repousse.
- Ce broyage permet également de gérer certaines indésirables en évitant qu'elles ne grainent (cf article ci-dessous)
- Les premières coupes de foin sont à prévoir dans une dizaine de jour à basse altitude.



Les indésirables des prairies : méthodes préventives et curatives

Plusieurs causes peuvent être à l'origine du salissement des prairies :

- les conditions climatiques (suite à une sécheresse),
- l'auto-contamination des parcelles,
- le salissement par les fourrages distribués,
- les mauvaises conditions d'exploitation.

Les « indésirables » peuvent être classées en 2 grandes catégories : celles des milieux pauvres et celles des milieux riches.

Les indésirables des milieux pauvres

Parmi les espèces gênantes, on trouve la grande marguerite, les centaurées, les rhinantes, les mousses.

Ce sont des plantes qui prennent trop d'importance quand le milieu devient sous alimenté, quand les espaces sont dégradés ou peu entretenus, quand le sol est tassé ou quand il y a surpâturage. Afin de réduire l'impact de ces plantes, il suffira de fertiliser les parcelles concernées et de gérer le pâturage pour éviter tout surpâturage.

Quand les mesures précitées sont mises en place, l'évolution favorable du couvert est rapidement observé.



Centauree

Les indésirables des milieux riches

Beaucoup plus difficiles à contenir que les indésirables des milieux pauvres, on trouve dans les milieux riches les renoncules, les chardons, les rumex...

Les renoncules sont nombreuses et presque toutes sont refusées en vert par les animaux (ce qui évite les risque d'intoxication). C'est une espèce sans intérêt fourrager à maîtriser en la fauchant avant la formation des graines. Heureusement pour les prairies fauchables, les renoncules sont consommées sans problème et sans risque de toxicité, en foin.



Les rumex

Il existe plusieurs niveaux de lutte :

- la lutte préventive qui consiste à les faucher avant l'apparition des hampes florales, à maintenir un couvert dense et fermé, à éviter les fertilisations excessives.
- Le compost (avec une montée en température de 55°) permet de détruire la majorité des graines,
- l'arrachage manuel sera efficace sur les jeunes pousses. Si la plante est installée, il faut arracher les racines sur au moins 15 cm. Dans tous les cas, les plantes enlevées devront être incinérées,
- la fauche doit être réalisée à une fréquence élevée pour arriver à épuiser les rumex (une fauche/mois pour être efficace sur les plantes de moins de 1 an),



- le pâturage : Les rumex seront consommés jeunes par les bovins, le pâturage des ovins, caprins et équins ont un effet néfaste sur leur développement.

Les chardons

Le chardon commun (ou « chardon mâle », « chardon âne ») se détruit facilement par une fauche tardive. Ce chardon se distingue à son gros capitule, souvent solitaire.

Le chardon des champs présente plusieurs capitules de petite taille, couleur lilas. C'est une plante à rhizome très difficile à détruire. Il faut épuiser la plante par des fauches répétées (une au printemps au stade floral, une autre à l'automne quand le rhizome remobilise ses réserves).

D'autres plantes peuvent être considérées comme des indésirables : les plantains, le pissenlit, alors que ce sont des espèces qui peuvent être considérées comme fourragères et peuvent être consommées tôt par les animaux.



Les fougères : indicatrices de milieux acides

La présence de fougères s'accompagne souvent d'une baisse significative de la production de la prairie, celles-ci gagnant systématiquement la compétition pour la lumière, aucune espèce prairiale n'arrive à pousser au milieu des fougères.

Comme pour la majorité des adventices la stratégie consiste à :

- Epuiser les réserves et éviter la multiplication : pour cela 2 fauches (ou broyage, ou roulage) devront être réalisées à des périodes précises :
 - **Une coupe en juillet** avant que les pieds ne produisent les spores (l'équivalent des graines pour les fougères)
 - **Une coupe en août** : les pieds coupés en juillet vont puiser sur leurs réserves pour repartir. Si cette seconde coupe n'a pas lieu, la fougère arrivera à sporer et à refaire ses réserves avant l'hiver

Des coupes ou roulage à d'autres périodes n'ont pas d'impact sur la fougère : trop tôt, elle repartira et fera son cycle entier. Trop tard, elle se sera déjà multiplié avec les spores et aura refait des réserves suffisantes pour les cycles suivants.

- La mettre dans des conditions défavorables. La fougère aime les pH acide, l'idéal pour elle se trouvant entre 3.5 et 5.5 même si elle supporte des pH plus élevés. Un chaulage en plus des coupes va permettre de la limiter et de favoriser le développement des espèces prairiales.

Attention : Le brulage des fougères les favorise ! Les spores sont alors dans des conditions optimales pour se développer alors que les espèces prairiales ont plus de mal à prendre la place.

Stratégies à mettre en place face aux indésirables

- identifier la plante en cause, se renseigner sur ses « conditions » de vie afin de la placer le plus possible dans des situations qui lui seront défavorables,
- éviter le sur comme le sous pâturage
- gérer la fertilisation azotée en fonction des besoins des plantes, la surfertilisation est toujours à éviter, apporter les doses adéquates d'engrais de ferme
- alterner fauche/pâturage quand cela est possible
- faucher les refus avant l'apparition des graines des plantes à contrôler



**CHAMBRE
D'AGRICULTURE**
HAUTES-PYRÉNÉES

Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR

**MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE**

Labellisé
Équiter
Pratiquer



12/05/2025
n° 10

LUNDI 12	MARDI 13	MERCREDI 14	JEUDI 15	VENDREDI 16	SAMEDI 17	DIMANCHE 18
10° / 18°	9° / 19°	9° / 20°	11° / 18°	13° / 20°	11° / 22°	12° / 23°
1 à 3 mm	3 mm	3 mm	2 à 5 mm	1 mm	-	-

Source : www.meteofrance.com - Tarbes

Données météo

données actualisées au	Altitude (m)	Précipitations (mm)			Somme de températures depuis le 1er février (°C-jour)			ensilage-enrubanné prairies précoces	Foin de qualité prairies précoces	Foin fibreux prairie précoce
		du 4-mai	au 10-mai	30 derniers jours	2025	2024	année moy			
10-mai-25								800 °j	1100 °j	1200 °j
Ossun	360 m	25 mm	126 mm		1025°	896	950	24-avr	15-mai	22-mai
Vic-en-Bigorre	219 m	31 mm	125 mm		1059°	1075	1014	22-avr	12-mai	18-mai
Saint Lary	826 m	28 mm	121 mm		856°	711	733	4-mai	28-mai	4-juin
Luz St Sauveur	910 m	43 mm	149 mm		862°	800	863	3-mai	27-mai	3-juin
Campistrous	593 m	47 mm	150 mm		960°	885	872	28-avr	19-mai	25-mai
Lomné	447 m	51 mm	191 mm		938°	804	930	29-avr	21-mai	27-mai
Adast	446 m	34 mm	140 mm		1007°	886	873	24-avr	16-mai	23-mai
Castelnau-Magnoac	298 m	75 mm	178 mm		1028°	1044	690	24-avr	15-mai	21-mai
Tournay	263 m	41 mm	174 mm		1042°	879	1005	23-avr	14-mai	20-mai

Estimation selon altitude depuis le 1^{er} février

A 200m	A 300m	A 400m	A 500m	A 600m	A 700m	A 800m	900m	1000m
Vic	Tarbes		Bagnères	Lannemezan		Luz		
1058°jour	1034°jour	994°jour	967°jour	958°jour	910°jour	876°jour	851°jour	826°jour

Repères intervention

	Ensilage, enrubanné, séchage en grange	Foin de bonne valeur alimentaire	Foin fibreux
Prairie temporaire	800 °Cjour	1000 °Cjour	1200 °Cjour
Prairie permanente fertile et précoce	900 °Cjour	1100 °Cjour	1300 °Cjour
Prairie permanente plus tardive	1000 °Cjour	1200 °Cjour	1600 °Cjour

A faire cette semaine

- Le froid et les précipitations importantes (variables en fonction des secteurs) de la dernière semaine ont ralenti la pousse de l'herbe. Attention à gérer les prairies au mieux pour éviter de les abîmer et ne pas entamer leur potentiel productif (cf ci-dessous).
- Les premières coupes de foin vont pouvoir se faire dès que les conditions météo le permettront sur les parcelles de prairie fertiles de basse altitude (< 450m). Soyez prêts à profiter des prochains créneaux.



Préserver ses prairies par temps de pluie

Les pluies qui tombent actuellement font craindre des problèmes de piétinement.

S'il est vrai que certaines prairies peuvent être particulièrement sensibles au piétinement, il est rare que ce soit le cas de toutes les prairies d'une exploitation.

Des alternatives existent :

- **Sacrifier une partie d'une prairie** pour y mettre les animaux quand les conditions se dégradent vraiment (prairie qui se trouve à un endroit central par rapport au circuit de pâturage des animaux). L'herbe actuelle étant très riche en azote, n'hésitez pas à compléter avec du fourrage sec (foin ou paille selon disponibilité).
- **Jouer sur le chargement** en augmentant les surfaces proposées au pâturage : donner accès à plusieurs prairies en même temps, ce qui n'est pas gênant en début de saison, ou diminuer le nombre d'animaux (en ne mettant à l'herbe qu'un lot),
- Surveiller la météo pour anticiper les pluies et amener les animaux sur une prairie plus portante, voir **les rentrer momentanément dans les bâtiments** si les stocks fourragers restant sont suffisants.



Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR

 **MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGRO-ALIMENTAIRE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



19/05/2025
n° 11

LUNDI 19	MARDI 20	MERCREDI 21	JEUDI 22	VENDREDI 23	SAMEDI 24	DIMANCHE 25
13° / 20° 3 à 11 mm	13° / 19° 2 à 3 mm	10° / 20° -	11° / 18° 6 à 7 mm	11° / 18° 8 mm	11° / 20° 0 à 1 mm	11° / 22° -

Source : www.meteofrance.com - Tarbes

Données météo

données actualisées au	Altitude (m)	Précipitations (mm)			Somme de températures depuis le 1er février (°C-jour)			ensilage-enrubanné prairies précoces	Foin de qualité prairies précoces	Foin fibreux prairie précoce
		11-mai	17-mai	30 derniers jours	2025	2024	année moy			
17-mai-25								800 °j	1100 °j	1200 °j
Ossun	360 m	24 mm	112 mm	1126°	990	1045		24-avr	15-mai	22-mai
Vic-en-Bigorre	219 m	19 mm	113 mm	1167°	1182	1116		22-avr	12-mai	18-mai
Saint Lary	826 m	11 mm	81 mm	943°	795	820		4-mai	28-mai	4-juin
Luz St Sauveur	910 m	16 mm	125 mm	942°	884	952		3-mai	28-mai	3-juin
Campistrous	593 m	44 mm	148 mm	1051°	975	959		28-avr	20-mai	26-mai
Lomné	447 m	10 mm	125 mm	1030°	891	1024		29-avr	21-mai	28-mai
Adast	446 m	10 mm	105 mm	1103°	978	966		24-avr	16-mai	23-mai
Castelnau-Magnoac	298 m	6 mm	153 mm	1133°	1147	767		24-avr	14-mai	21-mai
Tournay	263 m	20 mm	129 mm	1148°	974	1106		23-avr	13-mai	20-mai

Estimation selon altitude depuis le 1^{er} février

A 200m	A 300m	A 400m	A 500m	A 600m	A 700m	A 800m	900m	1000m
Vic	Tarbes		Bagnères	Lannemezan		Luz		
1165°jour	1140°jour	1090°jour	1060°jour	1049°jour	999°jour	959°jour	934°jour	909°jour

Repères intervention

	Ensilage, enrubanné, séchage en grange	Foin de bonne valeur alimentaire	Foin fibreux
Prairie temporaire	800 °Cjour	1000 °Cjour	1200 °Cjour
Prairie permanente fertile et précoce	900 °Cjour	1100 °Cjour	1300 °Cjour
Prairie permanente plus tardive	1000 °Cjour	1200 °Cjour	1600 °Cjour

A faire cette semaine

- Les chantiers de récoltes sont perturbés par des pluies quasi journalières alors qu'on a atteint le stade optimal de fauche sur les secteurs de basse altitude.
- N'hésitez pas à faucher dès que le temps le permet quitte à privilégier l'enrubannage si le créneau est trop court.
- Avec l'épiaison rapide des graminées, les refus sont parfois importants au pâturage. N'hésitez pas à broyer dès la sortie des animaux afin que l'herbe redémarre rapidement. Vous pouvez également pratiquer le « topping » en fauchant avant que le troupeau n'entre sur la parcelle. L'herbe haute sera mieux consommée et la parcelle sera propre pour la pousse suivante. Attention toutefois, ceci est déconseillé s'il y a trop de quantités et doit rester exceptionnel au vu du cout du travail.

La flore de vos prairies

Sur l'ensemble des espèces composant vos prairies, vous n'en connaissez parfois qu'une toute petite partie. Une prairie contient entre 2-3 espèces pour les PT et 40 espèces pour les PP. Cette connaissance est importante car elle permet souvent d'orienter son utilisation.

L'INRA a classé les graminées en 3 grands types selon la précocité :

Type A : Espèces très précoces et productives

Intérêts :

- Rendements importants
- Bonne valeur fourragère si récolté au bon stade

Contraintes :

- Demande une utilisation précoce
- Peu de flexibilité d'utilisation (la valeur alimentaire baisse très vite si on la fauche trop tardivement)



RGA

Houlque Laineuse


Type B : Espèces précoces



Fétuque
Elevée



Pâturin Commun



Flouve Odorante



Dactyle


Intérêts :

- Fauche ou pacage
- Bonne valeur fourragère
- Plus de flexibilité d'utilisation que les espèces de type A

Type b : Espèces productives et tardives

Plus tardif que les B mais aussi productif.

Meilleure flexibilité d'utilisation



Fléole



Triseté



Pâturin des prés

Type C : Espèces tardives et peu productives

Intérêts :

- Fauche ou pâturage tardif
- Très grande flexibilité d'utilisation car
- beaucoup d'espèces

Contraintes :

- Rendement et valeur alimentaire souvent plus faible



Fétuque Rouge



Agrostis Fin

En fonction des types d'espèces prédominantes, les dates des stades optimum d'utilisation ne sont pas les mêmes :

	Limite déprimage	Epiaison	Floraison
Type A	500°jour	700°jour	900°jour
Type B	600°jour	1000°jour	1200°jour
Type b	10000°jour	1400 °jour	1600°jour
Type C	900°jour	1100°jour	1300°jour



**CHAMBRE
D'AGRICULTURE**
HAUTES-PYRÉNÉES

Avec
la contribution
financière du compte
d'affectation spéciale
développement
agricole et rural
CASDAR



**MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE**

Liberté
Égalité
Fraternité



26/05/2025
n° 12

LUNDI 26	MARDI 27	MERCREDI 28	JEUDI 29	VENDREDI 30	SAMEDI 31	DIMANCHE 01
14° / 19°	10° / 24°	12° / 27°	12° / 29°	16° / 30°	18° / 26°	15° / 21°
-	-	-	-	-	5 à 7 mm	2 à 18 mm

Source : www.meteofrance.com - Tarbes

Données météo

données actualisées au	Altitude (m)	Précipitations (mm)			Somme de températures depuis le 1er février (°C-jour)			Foin de qualité prairies précoces	Foin fibreux prairie précoce	Foin de qualité prairies tardives
		du 18-mai	au 24-mai	30 derniers jours	2025	2024	année moy	1100 °j	1200 °j	1500 °j
24-mai-25										
Ossun	360 m	26 mm	111 mm	1231°	1054	1145		15-mai	21-mai	8-juin
Vic-en-Bigorre	219 m	38 mm	129 mm	1278°	1281	1220		12-mai	18-mai	5-juin
Saint Lary	826 m	23 mm	77 mm	1034°	845	913		28-mai	4-juin	22-juin
Luz St Sauveur	910 m	25 mm	119 mm	1027°	935	1046		29-mai	4-juin	22-juin
Campistrous	593 m	25 mm	150 mm	1147°	1029	1050		20-mai	27-mai	13-juin
Lomné	447 m	24 mm	117 mm	1132°	949	1122		21-mai	28-mai	14-juin
Adast	446 m	36 mm	113 mm	1206°	1038	1064		16-mai	23-mai	10-juin
Castelnau-Magnoac	298 m	32 mm	160 mm	1241°	1242	851		14-mai	21-mai	8-juin
Tournay	263 m	20 mm	119 mm	1258°	1041	1213		13-mai	20-mai	7-juin

Estimation selon altitude depuis le 1^{er} février

A 200m	A 300m	A 400m	A 500m	A 600m	A 700m	A 800m	900m	1000m
Vic	Tarbes		Bagnères	Lannemezan		Luz		
1274°jour	1248°jour	1194°jour	1160°jour	1145°jour	1093°jour	1047°jour	1022°jour	997°jour

Repères intervention

	Ensilage, enrubanné, séchage en grange	Foin de bonne valeur alimentaire	Foin fibreux
Prairie temporaire	800 °Cjour	1000 °Cjour	1200 °Cjour
Prairie permanente fertile et précoce	900 °Cjour	1100 °Cjour	1300 °Cjour
Prairie permanente plus tardive	1000 °Cjour	1200 °Cjour	1600 °Cjour

A faire cette semaine

- Le stade optimal de fauche pour les prairies permanentes fertiles et précoces est atteint au dessous de 700m. Un créneau de beau temps pourra être utilisé cette semaine pour avancer les récoltes, y compris en sec au vu des températures prévues.
- Avec l'épiaison des graminées, les refus sont importants dans les prairies pâturées. N'hésitez pas à passer un coup de faucheuse dès la sortie des aniamux tant que celle-ci est attelée. En effet, la faucheuse abime moins l'herbe que le broyeur, elle repartira donc mieux pour la pousse suivante.
- Si la hauteur d'herbe d'une parcelle est trop haute vous pouvez également la sauter et la faucher entièrement. Elle rentrera de nouveau dans le circuit de pâturage fin juin.



Faire du bon foin : des étapes clés pour un aliment de qualité

Obtenir de bons foins nécessite de respecter certaines règles. :

- **La fauche**

Comme pour les autres types de récolte, il faut rechercher un compromis entre quantité et qualité. Dès que la météo s'annonce favorable pour quelques jours (4 à 5 jours), il faut démarrer les fauches, en attendant que la rosée soit bien levée, et les sucres sont à un bon niveau (fin de matinée ou tout début d'après-midi). Eviter de faucher le soir ou par temps humide car l'herbe continue à respirer (et donc consommer des sucres), tant que la plante n'a pas atteint 35% de MS. Il faut qu'elle sèche le plus vite possible après la fauche.

N'hésitez pas à faucher haut (6-7 cm) pour favoriser l'aération des andains et le démarrage de la future repousse.

Faucher à une vitesse raisonnable de 8 à 10 km/h. L'augmentation de la vitesse a un effet négatif sur la qualité du travail.



- **Le fanage**

Il est conseillé de faner rapidement après la fauche. *"Un hectare de foin avec un rendement de 5 tonnes de matière sèche doit évacuer près de 20 tonnes d'eau pour passer de 15-20% à 80-85% de MS".*

Pour faner de manière efficace et minimiser les pertes il faut éviter de faner trop fréquemment et de manière trop agressive. Le second fanage aura lieu le même jour, puis matin et soir les jours suivants. La vitesse de travail ne devrait pas dépasser 5 à 7 km/h.

En présence de légumineuses faner tôt le matin et tard le soir avec l'humidité.

- **L'andainage**

Il permet de finir de sécher le foin et de le rassembler avant le pressage.

Les andains de forme larges et aplaties profiteront mieux du rayonnement solaire. Par contre, les andains étroits et hauts permettent une meilleure aération du fourrage. Aujourd'hui les retourneurs d'andains présents sur le marché remplacent la faneuse et l'andaineur, ce qui paraît efficace pour des fourrages à base de légumineuses (moins de manipulation). Deux à trois passages sont toutefois nécessaires pour que le foin soit suffisamment sec.

De manière générale les andains devront être le plus régulier possible pour la confection des bottes.

- **Le pressage**

A faire quand le foin à plus de 80% de MS (foin cassant). Sinon, le foin chauffe et sa valeur alimentaire chute. Le pressage s'effectuera au moins une heure après l'andainage pour finir le séchage. Les bottes rondes peuvent rester une vingtaine de jours au champ avant stockage pour éviter les risques d'échauffement..

Veiller à obtenir un pressage homogène et sans tassement excessif.

Le liage peut s'effectuer avec de la ficelle (le plus économique mais chantier moins performant) ou du filet (rendement de la presse supérieur, plus facile à enlever, mais coût supérieur). Si votre foin n'a pas été réalisé dans de bonnes conditions (humidité excessive) il est prudent de mesurer la température au cœur de quelques balles avant leur stockage dans la grange: une température jusqu'à 45°C est normale, au-delà de 60°C il y a de très forts risques d'incendies.

- **Le stockage**

L'empilement des balles doit se faire sur une surface plane après l'avoir couverte d'une bâche plastique ou de palettes. Attention à bien les empiler pour éviter les risques de chutes des balles.



11/06/2025
n° 14

MERCREDI 11	JEUDI 12	VENDREDI 13	SAMEDI 14	DIMANCHE 15	LUNDI 16	MARDI 17
21° / 36°	20° / 32°	18° / 30°	18° / 24°	17° / 24°	16° / 26°	15° / 27°
2 mm	-	1 à 3 mm	1 à 3 mm	2 à 7 mm	0 à 1 mm	0 à 2 mm

Source : www.meteofrance.com - Tarbes

Données météo

données actualisées au	Altitude (m)	Précipitations (mm)			Somme de températures depuis le 1 ^{er} février (°C-jour)			Foin de qualité prairies précoces	Foin fibreux prairie précoce	Foin de qualité prairies tardives	Foin fibreux prairie tardive
		du 3-juin	au 9-juin	30 derniers jours	2025	2024	année moy	1100 °j	1200 °j	1500 °j	1600 °j
9-juin-25											
Ossun	360 m	17 mm	97 mm	1501°	1235	1402		15-mai	21-mai	8-juin	14-juin
Vic-en-Bigorre	219 m	7 mm	86 mm	1557°	1552	1485		12-mai	18-mai	5-juin	11-juin
Saint Lary	826 m	16 mm	93 mm	1291°	994	1146		28-mai	3-juin	21-juin	27-juin
Luz St Sauveur	910 m	13 mm	89 mm	1272°	1070	1288		28-mai	4-juin	22-juin	27-juin
Campistrous	593 m	20 mm	132 mm	1398°	1187	1291		20-mai	27-mai	14-juin	20-juin
Lomné	447 m	26 mm	103 mm	1392°	1114	1375		21-mai	28-mai	15-juin	20-juin
Adast	446 m	7 mm	88 mm	1477°	1219	1312		16-mai	23-mai	10-juin	15-juin
Castelnau-Magnoac	298 m	20 mm	89 mm	1516°	1507	1057		14-mai	21-mai	8-juin	13-juin
Tournay	263 m	19 mm	95 mm	1534°	1230	1490		13-mai	20-mai	7-juin	12-juin

Estimation selon altitude depuis le 1^{er} février

A 200m	A 300m	A 400m	A 500m	A 600m	A 700m	A 800m	900m	1000m
Vic	Tarbes		Bagnères	Lannemezan		Luz		
1551°jour	1523°jour	1461°jour	1421°jour	1397°jour	1347°jour	1299°jour	1273°jour	1248°jour

Repères intervention

	Ensilage, enrubanné, séchage en grange	Foin de bonne valeur alimentaire	Foin fibreux
Prairie temporaire	800 °Cjour	1000 °Cjour	1200 °Cjour
Prairie permanente fertile et précoce	900 °Cjour	1100 °Cjour	1300 °Cjour
Prairie permanente plus tardive	1000 °Cjour	1200 °Cjour	1600 °Cjour

A faire cette semaine


- Le stade optimal de fauche pour les prairies permanentes fertiles a été dépassé sur la partie basse du département. Les foin déjà fait ont été de bonne qualité mais celle-ci décroît avec la floraison (cf article ci-dessous).
- En altitude, les stades de fauche sont également atteints pour les prairies permanentes précoces. Les prairies à flore plus tardive peuvent attendre encore un peu mais seront à faucher rapidement.
- Sur les prairies pâturées, continuez à gérer les refus pour favoriser les repousses.



Date de fauche et qualité des fourrages

La précocité d'une fauche influe pour une part importante sur la qualité du fourrage récolté, bien plus que les espèces présentes.

En effet, au fur et à mesure que l'herbe « mûrit », sa valeur alimentaire (énergie et azote) diminue :



Ramené à l'hectare, il y a un maximum de valeur alimentaire au moment de l'épisaison. Attention, ce maximum n'intervient pas au même moment selon le type de prairie.

On note également que la valeur alimentaire récoltée à l'hectare diminue rapidement surtout sur les prairies précoces et fertiles.

L'apport d'une fertilisation azotée rend les prairies encore d'avantage précoces. Dans ce cas il faut donc être encore plus vigilant sur la date de fauche car si on intervient trop tard, la valeur alimentaire chute très rapidement et l'effet de l'apport minéral est perdu.

Faucher tôt c'est privilégier un foin de qualité pour une meilleure production de vos animaux (lait et viande).

Faucher tard c'est obtenir un fourrage grossier, bon pour la rumination mais qui doit être complémenté d'avantage (coût important).



24/06/2023

n° 15

 19° / 34°
2 mm

 20° / 30°
2 à 4 mm

 18° / 26°
-

 17° / 30°
-

 18° / 33°
-

 19° / 34°
-

 21° / 35°
-

Source : www.meteofrance.com - Tarbes

Données météo

données actualisées au	Altitude (m)	Précipitations (mm)		Somme de températures depuis le 1er février (°C-jour)			Foin de qualité prairies précoces	Foin fibreux prairie précoce	Foin de qualité prairies tardives	Foin fibreux prairie tardive
		du 16-juin	au 22-juin	30 derniers jours	2025	2024				
22-juin-25							1100 °j	1200 °j	1500 °j	1600 °j
Ossun	360 m	1 mm	57 mm	1734°	1421	1619	15-mai	21-mai	8-juin	14-juin
Vic-en-Bigorre	219 m	1 mm	48 mm	1791°	1773	1708	12-mai	18-mai	5-juin	11-juin
Saint Lary	826 m	8 mm	89 mm	1521°	1152	1362	28-mai	3-juin	20-juin	26-juin
Luz St Sauveur	910 m	2 mm	62 mm	1500°	1224	0	28-mai	4-juin	22-juin	27-juin
Campistrous	593 m	1 mm	70 mm	1629°	1357	1496	20-mai	27-mai	14-juin	20-juin
Lomné	447 m	2 mm	80 mm	1624°	1286	1590	21-mai	28-mai	15-juin	20-juin
Adast	446 m	2 mm	53 mm	1710°	1395	1521	16-mai	23-mai	10-juin	15-juin
Castelnau-Magnoac	298 m	1 mm	58 mm	1750°	1722	1243	14-mai	21-mai	8-juin	13-juin
Tournay	263 m	0 mm	57 mm	1767°	1420	1724	13-mai	20-mai	7-juin	12-juin

Estimation selon altitude depuis le 1^{er} février

A 200m	A 300m	A 400m	A 500m	A 600m	A 700m	A 800m	900m	1000m
Vic	Tarbes		Bagnères	Lannemezan		Luz		
1784°jour	1756°jour	1693°jour	1653°jour	1627°jour	1577°jour	1528°jour	1503°jour	1477°jour

Repères intervention

	Ensilage, enrubanné, séchage en grange	Foin de bonne valeur alimentaire	Foin fibreux
Prairie temporaire	800 °Cjour	1000 °Cjour	1200 °Cjour
Prairie permanente fertile et précoce	900 °Cjour	1100 °Cjour	1300 °Cjour
Prairie permanente plus tardive	1000 °Cjour	1200 °Cjour	1600 °Cjour

A faire cette semaine

- La belle période que nous venons d'avoir a été idéale pour réaliser des fourrages secs. Beaucoup ont pu finir les foin.
- Pour les fourrages qui ne sont pas encore coupés, le stade optimal de fauche est maintenant dépassé pour l'ensemble des prairies, y compris les prairies à flore tardive. Ces foin qui restent à faire devront être réservés aux animaux à faibles besoins ou complémentés.
- Le manque d'eau commence à se faire sentir dans certains secteurs et avec les fortes chaleurs la pousse de l'herbe est ralentie ce qui va compliquer la gestion du pâturage. Attention à ne pas faire surpâturer les animaux. En cas de manque d'herbe il vaut mieux les parquer dans une partie de parcelle ou au bâtiment et les affourager en attendant que l'herbe ai suffisamment repoussé.

Gérer le pâturage d'été

Si la principale préoccupation du pâturage au printemps est de valoriser toute l'herbe produite, l'enjeu des autres périodes de pâture est de gérer des repousses plus faibles sans compromettre le potentiel de production ultérieure...

Les règles à respecter

Les bases du pâturage tournant sont les mêmes, quelle que soit la période de l'année :

- les animaux doivent rester moins de 6 jours sur une parcelle,
- il faut respecter un temps de repos de la parcelle avant le retour des animaux.

Si les temps de séjour restent inchangés toute l'année, les temps de retour doivent être allongés quand les conditions deviennent moins poussantes en été, voire en automne. En général, cet allongement est permis grâce à l'introduction des prairies initialement fauchées.

*Temps de repos : minimum
30 jours à allonger l'été en
fonction des conditions
climatiques*



Le temps de repos des prairies est défini par la hauteur d'herbe. Dans tous les cas, les animaux ne doivent pas pâturer en dessous de 5cm.

*Laisser une hauteur d'herbe
suffisante protège les plantes des
fortes chaleurs.*

*Un pacage trop ras empêche les
plantes de reconstituer leurs réserves
ce qui pénalise la repousse.*

Quand l'herbe vient à manquer :

Si l'herbe ne pousse plus, l'idéal est de prévoir une parcelle « sacrifiée » pour l'affouragement des animaux ou leur retour en bâtiment.

Il est contreproductif de faire tourner rapidement des animaux ou d'agrandir les parcs quand plus rien ne pousse.

De telles pratiques pénalisent grandement la repousse et les performances des animaux.



Avec la contribution
financière du compte
d'affectation spéciale
développement
agricole et rural
CASDAR

 **CHAMBRE
D'AGRICULTURE
HAUTES-PYRÉNÉES**

**MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*