




POINT FOURRAGES



Calendrier fourrager



Conseil collectif à destination des éleveurs de la Nièvre

Des conseillers à votre écoute

Contact bureau Nevers
03 86 93 40 60
elevage@nievre.chambagri.fr



PROagri
POUR VOUS. AUJOURD'HUI. ET DEMAIN

Avec le soutien financier de :

RÉGION
BOURGOGNE
FRANCHE
COMTE

Avec la contribution
financière du compte
d'affectation spéciale
développement
agricole et rural
CASDAR



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE



Agro – Météo

Beau temps annoncé, ray-grass prêt à ensiler

Après une offensive hivernale et de nombreuses gelées matinales, le redoux est annoncé pour la fin de cette semaine. Les conditions vont permettre de réaliser des chantiers de récolte dans de bonnes conditions. La fauche des ray-grass au stade début épiaison permet de conserver un maximum de valeur alimentaire.



Ray-grass italien semé en septembre 2025 : on remarque les traces de gel sur les feuilles. (photo CA 58 le 31 mars 2026)

La mise à l'herbe va pouvoir se terminer dans la majorité du département et démarrer dans les zones les plus tardives du Morvan, notamment en déprimant les parcelles de fauche les plus précoces. Ailleurs, le déprimage doit se terminer pour ne pas pénaliser le rendement en foin des parcelles. Un apport d'une trentaine d'unités d'azote après le retrait des animaux va permettre de dynamiser la repousse.



Si c'est du stade phénologique de la plante que dépend la valeur alimentaire du fourrage, ce sont des bonnes pratiques au moment de la récolte et de la conservation de l'ensilage que dépendent l'appétence et la qualité du fourrage conservé.

Conditions météo : s'assurer de minimum trois jours sans précipitations avant de faucher afin d'atteindre une teneur en matière sèche du fourrage suffisante au moment de l'ensilage (viser 30% pour les graminées et au moins 35 voire 40% pour les légumineuses et les méteils). En cas de teneur en matière sèche insuffisante, l'ajout d'un conservateur est souhaitable pour éviter les pertes.

Fauche et récolte : ne pas faucher trop ras (pas en dessous de 7 cm) pour permettre une bonne ventilation de l'andain et une reprise plus propre (bien régler la hauteur du pick up qui ne doit pas racler le sol pour éviter l'incorporation de terre). Une fauche dans l'après-midi optimisera la teneur en sucres du fourrage. Des andains larges favoriseront la dessiccation rapide des plantes et l'homogénéité du fourrage. La coupe doit être suffisamment fine : 4 à 6 cm de long (en cas de distribution avec une mélangeuse, on peut se permettre des brins autour de 8 cm).

Confection du silo : soigner la confection du tas par un tassage important pour accélérer le processus d'acidification et limiter les reprises en fermentation lors de l'ouverture du silo. C'est la capacité de tassage au silo qui doit déterminer l'avancement du chantier d'ensilage. Idéalement, il faut prévoir deux personnes au silo : une pour répartir le fourrage de manière uniforme sur le tas et une pour tasser. Plus les volumes apportés sont conséquents, plus le tracteur doit être lourd.

Une fermeture rapide et hermétique du silo est indispensable : tant que le silo n'est pas fermé, les brins continuent de respirer et le fourrage s'appauvrit. Le temps de confection du silo ne doit pas dépasser 1,5 jour. Pour la fermeture, il faut dans un premier temps disposer sur le côté des films qu'on rabat ensuite sur le tas avant de couvrir ensuite avec une bâche de bonne qualité. L'utilisation de sacs de lestage rempli de sable sur les contours du silo et disposés dans le sens de la largeur tous les 3 mètres vont permettre un lestage suffisant de la bâche.



L'emploi d'une faucheuse conditionneuse va permettre d'accélérer la perte en eau du fourrage. Son utilisation est à réserver aux fourrages riches en graminées car elles abiment les légumineuses (perte de feuilles (photo CA58)



La qualité du tassage est primordiale : mieux vaut faire attendre une remorque au silo plutôt que d'aller vite et de se retrouver avec des pertes lors de l'ouverture (photo CA58)