




POINT FOURRAGES



Calendrier fourrager



Conseil collectif à destination des éleveurs de la Nièvre

Des conseillers à votre écoute

Contact bureau Nevers
03 86 93 40 60
elevage@nievre.chambagri.fr



PROagri
POUR VOUS. AUJOURD'HUI. ET DEMAIN

Avec le soutien financier de :

RÉGION
BOURGOGNE
FRANCHE
COMTE

Avec la contribution
financière du compte
d'affectation spéciale
développement
agricole et rural
CASDAR

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE



Agro – Météo

Les températures font le grand écart


Après les gelées matinales, parfois fortes, rencontrées la semaine dernière, ce sont des maintenant des conditions quasi estivales sur le département. Conséquence de ce réchauffement soudain, les cumuls des températures font un bond en avant et les 600°C base 1^{er} février sont atteints dans le sud du département? Les stades végétatifs évoluent rapidement, les plantes s'allongent et les épis montent dans les gaines des graminées. La mise à l'herbe et les premiers chantiers d'ensilage ont lieu dans des conditions idéales.

La semaine prochaine devrait voir le retour de quelques précipitations qui devraient être bénéfiques pour dynamiser une production d'herbe à la peine dans de nombreuses parcelles.



Ne pas surpâturer pour conserver une production d'herbe dynamique

En cas de pousse d'herbe à la peine, la gestion du pâturage se complique lorsque le chargement de printemps est important. Dans ces situations, attention à ne pas surpâturer. Une graminée est surpâturée si la hauteur d'herbe en sortie de parcelle est inférieure à 3 cm. Dans ce cas, la plante dispose de moins de réserves et développe moins de racines pour aller capter l'eau et les nutriments qui se trouvent en profondeur dans le sol. Les conséquences sont un redémarrage plus lent et un développement des espèces rampante et envahissantes au détriment des bonnes graminées. Pour éviter ce phénomène, mieux vaut arrêter le pâturage tournant jours en bloquant les animaux sur une parcelle et en les affourrageant en attendant une reprise de pousse plus soutenue.



Après une exploitation, la croissance est lente et se fait à partir des réserves des feuilles. Cette phase sera d'autant plus longue que la prairie aura été exploitée ras (source : la productivité de l'herbe, André Voisin, 1957)



Ovins : surveiller la présence de ténia

Les agneaux sont sensibles aux infestations par le ténia. Un déparasitage est à prévoir 6 semaines après la mise à l'herbe. Ce traitement peut avoir lieu plus tôt en cas de présence d'anneaux de ténia dans les fécès.



La présence de ténia dans les fécès est facilement identifiable (photo CA 58).