

20 ans de pousse de l'herbe printanière en Normandie

1 observatoire - 5 départements - 30 sites

9 865 observations sur 20 ans

Trois types d'années : froide et humide (bleu), moyenne (vert), chaude et sèche (rouge)

Un effet significatif du type d'année sur le rendement printanier, avec une variabilité interannuelle





Figure 19 - Rendements printaniers en herbe de 2003 à 2023

Les lettres a, b et c mettent en avant les différences qui existent entre les variables. Lorsque les lettres entre deux entités sont différentes, cela signifie que la différence entre ces données est significative




**A l'échelle de
la Normandie,
une année
2025 en retard**

Résultats basés sur
l'Observatoire de la
Croissance de l'Herbe


20 ans de pousse de l'herbe printanière en Normandie

Exemple de résultats sur une exploitation :




La pousse de l'herbe est variable et dépend des conditions climatiques de l'année, du type de sol, de la conduite de la prairie... Chaque année est différente !

La gestion de l'herbe demande du temps d'observation, **il faut adapter les décisions selon la pousse**



Valorisation du pâturage : **335,2 T MS** (120 VL sur la période du 13/03/2020 au 26/10/2020) soit un rendement moyen sur la surface de pâturage de 10,6 T MS

	Bergerie	Manche	Normandie
Printemps	5,6	6	5,2
Eté	1,8	1,9	-
Automne	1,8	1,7	1,2
Total avec l'été	9,2	9,6	-
Total sans l'été	7,4	7,7	6,4



Valorisation du pâturage : **265,7 T MS** (130 VL sur la période du 10/03/2023 au 03/11/2023 avec une coupe du 07/07 au 01/09) soit un rendement moyen sur la surface de pâturage de 8,4 T MS

	Bergerie	Manche	Normandie
Printemps	4,7	5,5	6,1
Eté	-	2,6	2,9
Automne	2,1	2,5	2,1
Total avec l'été	-	10,6	11,1
Total sans l'été	6,8	8	8,2

La gestion du pâturage doit permettre un bon compromis entre l'ingestion de la vache et le rendement valorisé de la prairie.

« La pousse de l'herbe n'est pas facile à gérer. L'herbomètre est un outil intéressant pour prendre des décisions rapidement. On a la croissance, les hauteurs d'herbe entrée/ sortie mais aussi les jours d'avance au pâturage »