

Gestion des rumex et chardons dans les prairies installées




1- Actions Préventives

Favoriser la bonne flore

Maîtriser la conduite du pâturage :

Eviter le sous et surpâturage

- ✓ Équilibrer les quantités entre la ration et le pâturage
- ✓ Respecter les temps de repos entre 2 pâturages
- ✓ Maîtriser les hauteurs de l'herbe en entrée et sortie de paddock



Surpâturage

Limiter le compactage et l'asphyxie du sol

- ✓ Attention au piétinement excessif !

Utiliser la fauche pour maîtriser le développement :

- ✓ Alternier fauche et pâturage
- ✓ Rattraper un pâturage tardif avec le Topping*
- ✓ Faucher les refus avant montée en graines

Nourrir sa prairie :

- ✓ Équilibrer la fertilisation
- ✓ Entretenir le pH

Limiter les contaminations extérieures

2- Actions Curatives

Réduire l'infestation



Epuiser les organes de réserve par des fauches répétées !



Adapter les hauteurs (>7 cm) et les rythmes de fauche pour ne pas pénaliser la prairie

Boutons floraux



M. Moquet


Stade cigare



INRAE



Dernier recours : désherber chimiquement



Bien positionner ses interventions :


		HIVER			PRINTEMPS			ETE			AUTOMNE		
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Rumex				Rosette		Cigare							
							1 fois/mois						
Chardon		Aucune solution sélective du trèfle			6-8 F		Boutons floraux						
							3-4 fois/an						

*fauche avant pâturage


Sur graminées + légumineuses = application localisée obligatoire

Biologie des vivaces les plus fréquentes dans les prairies : le rumex et le chardon

Le rumex : une vivace « accidentelle »



Reproduction végétative




Fragmentation du collet :


Le **collet (4 à 8cm)** contient les **bourgeons végétatifs**, capables de former de nouvelles pousses en cas de cassure au niveau du collet. Un morceau de 0.5cm suffit !

Le **reste de la racine** ne peut pas produire de nouvelles pousses.

Le chardon des champs : une vivace « vraie »



Evolution des réserves racinaires du chardon au cours de l'année :



★ **Point de compensation** : La photosynthèse permet de reconstituer les réserves racinaires