




POINT FOURRAGES



Calendrier fourrager



Conseil collectif à destination des éleveurs de la Nièvre

Des conseillers à votre écoute

Contact bureau Nevers
03 86 93 40 60
elevage@nievre.chambagri.fr



PROagri
POUR VOUS. AUJOURD'HUI. ET DEMAIN

Avec le soutien financier de :

RÉGION
BOURGOGNE
FRANCHE
COMTE

Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE



Agro – Météo

De bonnes conditions pour les récoltes, moins pour la pousse

La météo du mois d'avril aura été marquée par l'absence de pluie (entre 2 et 25 mm de précipitations selon les stations recensées sur le département), des gelées matinales fréquentes et des après-midi ventés et ensoleillés. Conséquence : la pousse d'herbe est au ralenti depuis plusieurs semaines et surtout, elle est inférieure à la consommation des animaux. Les orages annoncés pour la semaine prochaine devraient être salvateurs pour redonner un peu de souplesse. Autre source d'inquiétude, certains ruisseaux ne coulent déjà plus et des lots pâturent en bord de cours d'eau doivent déjà être abreuvés par l'adduction.

Concernant les parcelles de fauche, une grande partie des prairies temporaires, luzernes et méteils est maintenant récoltée. Si la valeur alimentaire devrait être au rendez-vous grâce à des fauches réalisées au bon stade et dans de bonnes conditions, les rendements sont en revanche décevants, pénalisés par la météo des dernières semaines. Les orages seront là aussi bienvenus pour espérer des secondes coupes avec des rendements permettant de compenser les manques constatés en première coupe.




Pâturage : s'adapter au manque d'herbe

Dans certaines situations, l'herbe vient déjà à manquer. Plusieurs leviers d'adaptation sont alors possibles :

- Bloquer les animaux dans une parcelle en les affourageant en attendant la reprise de pousse
- Allonger le temps de retour en intégrant des surfaces de fauche dans le circuit de pâturage
- Si de la pluie est annoncée, un léger apport d'azote (une trentaine d'unités) va permettre d'accélérer la repousse après le passage des animaux

Dans tous les cas, attention à ne pas faire manger trop ras : en cas de pâturage trop ras, la plante va puiser dans ses réserves pour refaire de la biomasse aérienne, au détriment des racines → diminution de la capacité de la plante à capter eau et nutriments en profondeur et donc baisse de la productivité des bonnes graminées au profit des plantes moins intéressantes.



Conséquences d'un pâturage trop ras sur les graminées (source AgroLeague)



Dans les sols superficiels, les graminées peinent à repartir après un pâturage (photo CA 58, 27 avril 2026)



De nombreuses mares sont déjà asséchées (photo CA 58, 27 avril 2026)