




POINT FOURRAGES



Calendrier fourrager



Conseil collectif à destination des éleveurs de la Nièvre

Des conseillers à votre écoute

Contact bureau Nevers
03 86 93 40 60
elevage@nievre.chambagri.fr



PROagri
POUR VOUS. AUJOURD'HUI. ET DEMAIN

Avec le soutien financier de :

RÉGION
BOURGOGNE
FRANCHE
COMTE

Avec la contribution
financière du compte
d'affectation spéciale
développement
agricole et rural
CASDAR

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE



Agro – Météo

La pousse d'herbe redémarre enfin !

Les fauches précoces des méteils et des prairies temporaires sont en majorité terminées et ont pu être réalisées dans de bonnes conditions. Les rendements sont globalement en baisse par rapport à l'an passé, à cause d'un déficit hydrique marqué sur les mois de mars-avril. Le retour de la pluie est bénéfique, aussi bien pour les parcelles en cours de pâturage, afin de regagner un peu de souplesse que dans les parcelles déjà fauchées qui bénéficient de conditions idéales pour repartir.

Les 1000°C cumulés sont maintenant atteints dans la majorité des secteurs du département : les méteils et ray-grass qui n'ont pas été récoltés évoluent vite et perdent en valeur alimentaire.

Les conditions sont idéales pour reprendre les sols et implanter des cultures dérobées après les méteils, de quoi permettre des levées rapides et régulières.

La semaine prochaine devrait voir le retour de la chaleur, de quoi envisager les premières fauches en foin ?



Sorgho fourrager : soigner le semis

La graine de sorgho est de petite taille et les besoins en températures de la culture sont plus élevés que les autres cultures d'été. Il convient donc de soigner la préparation du lit de semences afin d'obtenir un contact sol-graine satisfaisant et de semer sur un sol réchauffé (12°C minimum) afin d'assurer une levée rapide et régulière. Les sorghos sont sensibles à la concurrence lors de la phase d'installation. Une bonne implantation favorise une levée rapide et régulière, limite les pertes et facilite le désherbage.

→ Semer sur un sol bien réchauffé (>12°C) et bien préparé (un labour préalable limite les adventices). Un travail du sol assez profond permettra d'assurer un bon enracinement. Le travail superficiel est possible en sols bien structurés en profondeur. Le lit de semences ne doit pas être trop motteux pour favoriser le contact du sol avec la graine et obtenir une profondeur de semis régulière. Attention toutefois de ne pas favoriser une préparation trop fine en sols limoneux sensibles à la battance, le sorgho y étant sensible.

→ Semer à la bonne densité et à la bonne profondeur :

Sorgho fourrager multicolore : 20 à 25 kg/ha pour les sorghos multicolores hybrides et 25 à 30 kg/ha pour les sorghos multicolores de type Sudan Grass. Semis au semoir à céréales, maximum 3 cm de profondeur, roulage après semis indispensable.

Sorgho fourrager monocoupe : 180 à 250 000 grains / ha selon la réserve utile du sol, 2 à 4 cm de profondeur (de préférence au semoir monograine).



Les sorghos monocoups doivent être implantés de préférence au semoir monograine (Photo CA 58)

→ Rouler après le semis pour favoriser le contact terre-graine

→ Fertilisation : au semis, prévoir un apport de 60 à 80 unités de P et de K et 30 à 40 unités de N.

Un second apport d'azote équivalent sera à prévoir :

au stade 8 feuilles pour les sorghos monocoups,

après chaque exploitation pour les sorghos multicolores